

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

MINIDIAB®
МИНИДИАБ®
(Glipizide)



Какво трябва да знаете за МИНИДИАБ таблетки

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете употребата на това лекарство.

Тази листовка ще Ви даде полезна информация за МИНИДИАБ. Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт. Запазете тази листовка, защото може да пожелаете да я прочетете отново.

Името на това лекарство е МИНИДИАБ.

Какво съдържа Вашето лекарство

Таблетките МИНИДИАБ съдържат 5 mg от лекарственото вещество glipizide (глипизид). Таблетките съдържат също помощните вещества микрокристална целулоза, нишесте, стеаринова киселина и лактоза.

Таблетките се предлагат по 30 броя в опаковка.

Кой произвежда Вашето лекарство

Притежател на разрешението за употреба: Pfizer Enterprises SARL, Rond-point du Kirchberg, 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Производител: Pharmacia Italia SpA., Via del Commercio, Zona Industriale, Marina del Tronto, Ascoli Piceno, Italy.

Какъв тип лекарство е МИНИДИАБ

МИНИДИАБ е противодиабетно лекарство, което помага за понижаване на нивата на кръвната захар. Той принадлежи към групата на сулфанилурейните противодиабетни лекарства.

За какво служи Вашето лекарство

МИНИДИАБ се използва за намаляване на кръвната захар при пациенти, страдащи от инсулин-независим захарен диабет, наричан още диабет на зрялата възраст или диабет тип II, при които подходящата диета, приложена самостоятелно, не е дала резултат.

Преди да започнете лечение с МИНИДИАБ

Трябва да уведомите Вашия лекар в случай, че:

- сте алергични (свръхчувствителни) към glipizide или някое от помощните вещества в състава на МИНИДИАБ, описани по-горе в раздела "Какво съдържа Вашето лекарство";
- имате I-ви тип (инсулин-зависим) диабет;
- имате ацетон и захар в урината (това може да означава, че имате кетоацидоза);
- имате проблеми с бъбреците или черния дроб;



- сте имали случаи на загуба на съзнанието (диабетна кома);
- сте бременна, планирате да забременеете или кърмите;
- се лекувате с други лекарства;
- се храните нередовно, употребявате алкохол;
- се лекувате с инсулин или други лекарства за диабет (сулфанилурейни или бигванидини).

В изброените по-горе случаи това лекарство може да се окаже неподходящо за Вас. Вашият лекар ще Ви посъветва.

Ефектът на всяко подобно лекарство (сулфанилурейно производно), в това число и МИНИДИАБ, може да намалее с течение на времето при много пациенти. Това явление е известно като вторично неповлияване за разлика от първичното неповлияване, при което продуктът не е имал ефект още при първия прием.

Можете ли да шофирате, докато вземате това лекарство

Всички пациенти, страдащи от диабет, които шофират, трябва особено да внимават да не изпаднат в хипогликемия. (Вижте раздел "Причинява ли Вашето лекарство нежелани лекарствени реакции"). В случай, че имате такива оплаквания, не трябва да шофирате и да работите с машини.

Може ли МИНИДИАБ да се приема заедно с други лекарства

Голям брой лекарства могат да взаимодействат с МИНИДИАБ и да окажат влияние върху контролирането на диабета. В случай, че приемате други лекарства, трябва да уведомите Вашия лекар преди да започнете лечение с МИНИДИАБ.

Лекарства, които взаимодействат с МИНИДИАБ:

- Miconazole (миконазол) или fluconazole (флуконазол), които се използват за лечение на гъбични инфекции;
- Противовъзпалителни лекарства, които се използват за лечение на болки в мускулите и ставите, например phenylbutazone (фнилбутазон);
- Салицилати като аспирин, които се използват като болкоуспокояващи;
- Бета-блокери, които се използват за лечение на високо кръвно налягане и определени сърдечни заболявания;
- Инхибитори на ангиотензинконвертиращия ензим, които се използват за лечение на високо кръвно налягане);
- H₂-рецепторни антагонисти, които се използват за лечение на язва, например cimetidine (симетидин);
- Кортикостероиди;
- Фенотиазини, които се използват за лечение на някои психични заболявания като chlorpromazine (хлорпромазин);
- Прогестагени и перорални противозачатъчни лекарства;
- Бронходилататори, напр. salbutamol (салбутамол), ritodrine (ритодрин) и terbutaline (тербуталин), които се използват за лечение на астма;
- Алкохолни напитки (вино, бира, концентрати) могат да нарушат контрола на диабета;
- Диуретици, калциеви антагонисти, тиреоидни хормони, никотинова киселина, isoniazid (изониазид).



Как трябва да приемате Вашето лекарство

Особено важно е да вземате лекарството съгласно указанията на Вашия лекар. Не взимайте повече таблетки МИНИДИАБ, отколкото е препоръчал Вашият лекар. Посочените по-долу препоръчителни дози представляват само най-общи указания.

Обичайната начална доза е една таблетка от 5 mg, приета преди закуската или обяд.

Ако Вашият лекар прецени, че Вие се нуждаете от по-висока доза, той ще Ви каже как постепенно да я увеличите.

Комбинирана употреба: При добавяне на друго хипогликемизиращо лекарство към МИНИДИАБ за комбинирана терапия приложението на новото лекарство трябва да започне с най-ниската препоръчвана доза, а пациентите трябва да бъдат наблюдавани внимателно за хипогликемия.

При добавяне на МИНИДИАБ към друго хипогликемизиращо лекарство приложението на МИНИДИАБ трябва да започне с 5 mg. Пациенти, които може да са по-чувствителни към хипогликемични лекарства могат да започнат с по-ниска доза. Титрирането трябва да се базира на клинична преценка.

Лечението не трябва да се спира или дозата да се променя без указания от Вашия лекар. Спирането на лекарството може да доведе до влошаване на диабета.

По време на лечението е необходимо периодично да проследявате нивото на кръвната захар. Ако имате някакви съмнения или въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Какво ще стане, ако изпиете повече таблетки, отколкото е определил Вашият лекар

Ако случайно погълнете повече таблетки, отколкото е определил Вашият лекар, трябва незабавно да потърсите медицинска помощ. Симптоми като прималяване, объркване, изпотяване или треперене могат да се дължат на ниска кръвна захар. Трябва да изядете или изпиете нещо сладко. При колапс или загуба на съзнание трябва веднага да се повика Бърза помощ.

Какво трябва да направите в случай, че пропуснете да вземете таблетка

Ако пропуснете да вземете таблетка, вземете я при следващото хранене.

Причинява ли Вашето лекарство нежелани лекарствени реакции

В случай, че страдате от някои от изброените по-долу нежелани лекарствени реакции и те са особено обезпокоителни, тежки и не преминават при продължаване на лечението, трябва да уведомите своя лекар:

- Хипогликемия (ниска кръвна захар), която в редки случаи може да бъде тежка. Хипогликемията може да причини прималяване, изпотяване, треперене, слабост и объркване. Тя може да се дължи на недостатъчно хранене или на твърде висока доза на лекарството. Хипогликемията може да бъде коригирана, като се изяде или изпие нещо сладко. При възникване на хипогликемия трябва да уведомите Вашия лекар.
- Стомашно-чревни проблеми като гадене, повръщане, диария, стомашни болки, запек;
- Тремор;
- Главоболие;
- Кожни проблеми като сърбеж, кожен обрив, уртикария;
- Хепатит, нарушена чернодробна функция;



- Заболявания на кръвта – левкопения (намаляване на броя на белите кръвни клетки), хемолитична анемия (намаляване на броя на червените кръвни клетки), тромбоцитопения (намаляване на броя на тромбоцитите) или намаляване на броя на всички кръвни клетки;
- Проблеми със зрението като замъглено зрение, отслабване на зрението.

При пациенти, които са получавали това лекарство са наблюдавани отклонения в някои лабораторни изследвания, които могат обаче да не се дължат на него.

Следната нежелана лекарствена реакция е изключително рядка и Вие веднага трябва да уведомите своя лекар, ако възникне:

- Жълтеница.

Тежките нежелани лекарствени реакции са редки.

- Реакции на свръхчувствителност. Някои пациенти са алергични към лекарства. Това може да предизвика внезапни хрипове, обрив и сърбеж по цялото тяло. Ако някои от тези симптоми се появят, докато се лекувате с МИНИДИАБ, трябва веднага да уведомите Вашия лекуващия лекар.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако забележите нежелани реакции, различни от описаните по-горе.

Грижете се за Вашето лекарство! Това лекарство е предназначено за Вас. Не го давайте на други хора. Може да не е подходящо за тях. Не приемайте това лекарство след датата на изтичане на срока на годност.

Къде да съхранявате Вашето лекарство

Съхранявайте го на хладно (под 30°C) място.

Съхранявайте всички лекарства на недостъпно за деца място!

Допълнителна информация

Вашият лекар вероятно ще Ви даде допълнителна информация за Вашия диабет и неговото лечение. Много важно е да се придържате към стриктна диета и да правите редовно упражнения. Вие и Вашето семейство трябва да сте запознати със симптомите на хипогликемията и как да я коригирате.

Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Информацията в тази листовка се отнася само за МИНИДИАБ.

Дата на последна редакция на листовката:

