

Прочетете внимателно листовката, преди да започнете лечението с това лекарство .

- **Пазете листовката. Може да се наложи да я прочетете отново.**
- **Ако имате въпроси, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.**
- **Този лекарствен продукт е предписан лично за Вас и не трябва да го давате на други хора. Той може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.**

В листовката

1. Какво е Diprogenta и за какво се използва
2. Преди да използвате Diprogenta
3. Как се използва Diprogenta
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на Diprogenta
6. Допълнителна информация

Име на лекарствения продукт

DIPROGENTA® oint
ДИПРОГЕНТА маз

Състав

Лекарствено вещество:

Всеки грам от Diprogenta маз съдържа бетаметазон дипропионат (*betamethasone dipropionate*), еквивалентен на 0,5 мг бетаметазон и гентамицин сулфат (*gentamicin sulphate*), еквивалентен на 1,0 мг гентамицин.

Помощни вещества:

Течен парафин, бял мек парафин

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

SP Europe, 73, rue de Stalle, B-1180 Brussels, Белгия

Име и адрес на производителя

Schering Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Белгия

1. КАКВО Е DIPROGENTA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Лекарствена форма

Маз за приложение върху кожата.

Показания

Diprogenta маз се прилага за облекчаване на възпалението при чувствителни на кортикостероиди кожни заболявания (напр. алергичен дерматит, атопичен дерматит, псориазис, екзема и др.), при които е налице или се подозира инфекция, предизвикана от чувствителни на гентамицин микроорганизми.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ DIPROGENTA

Противопоказания

Не използвайте Diprogenta маз:

Ако имате свръхчувствителност или алергия към някоя от съставките на лекарствения продукт или към други кортикостероиди или антибиотици от групата на аминогликозидите.

Специални предупреждения и специални противопоказания

Преди използване на Diprogenta маз съобщете на Вашия лекар, ако сте бременна или кърмите, ако имате каквото и да е заболяване и особено, ако имате инфекция.



Diprogenta маз не трябва да се използва върху големи участъци от тялото, тъй като това може да увеличи абсорбираното количество. Не използвайте Diprogenta маз по-често или за по-дълго време отколкото Ви е предписал лекарят.

Обърнете специално внимание, ако: състоянието на кожата Ви се влоши, кожата изглежда инфектирана или силно изсушена.

DIPROGENTA маз не се препоръчва при деца под 12 годишна възраст.

Докато се лекувате с Diprogenta

Употреба по време на бременност и кърмене

Бременност

Преди да използвате Diprogenta маз, съобщете на Вашия лекар, ако сте бременна.

Кърмене

Преди да използвате Diprogenta маз, съобщете на Вашия лекар, ако кърмите.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни за влиянието на лекарствения продукт върху способността за шофиране и работа с машини.

Взаимодействие с други лекарствени продукти

Съобщете на Вашия лекар или фармацевт, ако взимате или наскоро сте взимали някакви други лекарства, дори и такива, отпускани без рецепта.

3. КАК СЕ ИЗПОЛЗВА DIPROGENTA

Това лекарство е предписано от Вашия лекар специално за Вас и за лечение на настоящото Ви заболяване; не давайте това лекарство на никой друг.

При необходимост Вашият лекар може да промени дозата в хода на лечението.

Начин на приложение

Нанасяйте тънък слой Diprogenta маз върху засегнатия участък от кожата като леко втривате. Не превързвайте и не поставяйте компреси върху обработената повърхност, освен ако това не е съветът на Вашия лекар.

Не използвайте стегнати пелени или найлонови гащички на дете, лекувано с Diprogenta маз освен, ако Вашият лекар не Ви е посъветвал. Избягвайте приложението на Diprogenta маз върху дълбоки кожни рани, отворени рани, изгаряния или наранена кожа.

Честота на приложение

Обикновено два пъти дневно (сутрин и вечер) или както е предписано от Вашия лекар. При по-леки случаи заболяването може да се повлияе от приложение веднъж дневно.

Продължителност на лечението

Вашият лекар ще ви посъветва кога да спрете употребата на Diprogenta маз.

Какво да предприемете в случай на предозиране

Diprogenta маз трябва да се използва само в препоръчаната дозировка. Свържете се с Вашия лекар, ако сте използвали Diprogenta маз върху големи участъци от кожата или за по-дълго време от предписания срок. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако случайно погълнете Diprogenta маз.

Какво да предприемете в случай, че пропуснете една или повече дози

Ако забравите да нанесете Diprogenta маз според предписанието, поставете лекарството колкото е възможно по-скоро и след това се върнете към редовната схема на приложение.



4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Заедно с желаните ефекти лекарственият продукт може да окаже и някои нежелани лекарствени реакции. Въпреки, че може не всички да се проявят, ако това се случи, може да се наложи лекарска намеса. Свържете се с Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани лекарствени реакции се задържи или Ви тревожи: парене, сърбеж, раздразнена/възпалена или суха кожа, възпаление или зачервяване на лицето; увеличено окосмяване; акне; промяна на цвета на кожата; изтъняване на кожата и лесно кървене; стрии или други признаци на възпаление, които не сте наблюдавали до този момент.

Ако забележите някакви други нежелани лекарствени реакции, свържете се с Вашия лекар. Децата и подрастващите, на които се налага да ползват този Diprogenta маз, трябва да бъдат внимателно наблюдавани от лекаря си, тъй като лекарството се абсорбира през кожата и може да засегне ръста или да има други нежелани въздействия.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА DIPROGENTA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да не се използва след изтичане срока на годност, указан върху опаковката.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

3 години

7. ДАТА НА ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

Ноември 2004 г.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всякаква допълнителна информация относно лекарствения продукт, моля, обърнете се към местния представителен офис на Притежателя на разрешението за употреба:

Шеринг-Плау Централ Ийст - клон България
ул. "Проф. Милко Бичев" 7, ет. 3
София 1504,

тел.02/ 944 10 73; 944 10 83.

