



Преди да започнете да прилагате Вашето лекарство, прочетете внимателно следната информация за пациента.

- С това лекарство, отпускано без лекарско предписание Вие можете да лекувате леки, преходни оплаквания без медицински контрол. За постигане на оптимален ефект, обаче, е необходимо внимателно използване на лекарството.
- Пазете тази листовка за пациента, защото информацията, която съдържа може да Ви потрябва по-късно.
- За повече информация и съвет се обърнете се към Вашия фармацевт.
- Ако симптомите Ви не отзвучават или дори се влошават, обърнете се незабавно към Вашия лекар.

Съдържание на информацията за пациента

1. Какъв вид лекарство е НО-ШПА 40 mg таблетки и при какви заболявания може да се прилага?
2. Това, което трябва да се знае преди да се приемат НО-ШПА 40 mg таблетки.
3. Как трябва да се приемат НО-ШПА 40 mg таблетки?
4. Възможни нежелани реакции.
5. Съхранение на продукта.

НО-ШПА 40 mg таблетки

Дротаверин хидрохлорид (Drotaverine hydrochloride)

Активно вещество на продукта: Всяка таблетка съдържа 40 mg дротаверин хидрохлорид.

Други съставки: магнезиев стеарат, талк, повидон, царевично нишесте, лактоза монохидрат.

Притежател на разрешението за употреба: CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd, Будапеща

Производител:

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd, H-1045 Budapest, To u.1-5, Унгария

И

CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Co. Ltd, 2112 Veresegyhaz Levai u.5, Унгария


1. КАКЪВ ВИД ЛЕКАРСТВО Е НО-ШПА 40 MG ТАБЛЕТКИ И ПРИ КАКВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛАГА?

НО-ШПА таблетки е спазмолитичен (успокояващ или отстраняващ спазмите) продукт и може да се прилага при следните заболявания:

Спазми на гладката мускулатура при заболявания на жлъчния мехур и жлъчните пътища: камъни в жлъчката, холецистит (възпаление на жлъчния мехур).

Спазми на гладката мускулатура при заболявания на бъбреците, пикочния мехур и пикочните пътища: камъни в бъбреците, камъни в пикочните пътища, възпаление на бъбречните легенчета, цистит (възпаление на пикочния мехур), спазъм на пикочния мехур.

Като помощна терапия:



- В случай на спазми на гладката мускулатура на стомаха и червата: язва на стомаха и дванадесетопръстника, гастрит (възпаление на стомашната лигавица), спазъм на стомаха, ентерит (възпаление на лигавицата на червата), свръхчувствителност и раздразнителност на дебелото черво, придружено със запек или метеоризъм (образуване на газове в храносмилателния тракт, главно в червата).
- При тензионен (от напрежение) тип главоболие.
- При гинекологични заболявания: болезнена менструация.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗНАЕ, ПРЕДИ ДА СЕ ПРИЕМЕ НО-ШПА 40 МГ ТАБЛЕТКА?

Не приемайте НО-ШПА 40 mg таблетка:

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към активното вещество (дротаверин) или помощните вещества на продукта.
- ако страдате от тежка чернодробна, бъбречна или сърдечна недостатъчност.
- при деца на възраст под 1 година

С повишено внимание НО-ШПА 40 mg таблетки може да се приемат:

При пациенти с ниско кръвно налягане приложението му изисква повишено внимание. При пациенти, чувствителни към лактоза той може да предизвика стомашночревни оплаквания поради съдържанието на лактоза в една таблетка (52 mg). Приложението на дротаверин не е проучено при деца. Ето защо, той може да се дава на деца само много внимателно и не може да се прилага при деца под 1 година.

Бременност

Преди приемането на всяко едно лекарство задайте въпросите си на Вашия лекар или фармацевт.

Въз основа на проучвания върху животни и хора, при употребата му по време на бременност не се доказва вредно въздействие върху майката или плода. Все пак, приложението му по време на бременност изисква повишено внимание.

Кърмене

Преди приемането на всяко едно лекарство задайте въпросите си на Вашия лекар или фармацевт.

Поради липса на достатъчно резултати от проучвания, приложението му по време на кърмене не се препоръчва.


Ефекти на продукта върху способността за шофиране и работа с машини.

При перорален (през устата) прием в обичайни дози, дротаверинът не повлиява способността за шофиране и работа с машини. Все пак, в случай на световъртеж, появяващ се след приема му, избягвайте опасни ситуации и се въздържайте от шофиране и работа с машини.

Приемане на други лекарства:

На всяка цена информирайте Вашия лекуващ лекар или фармацевт за всички лекарства, които приемате или сте приемали наскоро, включително и продуктите, отпускани без рецепта.

Когато се приема едновременно с леводопа, той намалява ефекта на леводопа за облекчаване на симптомите на болестта на Паркинсон, т.е. сковаността на скелетните мускули и треморът може да се задълбочат.



3. КАК ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЕМАТ НО-ШПА 40 МГ ТАБЛЕКИ?

В случай, че Вашият лекуващ лекар не е предписал друго обичайната доза е :

Възрастни: 3-6 таблетки дневно (разделени на 2-3 дози).

Деца над 1 година: от 1 до 6 години: 1-3 таблетки дневно (разделени на 2-3 дози), над 6 години: 2-5 таблетки дневно (разделени на 2-5 дози).

Не трябва да се прилага при деца под 1 година.

Ако сте приели повече НО-ШПА 40 mg таблетки от предписаните Ви:

Няма достатъчно данни данни, свързани с предозиране. При опасност от предозиране, незабавно се обърнете към лекар.

Ако сте забравили да вземете таблетка НО-ШПА 40 mg:

Не приемайте двойна доза в определеното за следващата доза време.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарства, НО-ШПА 40 mg таблетки също може да има нежелани реакции.

Рядко: главоболие, световъртеж, гадене и сърцебиене, безсъние, запек, понижаване на кръвното налягане.

Информирайте Вашия лекуващ лекар при поява на горепосочените нежелани реакции.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако освен гореизброените нежелани реакции, наблюдавате други необичайни симптоми.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява в оригиналната опаковка, при температура до 25°C.

Лекарството може да се използва преди изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Лекарството трябва внимателно да се пази от достъп на деца!

