

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

BERODUAL РАЗТВОР ЗА ИНХАЛАЦИИ

/Беродуал/

/ипратропиум бромид + фенотерол хидробромид/

Състав:

1 ml (= 20 капки) разтвор за инхалации съдържа:

ипратропиум бромид	0,25 mg
фенотерол хидробромид	0,5 mg

Помощни вещества:

бензалкониев хлорид, динатриев едетат, натриев хлорид, солна киселина, пречистена вода.

Свойства:

Berodual съдържа две активни бронходилатиращи съставки:

ипратропиум бромид и фенотерол хидробромид.

Едновременното прилагане на тези две активни съставки разширява бронхите чрез различни места на фармакологично действие.

Препаратът се прилага при заболявания, свързани със спазъм на дихателните пътища. Осъществява се взаимно допълващо се действие при много ниски дози. Това позволява индивидуална дозировка за всеки болен с минимални странични реакции.

При остър пристъп на астма Berodual е ефективен кратко време след приложението му.

Показания:

Berodual е показан като бронходилататор за профилактика и лечение на симптомите при остър пристъп на хронични обструктивни нарушения на дихателните пътища с обратим бронхоспазъм: бронхиална астма, хроничен бронхит с и без емфизем. При някои болни трябва да бъде обсъдена необходимостта от едновременна противовъзпалителна терапия.

Противопоказания:

Някои сърдечни заболявания /хипертрофична обструктивна кардиомиопатия, тахиаритмия/.

Свръхчувствителност към фенотерол хидробромид или подобни субстанции или към неактивните инградиенти на лекарството.

Странични действия:

Често се наблюдава: фин тремор на скелетната мускулатура, нервност, по-рядко тахикардия, замаиване, сърцебиене, главоболие, особено при болни със свръхчувствителност.

В резултат от приложението на една от съставките може да се получи намаление на калия в кръвта. При отделни болни могат да

се наблюдават локални реакции като сухост в устата, гъргене на гърлото или алергични реакции.

Както и при другите бронходилататори, може да се наблюдава кашлица и в много редки случаи парадоксален бронхоспазм. При използването на антихолинергичния компонент, какъвто е напр. ипратропиум бромид, може да възникне ретенция на урината, особено при болни с преди съществуваща обструкция на пикочните пътища.

Съобщени са и странични действия от страна на очите /Виж указания за употреба/.

Лекарствени взаимодействия:

Ефектът на Berodual може да бъде засилен от едновременното приложение на други бронходилататори и кортикостероиди. Това повишава риска от страничните действия. Не са известни нежелателни взаимодействия с експекторанти и гинатриев кромогликат. Значително намаляване на ефекта може да се наблюдава при едновременното приложение на някои сърдечни лекарства.

Предпазни мерки:

Други симпатомиметични бронходилататори могат да бъдат използвани заедно с Berodual само при лекарски контрол.

Внимателна оценка на отношението риск/полза, особено когато дозата е по-висока от препоръчаните се налага при следните случаи: Недостатъчно контролиран захарен диабет, наскоро прекаран инфаркт на миокарда и/или тежко органично сърдечно-съдово заболяване, хипертиреоидизъм.

В случаи на остра бързо влошаваща се диспнея /затруднения в дишането/ трябва да се поиска незабавно консултация с лекар.

Дозировка и приложение

(20 капки = 1 ml)

(1 ml съдържа 0,25 mg ипратропиум бромид и 0,5 mg фенотерол хидробромид)

Дозата трябва да бъде определена от лекуващия лекар и адаптирана към индивидуалните изисквания на болния; По време на лечението болният трябва да бъде под лекарско наблюдение.

Предписаната за инхалация доза се разтваря с физиологичен серум до краен обем 3-4 ml, небулизира се и се инхалира за 6-7 мин., докато се инхалира разтворът. Като разтворител не трябва да се използва дестилирана вода. Разтворът трябва да се приготвя преди всяка употреба; останалият разтвор трябва да се изхвърли.

Дозата зависи и от вида на инхалацията и характеристиката на използвания небулизатор. При големина на частиците до 5 мсг или при асистирана вентилация, нивото на дозата трябва да бъде редуцирано. Продължителността на инхалациите се контролира от обема разтвор. Berodual инхалационен разтвор може да бъде приложен с използването на различни небулизатори, Benett, Bird,

Maximist, Monaghan и др. Където целия кислород, който е достъпен в разтвора е с постоянна концентрация на потока - 6-8 l/min. Дозата може да бъде повторена след интервал най-малко от 4 часа, само ако това се налага. Болни, които са предразположени към глаукома трябва да пазят очите си /виж Указания за употреба/.

Инструкции за съхранение:

Да се съхранява на сухо място и при температура не по-висока от 25°C.

Да се съхранява на сигурно място извън достъпа на деца!

Срок на годност:

Срокът на годност на Verodual разтвор е 5 години от датата на производство. Verodual разтвор не трябва да бъде използван след датата, означена върху опаковката.

Производител:


Бьорингер Ингелхайм Интернационал ГмбХ /Бьорингер Ингелхайм КГ
Бингер Щрасе 173
D-55216 Ингелхайм ам Рейн
Германия

Опаковка:

Разтвор за инхалации, флакон 20 ml

Последна корекция:

18 април, 1996

Гревен  Донева