



ZADITEN 0,25 mg/ml - 5 ml капки за очи, разтвор

Листовка за пациента

Прочетете внимателно тази листовка. Тя съдържа важна за Вас информация.

Това лекарство се отпуска без рецепта. Въпреки това, ЗАДИТЕН трябва да се използва внимателно, за да се постигне най-добрия резултат.

- Запазете тази листовка, може да Ви послужи отново.
- Обърнете се към фармацевт, в случай че имате нужда от повече информация или съвет.
- Трябва да се обънете към лекар, ако симптомите се влошат или не се постигне подобрение след няколко дни.

В тази листовка:

1. Какво представлява ЗАДИТЕН капки за очи и за какво се използва ?
2. Преди да използвате ЗАДИТЕН капки за очи
3. Как да използвате ЗАДИТЕН капки за очи ?
4. Възможни нежелани ефекти
5. Съхранение на ЗАДИТЕН капки за очи

ЗАДИТЕН 0,25 mg/ml – 5 ml капки за очи, разтвор

Кетотифен

- Активното вещество е кетотифен. 1,0 ml съдържа 0,345 mg ketotifen hydrogen fumarate, който съответства на 0,25 mg кетотифен.
- Помощните вещества са бензалкониев хлорид, глицерол (E422), натриев хидроксид (E524), вода за инжекции.

Притежател на разрешение за употреба:

Novartis Pharma Services Inc.
Lichtstrasse 35, CH-4056
Basel, Switzerland

Производител

EXCELVISION
Rue de la Lombardi re
07100 Annonay
Франция

1.Какво представляват ЗАДИТЕН капки за очи и за какво се използва?

ЗАДИТЕН е разтвор капки за очи, който се предлага в пластмасов флакон от 5 ml.

ЗАДИТЕН съдържа кетотифен, което е антихистаминов продукт.

ЗАДИТЕН капки за очи се прилага при дразнене на очите в случаи на алергия към цветен прашец, като например зачервяване, сърбеж и повишена секреция на слъзната жлеза.

ЗАДИТЕН противодейства на алергичната реакция, като блокира ефекта на хистамина. Хистаминът причинява зечервяване, подпухване, сърбеж и насълзяване на очите.

2. Преди да използвате ЗАДИТЕН капки за очи

ЗАДИТЕН капки за очи може да се използва от възрастни, пациенти в напреднала възраст и дори от деца над 3 години.



Не употребявайте ЗАДИТЕН капки за очи:

- ако имате свръхчувствителност към кетотифен или някое от помощните вещества.

Бременност

Няма опит от използване на ЗАДИТЕН по време на бременност. В случай, че сте бременна или планирате да забременеете се консултирайте с лекар или фармацевт преди да започнете лечение със ЗАДИТЕН капки за очи.

Кърмене

Кетотифен преминава в кърмата, но реален риск за влияние върху детето не съществува при прилагане на продукта в терапевтични дози.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Ако изпитвате замаяност или зрението Ви е замъглено, след като сте използвали ЗАДИТЕН капки за очи, трябва да изчакате, докато тези симптоми отшумят, преди да шофирате и да използвате машини.

Важна информация за някои от съставките на ЗАДИТЕН капки за очи

ЗАДИТЕН капки за очи съдържа бензалкониев хлорид, който може да повлияе на меки контактни лещи. Лещите трябва да се свалят преди употреба на ЗАДИТЕН и могат да се сложат отново 15 мин. след като са поставени капките. Потвърден факт е, че бензалкониев хлорид може да променя цвета на меките контактни лещи.

Употреба на други лекарствени продукти

Ако използвате други капки за очи, трябва да осигурите 5 мин. между приложението на всеки от двата продукта. Възможно е ЗАДИТЕН капки за очи да усили ефекта на антихистамините (лекарства срещу алергия) и алкохола или да окаже влияние върху ефекта на определени лекарства, които имат потискащо действие върху централната нервна система.

Важно е да се посъветвате с Вашия лекар или фармацевт, ако в момента употребявате или скоро сте употребявали други лекарствени продукти, дори и такива, отпускани без рецепта.

3. Как да използвате ЗАДИТЕН капки за очи?

Дозировката е една капка във всяко око два пъти дневно (сутрин и вечер).

Начин на приложение:

Наведете глава назад (фиг. 1). Дръпнете долния клепач с пръст. Дръжте капките с другата ръка с отвора надолу. С леко стискане капнете една капка в окото (фиг. 2). За да избегнете замърсяване, пазете флакона от допир с други предмети. Затворете окото за около 1 мин. Това ще предотврати преминаването на капката в гърлото през слъзния канал. По този начин голяма част от капката ще остане в окото. Повторете процедурата и в другото око.



Ако усетите, че ефектът на ЗАДИТЕН капки за очи е прекалено силен или прекалено слаб, или ако усетите някаква форма на нежелана реакция, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.



Ако прекалите с употребата на ЗАДИТЕН капки за очи:

Не съществува риск, ако капки ЗАДИТЕН попаднат в устата. Не трябва да се безпокоите и ако повече от една капка ЗАДИТЕН попадне в окото.

4. Възможни нежелани ефекти

Като всички лекарствени средства, ЗАДИТЕН капки за очи може да има нежелани ефекти.

При употреба на ЗАДИТЕН капки за очи могат да се проявят следните нежелани реакции в окото:

Парене или точковидни образувания по външния слой клетки на роговицата.

Редки реакции са замъглено виждане, веднага след поставяне на капките в очите, сухо око, промени в клепачите, възпаление на външната част на окото, болки в очите, чувствителност към светлина или видими кръвоизливи в под повърхността на окото.

Редки реакции в други части на тялото също могат да се появят: главоболие, замаяност, кожен обрив, екзема, суха уста и алергична реакция.

Ако забележите странични ефекти, които не са споменати в тази листовка, се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

5. Съхранение на ЗАДИТЕН капки за очи

Да се пази от деца!

Да се съхранява при температура под 25° С.

Не използвайте лекарствения продукт след датата, посочена върху опаковката и флакона.

Капките за очи трябва да се употребят до 4 седмици след отварянето им.

Поради биологични причини и съображения за безопасност, лекарства с изтекъл срок на годност трябва да бъдат върнати в аптека.

6. Допълнителна информация

За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.

8. Номер(а) на разрешението за употреба

20020500

9. Дата на първото разрешаване/подновяване на разрешението за употреба

18.06.2002

10. Дата на актуализиране на текста

28-10-2005

