

И А Л
О Д О Б Р Е Н О !
ДАТА 13.09.03

Листовка за пациентата

BEXTRA®

БЕКСТРА®

Valdecoxib 40 mg

Моля, прочетете внимателно настоящата листовка преди да започнете приемането на това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.

Ако имате допълнителни въпроси, моля обрънете се към Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други хора. То може да им навреди, дори ако техните оплаквания са същите като Вашите.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво е BEXTRA® и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да използвате BEXTRA®
3. Как да използвате BEXTRA®
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате BEXTRA®
6. Допълнителна информация

БЕКСТРА® 40 mg филмирани таблетки

Valdecoxib

Лекарственото вещество в BEXTRA® е valdecoxib /валдекоксив/.
BEXTRA® филмирани таблетки съдържат 10 mg valdecoxib.

Другите съставки са лактозаmonoхидрат, микрокристална целулоза, прежелатинизирано нишесте (царевично), натриева сол на кроскармелоза и магнезиев стеарат. Обвивката на таблетката съдържа титаниев диоксид (E171), хипромелоза (E464), макрогол, полисорбат (E433), жълт железен оксид (E172).

Притежател на разрешението за употреба:

Pharmacia-Pfizer EEIG, Hillbottom Road, High Wycombe, Buckinghamshire HP 12 4PX,
United Kingdom

Производител:

Pharmacia Limited, Whalton Road, Morpeth, Northumberland NE61 3YA, United
Kingdom

Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co., KG, Heinrich-Mack-Str. 35, D-89257, Illertissen,
Germany

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BEXTRA® И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

Какво представлява BEXTRA®?



Вашето тяло произвежда вещества, наречени простагландини. Някои простагландини предизвикват болка и оток, докато други предпазват лигавицата на стомаха. BEXTRA® действа чрез намаляване на количеството простагландини, които предизвикват болка и оток без да намалява количеството на простагландините, които предпазват стомаха.

BEXTRA® лекува болка и възпаление. BEXTRA® принадлежи към група лекарства, наречени коксиби, които действат чрез потискане на циклооксигеназа-2 (COX-2). Филмирани таблетки BEXTRA® от 20 mg са бели, с форма на седмоъгълник, маркирани от едната страна с "40", а от другата с "7815".

Филмирани таблетки BEXTRA® можете да намерите в следните опаковки:

- блистери с 2 и 5 филмирани таблетки;
- бутилка с 300 и 500 филмирани таблетки.

Възможно е да не се продават всички видове опаковки.

За какво се използва Вашето лекарство

Остеоартрит и ревматоиден артрит

BEXTRA® се използва, за да облекчи болката и да намали отока, причинени от остеоартрита и ревматоидния артрит.

Първична дисменорея (менструална болка и спазми)

BEXTRA® се използва за лечение на менструалната болка и спазми.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BEXTRA®

Не използвайте BEXTRA®, ако:

- имате свръхчувствителност (сте алергични) към valdecoxib или някое от помощните вещества в BEXTRA®;
- сте имали в миналото алергична реакция към ацетилсалцилоловата киселина (аспирин) или други нестероидни противовъзпалителни лекарства (напр., ибупрофен) или към COX-2 инхибитори. Реакциите могат да включват хрипове (бронхоспазъм), запущен нос, сърбеж по кожата, обрив или подуване на лицето, устните или езика, други алергични реакции или полипи в носа след прием на тези лекарства;
- сте имали алергична реакция към група лекарства, наречена сулфонамиди (напр., някои антибиотици, използвани за лечение на инфекции);
- имате язва на стомаха или дванадесетопърстника или кървене от храносмилателната система;
- имате възпаление на червата (улцерозен колит или болест на Crohn);
- имате тежка сърдечна недостатъчност;
- имате тежко чернодробно заболяване;
- ако сте бременна над 6 месеца;
- ако кърмите.

Разговаряйте с Вашия лекар преди да приемете BEXTRA®.

Преди употреба на BEXTRA® се уверете, че Вашият лекар знае, че:



- имате язва, кървене или перфорация на гастроинтестиналния тракт;
- имате проблеми със сърцето, черния дроб или бъбреците;
- имате повишено артериално налягане, предстои Ви сърдечна операция или сте прекарали инсулт;
- имате задръжка на течности (оток, напр. подути глезени и стъпала);
- сте дехидратирани, напр. поради заболяване, диария или употреба на диуретици;
- използвате лекарства, потискащи съсирането;
- имате инфекция, тъй като лекарството може да замъгли треската (която е белег на инфекцията) и да Ви заблуди, че сте по-добре или че инфекцията не е сериозна;
- се опитвате да забременеете;
- сте бременна.

Влияе ли се приемът на BEXTRA® от храна и течности

BEXTRA® може да се приема с или без храна.

Бременни или кърмещи жени

Както и при употребата на други лекарства, включително аспирин или други нестероидни противовъзпалителни лекарства, ако сте бременна или възнамерявате да забременеете, информирайте Вашия лекар преди да приемете BEXTRA®. Не използвайте BEXTRA®, ако сте бременна след 6-ия месец. Ако кърмите, Вие не трябва да употребявате BEXTRA®, защото не е известно дали valdecoxib преминава в кърмата.

Помолете Вашия лекар или фармацевт за съвет преди да приемете каквото и да било лекарство.

Шофиране и работа с машини

Ако чувствате замайване или сте уморени след приемане на BEXTRA®, не шофирайте и не работете с машини, докато не се почувствате отново по-добре.

Другите лекарства и BEXTRA®

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или накърно сте приемали други лекарства дори такива, които се отпускат без рецептa.

Лекарствата понякога повлияват действието на други лекарства.

Може да се наложи да намалите дозата на BEXTRA® или на другите лекарства.

Вашият лекар ще Ви посъветва. Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства:

- Флуконазол или кетоконазол (използвани за лечение на гъбични инфекции);
- ACE-инхибитори (за лечение на високо кръвно налягане или сърдечна недостатъчност);
- Диуретици (таблетки за лечение на задръжка на течности);
- Циклоспорин и таクロнимус (потискат имунната система, напр. след трансплантация);
- Варфарин (използва се да предотврати съсирането на кръвта);
- Литий (използва се за лечение на депресия);
- Рифампицин (използва се за лечение на бактериални инфекции);
- Антиаритмични лекарства (използват се при нарушен сърдечен ритъм);
- Фенитоин или карbamазепин (при епилепсия);



- Теофилин (за астма);
- Метотрексат (за ревматоиден артрит и рак);
- Невролептици (използват се за лечение на психози);
- Омепразол (използва се за лечение на язви на stomаха и езофагеален рефлукс);

BEXTRA® може да бъде използвана в комбинация с ниска доза аспирин.

2. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BEXTRA®?

Винаги приемайте BEXTRA® така, както Вашият лекар Ви е инструктиран. Ако не сте сигурни, направете справка с Вашия лекар или фармацевт. Ако имате впечатление, че ефектът на BEXTRA® е много силен или много слаб, поговорете с Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителна доза

BEXTRA® е подходяща само за възрастни. Не се употребява при деца.

За лечение на остеоартрит и ревматоиден артрит препоръчителната доза е 10 mg веднъж дневно. Максималната доза е 20 mg веднъж дневно. BEXTRA® трябва да бъде приемана всеки ден дотогава, докото Вашият лекар Ви го предписва. BEXTRA® няма да излекува Вашето състояние, но ще Ви помогне да контролирате болката, отока и сковаността.

За лечение на менструална болка препоръчителната доза е 40 mg веднъж дневно при нужда. На първия ден Вие можете да приемете още веднъж 40 mg, ако има нужда. През първия ден от лечението можете да приемете общо само 80 mg, след което само 40 mg веднъж дневно.

Важно е да приемате таблетките така, както Ви е инструктиран Вашият лекар.

Пациенти в напреднала възраст

Ако сте на повече от 65 години и по-специално ако тежите под 50 kg, Вие можете да не отстранявате достатъчно бързо valdecoxib от организма си. Вашият лекар може да започне лечението Ви с най-ниската препоръчителна доза.

При проблеми с черния дроб

Ако имате чернодробни проблеми, Вашият лекар може да започне лечението на остеоартрита и ревматоидния артрит с най-ниската препоръчителна доза (10 mg веднъж дневно). Дозата при първична дисменорея не трябва да надхвърля 20 mg.

Други лекарства:

Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска доза BEXTRA®, ако приемате и лекарствата флуконазол или кетоконазол (вж. раздел "Другите лекарства и BEXTRA®").

Ако приемате по-голямо от предписаното Ви количество BEXTRA®, Вие трябва веднага да се обадите на Вашия лекар, фармацевт или болница.



Ако забравите да вземете BEXTRA®

Ако забравите да вземете една таблетка, приемете я възможно най-скоро. Ако вече е наблизило времето за следващата таблетка, не приемайте пропуснатата таблетка. По-нататък продължете да приемате BEXTRA® според предписаното от Вашия лекар. Не приемайте двойна доза, за да наваксате пропуснатата.

Ефект при спиране на BEXTRA®

Докато Вашият лекар не Ви каже да спрете лечението, е важно да продължавата да взимате BEXTRA®, както Ви е предписано от лекаря.

3. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, и BEXTRA® може да има нежелани реакции при някои хора. Ако се тревожите за нежелани реакции, поговорете с Вашия лекар, защото някои от тях могат да бъдат достатъчно сериозни и да изискват незабавна лекарска помощ.

Спрете BEXTRA® и информирайте Вашия лекар незабавно, ако:

- имате алергична реакция – напр. кожен обрив, оток на лицето, устните или езика, които могат да затруднят дишането, или имате хрипове;
- ако се появят мехури по кожата или кожата се бели;
- ако имате жълтеница (кожата и бялото на очите покълтяват);
- ако имате белези на кървене от стомаха или червата, напр. черни или примесени с кръв изпражнения или повръщане на кръв.

По-честите нежелани реакции, които засягат повече от 1 на 100 човека, са изброени по-долу:

- стомашна болка, лошо храносмилане, диария, гадене, чувство за подуване на корема, газове;
- сърбеж по кожата или обрив;
- подуване на краката, глезните, стъпалата (задръжка на течности);
- повишено кръвно налягане;
- сухота в устата;
- суха алвеола след зъбна екстракция;
- кашлица;
- подуване на синусите, възпалено гърло;
- анемия;
- сънливост или проблеми със съня;
- уринарни инфекции.

По-рядко срещани нежелани реакции, които засягат до 1 на 100 човека, са изброени по-долу:

- влошаване на кръвното налягане, замайване;
- генерализирана оточност по тялото, подуване на/около очите, влошаване на алергия;
- хирургичните рани могат да се инфицират;



- ♦ увеличено мускулно напрежение, скованост;
- ♦ подуване на устата или стомашната лигавица, киселини;
- ♦ палпитации – усещане за сърцебиене;
- ♦ патологични стойности на функционалните чернодробни и бъбречни тестове;
- ♦ увеличение на телесното тегло;
- ♦ натъртвания;
- ♦ нервност, тревожност, обърканост;
- ♦ копривна треска (обрив като от коприва);
- ♦ промени във вкуса;
- ♦ замъглено виддане;
- ♦ хрипове;
- ♦ инфекции на горните дихателни пътища;
- ♦ язви или кървене;
- ♦ сърдечна недостатъчност.

Редки нежелани реакции, които засягат по-малко от 1 на 1000 человека, са изброени по-долу:

- ♦ алергични реакции, напр. кожен обрив, подуване на лицето, устните и езика, хрипове, трудно дишане или прегълъщане;
- ♦ подуване, появя на мехури или белене на кожата;
- ♦ дрезгав глас;
- ♦ обструкция на храносмилателната система;
- ♦ намален брой бели кръвни телца или тромбоцити;
- ♦ депресия;
- ♦ чувствителност към светлина;
- ♦ възпаление на бъбреците;
- ♦ мозъчен удар.

Ако се беспокоите за нежеланите реакции или забележите някои нежелани реакции, които не са отбелязани в тази листовка, съобщете на Вашия лекар или фармацевт.

2. СЪХРАНЕНИЕ НА BEXTRA®

Пазете лекарството на място, недостъпно за деца.

Няма специални условия за съхранение.

Не използвайте филмированите таблетки BEXTRA® след изтичане срока на годност, отбелязан на кутията, блистера или бутилката.

3. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАДИЯ

За всяка допълнителна информация за този лекарствен продукт, моля обърнете се към локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:
ТП "Пфайзер Н.С.Р. Корпорейшън", София 1504, ул. Оборище 22

Дата на последна редакция на листовката:

