


ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
GENTAMICIN ACTAVIS
ГЕНТАМИЦИН АКТАВИС



ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОЗИ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

- Запазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако у Вас възникнат допълнителни въпроси, моля обърнете се към Вашия лекуващ лекар или към фармацевт!
- Този продукт е предписан лично за Вас и не трябва да се дава на друг! Той може да навреди на други хора, дори ако те имат подобни на Вашите оплаквания.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Гентамицин Актавис очна маз и за какво се прилага
2. Какво е необходимо да знаете преди приложението на Гентамицин Актавис очна маз
3. Как се прилага Гентамицин Актавис очна маз
4. Възможни нежелани реакции
5. Условия на съхранение
6. Допълнителна информация

Гентамицин Актавис очна маз
Gentamicin
Гентамицин

Лекарствено вещество в 100 g маз: Gentamicin sulfate, еквивалентен на Gentamicin 0,300 g

Помощни вещества: метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, ланолин, бял вазелин, пречистена вода.

Gentamicin Actavis маз 0,3% 5 g в двойно лакирани алуминиеви туби

Притежател на разрешението за употреба

Актавис ЕАД
Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2
1000 София, България
Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Производител

"Балканфарма-Разград" АД
бул. "Априлско въстание" №68
Разград-7200
Тел. 084615318



Производител

"Балканфарма-Разград" АД
бул."Априлско въстание" №68
Разград-7200
Тел. 084615318

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГЕНТАМИЦИН АКТАВИС очна маз И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Гентамицин е широкоспектърен антибиотик с добре изразена ефективност при локално лечение на първични и вторични кожни инфекции.

Гентамицин Актавис очна маз се прилага за локално лечение на бактериални инфекции на предния очен сегмент и клепачите, предизвикани от чувствителни на продукта микроорганизми като:

- блефарити, блефароконюнктивити, конюнктивити;
- хордеолум;
- дакриоцистити;
- кератити, кератоконюнктивити;
- *ulcus serpens*;
- вторични инфекции на *ulcus corneae* и *herpes corneae*.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ЗА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕТО С ГЕНТАМИЦИН АКТАВИС очна маз

Гентамицин Актавис очна маз не се прилага при свръхчувствителност към лекарственото и някои от помощните вещества.

При приложението на този лекарствен продукт имайте предвид следното:

Гентамицин Актавис очна маз не трябва да се използва за профилактика при банални инфекции и продължително време поради опасност от развитие на резистентни микроорганизми.

В случаи, когато се наблюдават реакции на свръхчувствителност като зачервяване на окото, съзене, подуване и сърбеж на клепача, точков кератит, употребата му трябва да се прекрати.

Поради опасност от замърсяване и развитие на допълнителни инфекции, при нанасяне на продукта наконечникът на тубата не трябва да се допира до тъканите на окото!

По време на лечението да не се носят контактни лещи.

Приложение на Гентамицин Актавис очна маз и прием на храни и напитки

Продуктът е с локално приложение в очите.

Бременност

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

Няма данни за увреждане на плода при бременни, но се препоръчва употребата на Гентамицин Актавис очна маз да се назначава само при строга преценка полза/риск.



Кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт

По преценка на лекаря при кърмещи жени, поради потенциална опасност от нежелани лекарствени реакции при кърмачето, или се прекъсва кърменето или се прекъсва употребата на продукта.

Шофиране и работа с машини

Да се избягва шофиране и работа с машини поради опасност от замъгляване на виждането. Когато това не може да стане, продуктът да се прилага вечер преди лягане.

Приемане на други лекарства

Моля, информирайте своя лекуващ лекар или фармацевт ако приемате или сте приемали скоро други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар

Няма данни за лекарствени взаимодействия.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ГЕНТАМИЦИН АКТАВИС маз

Винаги прилагайте Гентамицин Актавис очна маз според инструкциите на лекуващия лекар!

За лечение на инфекции на преден очен сегмент и очните придатъци – стълбче маз около 1-1,5 cm се изстиска от тубичката в долния конюнктивален сак на засегнатото око. Процедурата се повтаря 2-4 пъти дневно.

При тежки инфекции същата доза се апликира в засегнатото око на всеки 3-4 часа до получаване на подобрение, след което интервалът на приложение се удължава до стандартния.

При едновременно приложение на очни капки и очна маз, накапването да се извършва най-малко 5 минути преди прилагането на очната маз.

Ако сте пропуснали да приложите Гентамицин Актавис очна маз:

Ако сте пропуснали да приложите поредната доза, приложете я час по-скоро.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всеки друг лекарствен продукт, Гентамицин Актавис очна маз може за предизвика нежелани лекарствени реакции

Наблюдават се най-често леко парене в окото (очите), сърбеж, оток на клепача, които бързо преминават. При алергия към някоя от съставките на продукта се налага спиране на лечението.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на лекуващия лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

При температура под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се употребява след срока на годност, указан на опаковката

Срок на годност: 3 (три) години



6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяко допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

Актавис ЕАД

Бул. "Княгиня Мария Луиза" №2

1000 София, България

Тел. ++359 2 9321762; ++359 2 9321771

Последна актуализация на текста – Декември 2005 г.

