

# ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

## МЕДОКЛАВ 375 / МЕДОКЛАВ 375 л

филмирани таблетки

ОДОБРЕНО!  
ДАТА 20.06.06

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение с Медоклав.

- Пазете листовката! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако не сте сигурни за нещо или имате въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Лекарственият продукт е предписан само на Вас. Не го давайте на друг, защото той може да му навреди, дори и ако симптомите му изглеждат като Вашите.

### Какво трябва да знаете за Вашия лекарствен продукт?

Наименованието на Вашия лекарствен продукт е Медоклав 375.

Предлага се под формата на филмирани таблетки в концентрация:

- 250/125 mg – съдържаща 250 mg amoxicillin и 125 mg clavulanic acid;  
Двете лекарствени вещества са антибиотики.

Лекарственият продукт съдържа: amoxicillin (амоксициллин), под формата на амоксициллин трихидрат и clavulanic acid (клавуланова киселина), под формата на калиев клавуланат.

Комбинацията от двете вещества е известна като со-amoxiclav (ко-амоксикилав).

Таблетките съдържат помощни вещества: магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, силициев диоксид (колоиден, безводен), натриев нишестен гликолат, талк, диетилфталат, метилцелулоза, титанов диоксид и диметикон.

Медоклав е подходящ за употреба от диабетици, тъй като не съдържа захароза.

Медоклав е антибиотик, предназначен за лечение на инфекции, причинени от микроорганизми (бактерии). Той действа бактерицидно на микроорганизмите, причинили инфекцията (т.е. ги убива). Спада към групата на пеницилините.

Производител на Медоклав и притежател на разрешението за употреба е:

Medochemie Ltd, p.o box 51409, Limassol, CY-3505, Cyprus

Медоклав може да се използва за лечение на лекарствена болест от бактериални инфекции:



- на горните дихателни пътища (включително УНГ инфекции) – рецидивиращ тонзилит (повтарящо се възпаление на слизниците), отит на средното ухо (възпаление на средното ухо), синуит (възпаление на синусите);
- инфекции на долните дихателни пътища – пневмония и бронхопневмония, и обостряне на хроничен бронхит;
- инфекции на кожата и меките тъкани – дентален (зъбен) абсцес, ухапвания от животни, целулит;
- уро-генитални инфекции – цистит (възпаление на пикочния мехур), уретрит (възпаление на уретрата), пиелонефрит (бъбречно възпаление), инфекции на женската полова система, послеродов сепсис, септичен аборт;
- инфекции на костите и ставите: остеомиелит и др.;
- други инфекции – интраабдоминален сепсис (разпространение на инфекция, в следствие на вътрекоремна инфекция, чрез кръвта).

Ако не сте сигурни в нещо, запитайте Вашия лекар.

## **Преди да започнете лечение с Медоклав !**

Трябва да уведомите Вашия лекар в случай, че:

- при приемане на антибиотик сте имали кожни обриви или подуване на лицето;
- сте алергични към пеницилини или цефалоспорини;
- имате заболяване, наричано инфекциозна мононуклеоза (вирусно заболяване, протичащо с висока температура, подути и болезнени лимфни възли и в някои случаи възпалено гърло и увеличен черен дроб);
- страдате от хронична лимфоидна левкемия (хронично кръвно заболяване);
- имате бъбречни или чернодробни увреждания;
- сте бременна, смятате да забременеете или кърмите;
- използвате противозачатъчни таблетки. Необходимо е да използвате други противозачатъчни средства, напр. презервативи.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от тези лекарствени средства:

- allopurinol;
- лекарствени средства, повлиявящи кръвосъсирването (варфарин);
- противозачатъчни таблетки;
- probenecid;
- тетрациклинови антибиотици.



Добре е да уведомите Вашия лекар за всеки друг лекарствен продукт, който употребявате, включително и тези, които си купувате без рецептa.

## Какво трябва да правите, в случай на бременност и кърмене?

Информирайте лекаря, ако сте бременна или имате съмнения, че сте бременна. В случай че сте бременна, не трябва да приемате този лекарствен продукт, освен ако лекуващият лекар не Ви е посъветвал друго.

Може да кърмите, по време на лечение с Медоклав, само след преценка от лекаря на съотношението полза/риск.

## Влияе ли Медоклав върху способността за шофиране или работа с машини?

Не са наблюдавани ефекти на Medoclav върху способността за шофиране и работа с машини.

## Лечение с Medoclav!

Лекарят предписва дозата, която трябва да приемате. Винаги спазвайте указанията му. Те трябва да бъдат записани и върху опаковката. Винаги ги прочитайте. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Медоклав таблетки е подходящ само за възрастни и деца над 12 години.

*При леки до умерено тежки инфекции* - по една филмирана таблетка Medoclav 375mg три пъти дневно, на 8 часа.

*При тежки инфекции* – приложими са таблетки по 625 mg, или по една филмирана таблетка Medoclav 625 mg на същия производител, който се прилагат три пъти дневно, на 8 часа.

За зъбни инфекции препоръчителната доза е по една филмирана таблетка Medoclav 375mg три пъти дневно, на 8 часа.

### *Пациенти в старческа възраст:*

Не е необходима промяна на дозата при условие, че няма бъбречно и чернодробно увреждане. Лекарят ще определи необходимата доза.

### *Чернодробно увреждане:*

Няма достатъчно клинични данни за определяне на дозова схема. Поради това Medoclav трябва да се прилага със вниманиe при такива



пациенти и лекарят ще проследява периодично чернодробната Ви функция.

#### ***Бъбречни увреждания:***

При бъбречно увреждане лекарят може да определи по-ниска доза от обичайната, според степента на бъбречно увреждане.

#### **Начин на приложение:**

Таблетките трябва да се гълтат цели, с малко вода. Медоклав може да се приема непосредствено преди хранене. Чрез приложение на дозата преди хранене може да бъде сведена до минимум възможността от стомашно-чревно дразнене. Дозите се приемат на осем часов интервал.

Важно е да бъде продължен приемът, докато завърши пълният курс на лечението, дори и да се почувствате по-добре. В противен случай инфекцията може да се появи отново.

Ако пропуснете една доза приемете я, когато сте се сетили и след това продължете по същата схема. Не вземайте две дози за 1 час. Опитайте се интервалът между тях да бъде поне 4 часа.

Не употребявайте дози, по-високи от препоръчаните. Ако случайно вземете повече, свържете се с Вашия лекар или отидете в най-близката болница. Винаги носете със себе си опаковката, за да я покажете на лекаря.

#### **След лечение с Медоклав !**

При някои хора се появяват нежелани реакции при употреба на Медоклав.

Ако по време на лечението се появят следните реакции, прекратете приема и веднага уведомете Вашия лекар:

- обрив или сърбеж;
- оток на лицето и/или проблеми с дишането (хрипове, недостиг на въздух);
- тежка диария с кръвоизлив (рядко);
- потъмняване на урината (рядко);
- светли изпражнения (рядко);
- пожълтяване на кожата или бялото на очите.

Някои от тези реакции могат да се появят отново няколко седмици след приключване на лечението.

#### **По-чести реакции:**

- легко стомашно разстройство или диария, може да се предотврати като лекарството се взема непосредствено преди хранене;



- гъбична инфекция в устата, влагалището или кожните гънки.  
Вашият лекар ще Ви предпише лекарство в този случай.

### **Редки реакции:**

- потъмняване на зъбите; цветът им обикновено се възвръща след измиване, в края на лечението;
- бъбречно възпаление.

### **Много редки реакции:**

- хиперактивност, замаяност, главоболие и конвулсии; тези симптоми отшумяват;
- Кристалурия или образуване на кристали в урината, което може да се характеризира с потъмняване на урината или затруднения при уриниране. В такъв случай, трябва да приемате повече течности (безкофеинови, безалкохолни), за да се предотврати появата на кристалурия.

Ако ще Ви правят изследвания на кръвта или на черния дроб, съобщете, че в момента приемате Медоклав, тъй като той понякога може да промени резултатите от изследването.

Не се тревожете от този списък с възможни реакции. При Вас може да не се появи нито една.

Ако се появят други нежелани реакции, които според Вас се дължат на Медоклав, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

### **Как да съхранявате Вашето лекарство ?**

Съхранявайте таблетките при стайна температура ( $25^{\circ}\text{C}$ ), защитени от светлина и влага, в недостъпни за деца места.

Ако трябва да прекратите лечението с Медоклав или ако Ви е останала опаковка, върнете я на Вашия фармацевт.

Не използвайте лекарството след изтичане срока на годност. Той е отпечатан върху блистерите и върху картонената кутия, в която се намират таблетките.

### **Допълнителна информация !**

В тази листовка не е посочена пълната информация за Медоклав. Ако искате да знаете повече, или да получите допълнителна информация, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.



**ПОМНЕТЕ: Вашият лекар е предписал това лекарство за ВАС или ВАШЕТО ДЕТЕ. НИКОГА НЕ ГО ДАВАЙТЕ НА ДРУГ.**

**Не го използвайте след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.**

Дата на последна редакция на текста: Септември, 2005 г.

Информацията в тази листовка се отнася само за MEDOCLAV.

