

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА И АЛ

ОДОБРЕНО!
ДАТА 20.06.06

МЕДОСЛАВ 625 / МЕДОКЛАВ 625

филмирани таблетки

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение с Медоклав.

- Пазете листовката! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако не сте сигурни за нещо или имате въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Лекарственият продукт е предписан само на Вас. Не го давайте на друг, защото той може да му навреди, дори и ако симптомите му изглеждат като Вашите.

Какво трябва да знаете за Вашия лекарствен продукт ?

Наименованието на Вашия лекарствен продукт е Медоклав 625.

Предлага се под формата на филмирани таблетки в концентрация:

- 500/125 mg – съдържаща 500 mg amoxicillin и 125 mg clavulanic acid.

Двете лекарствени вещества са антибиотици.

Лекарственият продукт съдържа: amoxicillin (амоксициклин), под формата на амоксициклин трихидрат и clavulanic acid (клавуланова киселина), под формата на калиев клавуланат.

Комбинацията от двете вещества е известна като со-amoxiclav (ко-амоксиклав).

Таблетките съдържат помощни вещества: магнезиев стеарат, микрокристална целулоза, силициев диоксид (колоиден, безводен), натриев нишестен гликолат, талк, диетилфталат, метилцелулоза, титанов диоксид и диметикон.

Медоклав е подходящ за употреба от диабетици, тъй като не съдържа захароза.

Медоклав е антибиотик, предназначен за лечение на инфекции, причинени от микроорганизми (бактерии). Той действа бактерицидно на микроорганизмите, причинили инфекцията (т.е. ги убива). Спада към групата на пеницилините.

Производител на Медоклав и притежател на разрешението за употреба е:

Medochemie Ltd, p.o box 51409, Limassol, Cyprus



Медоклав може да се използва за лечение на голям брой бактериални инфекции:

- на горните дихателни пътища (включително УНГ инфекции) – рецидивиращ тонзилит (повтарящо се възпаление на сливиците), отит на средното ухо (възпаление на средното ухо), синусит (възпаление на синусите);
- инфекции на долните дихателни пътища – пневмония и бронхопневмония, и обостяне на хроничен бронхит;
- инфекции на кожата и меките тъкани – дентален (зъбен) абсцес, ухапвания от животни, целулит;
- уро-генитални инфекции – цистит (възпаление на пикочния мехур), уретрит (възпаление на уретрата), пиелонефрит (бъбречно възпаление), инфекции на женската полова система, послеродов сепсис, септичен аборт;
- инфекции на костите и ставите: остеомиелит и др.;
- други инфекции –интраабдоминален сепсис (разпространение на инфекция, в следствие на вътрекоремна инфекция, чрез кръвта).

Ако не сте сигурни в нещо, запитайте Вашия лекар.

Преди да започнете лечение с Медоклав !

Трябва да уведомите Вашия лекар в случай, че:

- при приемане на антибиотик сте имали кожни обриви или подуване на лицето;
- сте алергични към пеницилини или цефалоспорини;
- имате заболяване, наричано инфекциозна мононуклеоза (вирусно заболяване, протичащо с висока температура, подути и болезнени лимфни възли и в някои случаи възпалено гърло и увеличен черен дроб);
- страдате от хронична лимфоидна левкемия (хронично кръвно заболяване);
- имате бъбречни или чернодробни увреждания;
- сте бременна, смятате да забременеете или кърмите;
- използвате противозачатъчни таблетки. Необходимо е да използвате други противозачатъчни средства, напр. презервативи.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от тези лекарствени средства:

- allopurinol;
- лекарствени средства, повлияващи кръвосъсирването (варфарин);
- противозачатъчни таблетки;
- probenecid;



- тетрациклинови антибиотици.

Добре е да уведомите Вашия лекар за всеки друг лекарствен продукт, който употребявате, включително и тези, които си купувате без рецепта.

Какво трябва да правите, в случай на бременност и кърмене?

Информирайте лекаря, ако сте бременна или имате съмнения, че сте бременна. В случай че сте бременна, не трябва да приемате този лекарствен продукт, освен ако лекуващият лекар не Ви е посъветвал друго.

Може да кърмите, по време на лечение с Медоклав, само след преценка от лекаря на съотношението полза/риск.

Влияе ли Медоклав върху способността за шофиране или работа с машини?

Не са наблюдавани ефекти на Medoclav върху способността за шофиране и работа с машини.

Лечение с Medoclav!

Лекарят предписва дозата, която трябва да приемате. Винаги спазвайте указанията му. Те трябва да бъдат записани и върху опаковката. Винаги ги прочитайте. Ако не сте сигурни, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Медоклав таблетки е подходящ само за възрастни и деца над 12 години.

При леки до умерено тежки инфекции - по една филмирана таблетка Medoclav 375mg три пъти дневно, на 8 часа.

При тежки инфекции - приложима е доза от 625 mg или по една филмирана таблетка Medoclav 625 mg на същия производител, които се прилагат три пъти дневно, на 8 часа.

За зъбни инфекции препоръчителната доза е по една филмирана таблетка Medoclav 375mg три пъти дневно, на 8 часа.

Пациенти в старческа възраст:

Не е необходима промяна на дозата при условие, че няма бъбречно и чернодробно увреждане. Лекарят ще определи необходимата доза.



Чернодробно увреждане:

Няма достатъчно клинични данни за определяне на дозова схема. Поради това Medoclav трябва да се прилага с внимание при такива пациенти и лекарят ще проследява периодично чернодробната Ви функция.

Бъбречни увреждания:

При бъбречно увреждане лекарят може да определи по-ниска доза от обичайната, според степента на бъбречно увреждане.

Начин на приложение:

Таблетките трябва да се гълтат цели, с малко вода. Медоклав може да се приема непосредствено преди хранене. Чрез приложение на дозата преди хранене може да бъде сведена до минимум възможността от стомашно-чревно дразнене. Дозите се приемат на осем часов интервал.

Важно е да бъде продължен приемът, докато завърши пълният курс на лечението, дори и да се чувствате по-добре. В противен случай инфекцията може да се появи отново.

Ако пропуснете една доза приемете я, когато сте се сетили и след това продължете по същата схема. Не вземайте две дози за 1 час. Опитайте се интервалът между тях да бъде поне 4 часа.

Не употребявайте дози, по-високи от препоръчаните. Ако случайно вземете повече, свържете се с Вашия лекар или отидете в най-близката болница. Винаги носете със себе си опаковката, за да я покажете на лекаря.

След лечение с Медоклав !

При някои хора се появяват нежелани реакции при употреба на Медоклав.

Ако по време на лечението се появят следните реакции, прекратете приема и веднага уведомете Вашия лекар:

- обрив или сърбеж;
- оток на лицето и/или проблеми с дишането (хрипове, недостиг на въздух);
- тежка диария с кръвоизлив (рядко);
- потъмняване на урината (рядко);
- светли изпражнения (рядко);
- пожълтяване на кожата или бялото на очите.

Някои от тези реакции могат да се появят отново, няколко дни след приключване на лечението.



По-чести реакции:

- леко стомашно разстройство или диария; може да се предотврати като лекарството се взема непосредствено преди хранене;
- гъбична инфекция в устата, влагалището или кожните гънки. Вашият лекар ще Ви предпише лекарство в този случай.

Редки реакции:

- потъмняване на зъбите; цветът им обикновено се възвръща след измиване, в края на лечението;
- бъбречно възпаление.

Много редки реакции:

- хиперактивност, замаяност, главоболие и конвулсии; тези симптоми отшумяват;
- Кристалурия или образуване на кристали в урината, което може да се характеризира с потъмняване на урината или затруднения при уриниране. В такъв случай, трябва да приемате повече течности (безкофеинови, безалкохолни), за да се предотврати появата на кристалурия.

Ако ще Ви правят изследвания на кръвта или на черния дроб, съобщете, че в момента приемате Медоклав, тъй като той понякога може да промени резултатите от изследването.

Не се тревожете от този списък с възможни реакции. При Вас може да не се появи нито една.

Ако се появят други нежелани реакции, които според Вас се дължат на Медоклав, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Как да съхранявате Вашето лекарство ?

Съхранявайте таблетките при стайна температура (25°C), защитени от светлина и влага, в недостъпни за деца места.

Ако трябва да прекратите лечението с Медоклав или ако Ви е останала опаковка, върнете я на Вашия фармацевт.

Не използвайте лекарството след изтичане срока на годност. Той е отпечатан върху блистерите и върху картонената опаковка, в която се намират таблетките.



Допълнителна информация !

В тази листовка не е посочена пълната информация за Медоклав. Ако искате да знаете повече, или да получите допълнителна информация, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

ПОМНЕТЕ: Вашият лекар е предписал това лекарство за ВАС или ВАШЕТО ДЕТЕ. НИКОГА НЕ ГО ДАВАЙТЕ НА ДРУГ.

Не го използвайте след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Дата на последна редакция на текста: Септември, 2005 г.

Информацията в тази листовка се отнася само за **MEDOC LAV**.

