



NOBEL İLAÇ
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази листовка, тъй като в нея се съдържа важна за Вас информация. Ако искате да научите повече за този продукт или част от информацията в листовката не Ви е ясна, моля консултирайте се с Вашия лекар.

Tylo[®] Plus / Тайлол[®] Плюс

Таблетки

Какво съдържа Tylo[®] Plus?

Всяка таблетка Tylo[®] Plus съдържа 500 mg Paracetamol (Парацетамол) и 30 mg Caffeine (Кофеин).

Помощни вещества: царевично нишесте и стеаринова киселина.

Лекарствена форма и опаковка

Tylo[®] Plus можете да намерите в опаковка от 2 и 20 таблетки.

Какво представлява Tylo[®] Plus?

Tylo[®] Plus представлява комбинация от Paracetamol и Caffeine. Paracetamol облекчава болката и понижава високата телесна температура. Неговото болкоуспокояващо действие се осъществява чрез повишаване прага на болката, а температуропонижаващият му ефект се дължи на въздействието му върху центъра за регулация на температурата. Caffeine е стимулант на централната нервна система. Приемът на Caffeine съвместно с Paracetamol увеличава болкоуспокояващото му действие.

Какво лекува Tylo[®] Plus?

Tylo[®] Plus е показан за симптоматично лечение на състояния, които се характеризират с лека до умерена болка (ревматична болка, главоболие, мигрена, невралгия, зъбобол, възпалено гърло, менструални болки) и/или повишена телесна температура.

Кога не трябва да взимате Tylo[®] Plus?

Tylo[®] Plus не трябва да се прилага при пациенти, свръхчувствителни към Paracetamol, Caffeine или някое от помощните вещества на продукта и при такива с тежки чернодробни и бъбречни заболявания.

Преди да започнете лечението с Tylo[®] Plus моля, информирайте Вашия лекар, ако страдате от:

- чернодробни увреждания
- бъбречни увреждания
- сърдечни увреждания
- белодробни увреждания
- предшестваща анемия



Какво трябва да знаете докато приемате Tylo[®] Plus?

Този лекарствен продукт не трябва да се прилага за повече от 3 дни без лекарска консултация. Едновременното приложение с други Paracetamol-съдържащи продукти може да доведе до предозирание на Paracetamol и трябва да се избягва.

Приложение по време на бременност и кърмене

Препоръчително е приемът при бременни и кърмещи жени да става под лекарско наблюдение.

Може ли да се взима Tylo[®] Plus с други медикаменти?

Преди да започнете лечение с Tylo[®] Plus трябва да се посъветвате с Вашия лекар, ако:

- взимате лекарства, предписани Ви за лечение на гадене и повръщане (напр. метоклопрамид, домперидон) или за понижаване на нивото на холестерин (напр. холестирамин)
- взимате антикоагуланти (лекарства за разреждане на кръвта)

Да се избягва приемането на големи количества кафе, чай и алкохол по време на лечение с Tylo[®] Plus.

Влияе ли Tylo[®] Plus на способността за шофиране и работа с машини?

Няма данни Tylo[®] Plus да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Как се приема Tylo[®] Plus?

Tylo[®] Plus се приема през устата.

Препоръчителната дозировка на Tylo[®] Plus е посочена по-долу:

Деца от 7 до 11 години: по ½ таблетка 1 до 3 пъти за 24 часа.

Деца от 12 до 15 години: по 1 таблетка 1 до 3 пъти за 24 часа.

Дневната доза Paracetamol не трябва да надвишава 50 mg/kg. Дозовият интервал между два последователни приема на лекарството не трябва да е по-къс от 4 часа. За 24 часа трябва да се приемат максимално 4 таблетки (2 g Paracetamol).

Tylo[®] Plus не е подходящ за деца под 6 годишна възраст.

Възрастни: по 1-2 таблетки 1 до 3 пъти. За 24 часа трябва да се приемат максимум 8 таблетки (4 g Paracetamol).

Не превишавайте препоръчаната доза.

Какво да направите при предозирание?

Най-честите симптоми на предозирание се изразяват с гадене, повръщане, коремни болки, тремор, тахикардия и хипертензия. В случай на предозирание, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Какви нежелани ефекти може да причини Tylo[®] Plus?

Всяко лекарство може да има нежелани и неблагоприятни ефекти. В терапевтични дози, обикновено Paracetamol се понася добре. В редки случаи може да предизвика алергични реакции, като например обрив и сърбеж. В редки случаи при продължителен прием на по-високи дози може да се наблюдават различни промени в кръвната картина. Наличието на Caffeine в този лекарствен продукт, може да доведе до появата на тремор (треперене), повишаване на кръвното налягане и учестяване на пулса.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ



Как се съхранява Tylo!® Plus?

ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се пази от светлина и влага.

Притежател на разрешението за употреба

NOBEL ILAC SANAYII ve TICARET A.S.

Barbaros Bulvari 76-78

34353 Besiktas, Istanbul, Turkey

Производител

NOBELARMA ILAC SANAYII ve TICARET A.S.

Sancaklar Koyu 81100, Duzce, Turkey

Регистрационен №:

Дата на последна редакция на листовката: юли 2006 г.

