

ИАЛ
ОПОДРЕНСА
БГА 08.08.06г.

PANADOL® Baby suppositories (Paracetamol)
ПАНАДОЛ® за бебета супозитории (Парацетамол)

Моля, прочетете внимателно тази листовка.

Какво съдържа Panadol Baby супозитории?

Всяка супозитория съдържа 125 mg. paracetamol.

Също така съдържа като помощно вещество твърда мас.

Предлага се в опаковки съдържащи 10 супозитории.

За какво се прилага Panadol Baby супозитории?

Panadol Baby е предназначен за деца на възраст от 3 месеца до 3 години. Облекчава лека до умерена болка при никнене на зъбки, зъббол, главоболие и възпалено гърло и понижава температурата при настинки, грип и детски инфекции като например варицела, заушка, коклюш, морбили. Също така се препоръчва за понижаване на високата температура като пост-ваксинална реакция при деца над 3 месеца.

Как действа Panadol Baby супозитории? Panadol Baby съдържа парациетамол, който облекчава лека до умерена болка от различен произход и понижава повишената температура. Panadol Baby супозитории са лесни за прилагане, особено когато детето има затруднения при прегъщане или повръща.

ПРОВЕРЕТЕ ПРЕДИ ДА ДАДЕТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО

Да не се приема с други лекарства, съдържащи парациетамол.

Не давайте Panadol Baby на деца, алергични към парациетамол или към помощната съставка.

Консултирайте се с Вашия лекар преди да дадете Panadol Baby супозитории?

- ако детето има остро бъбречно или чернодробно заболяване.

Този лекарствен продукт не трябва да се прилага при пациенти с диария, насико прекарано възпаление или кървене в областта на дебелото черво.

Начин на приложение: Измийте ръцете си. Отстранете индивидуалната пластмасова опаковка на супозиторията. Внимателно поставете супозиторията в ректума с помощта на показалеца. Поставянето на супозиторията може да се улесни, ако детето легне на една страна и си сънне краката възможно най-близо под брадичката.

Дозировка: Деца от 3 месеца до 3 години:

Дневната доза се определя въз основа на теглото на детето. Обичайната дневна доза е 60 mg/kg, разпределена обикновено на 4 приема - 15 mg/kg. Да не се прилагат повече от 4 дози дневно и на интервал по-кратък от 4 часа.

Една супозитория се поставя в ректума на всеки 4 до 6 часа.

Да не се дава повече от 3 дни без консултация с лекар. Да не се дава на деца под 3 месеца освен по лекарско предписание.

Не надвишавайте посочената доза. Ако мислите, че детето е приело повече от препоръчаната доза, незабавно потърсете лекарска помощ, дори и, ако то се чувства добре.



Най-честите симптоми на предозиране са гадене, повръщане, болки в корема, липса на апетит, проявяващи се обикновено в първите 24 часа след предозирането.
Да не се приема през устата.

Какви нежелани лекарствени реакции биха могли да се наблюдават при Panadol Baby супозитории: Нежеланите реакции при парацетамол са редки. Може да се наблюдават алергични реакции, напр. кожен обрив. Макар и рядко е възможна появата на промени в кръвната картина и възпаление в областта на ректума.
Консултирайте се с Вашия лекар, ако наблюдавате някакви неочаквани реакции.

Срок на годност: Не използвайте след датата, посочена на опаковката.

Условия на съхранение: Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Притежател на разрешението за употреба:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, UK

Последна редакция на листовката Октомври 2005.

Panadol* е търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies. / GSK logo

