

Betnovate-NTM крем и унгвент

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Betnovate-N крем и унгвент съдържат по 0.1% бетаметазон (под формата на бетаметазон валерат) и 0.5% неомицин сулфат (3500 единици на грам или на милигравър).

Betnovate-N крем е бял, хомогенен, водноразтворим.

Betnovate-N унгвент е бял и е изготвен на парафинова основа.

ПОКАЗАНИЯ

Бетаметазон валерат е активен локален кортикостероид за лечение на тези възпалителни дерматози, които нормално се повлияват от локално кортикоидно лечение и често има ефект при трудно повлиявани състояния като псориазис.

Неомицин сулфат е широкоспектърен бактерициден антибиотик, ефективен срещу повечето бактерии, причиняващи най-често срещаните инфекции на кожата.

Betnovate-N е предназначен за лечение на следните състояния, при които е налична или възможна вторична бактериална инфекция: екземи при деца и възрастни, включително атопични и екзема нумуларе; пруриго нодуларис; псориазис (с изключение на генерализиран псориазис плаката); невродерматози, себорейни дерматити; контактни алергични реакции и като добавка към системното кортикоидно лечение при генерализирана еритродермия.

Betnovate-N може да се използва и за лечение на вторично инфицирани ухапвания от насекоми, както и на анално и генитално интегртиро.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

Betnovate-N се нанася на тънък слой върху засегнатия участък от кожата, два до три пъти дневно, до настъпване на подобреие. При необходимост лечението може да продължи с еднократно приложение на ден или през няколко дни. При липса на подобреие след две до четири седмици се препоръчва преоценка на диагнозата.

Betnovate-N крем е особено подходящ при влажни и подмокрящи кожни повърхности, а Betnovate-N унгвент - при сухи, лихенифицирани или покрити с люспи повърхности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Betnovate-N е противопоказан при розацеа, акне вулгарис и периорален дерматит, първични вирусни инфекции на кожата (напр. херпес комплекс и варицела), както и при свръхчувствителност към някоя от съставките на препарата.

Betnovate-N не е показан за лечение на първично инфицирани кожни лезии, предизвикани от гъбички (напр. кандидоза и тинеа) или от бактерии (напр. импетиго), както и при перианален и генитален пруритус.

Betnovate-N не е показан за лечение на дерматози при деца под една година, включително дерматит и кожни обриви, причинени от пелени.

Лекарства, съдържащи неомицин, не трябва да се използват за лечение на отит на външното ухо, при налична перфорация на тъпанчето, поради опасност от ототоксичност.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Продължителното непрекъснато локално лечение с кортикоиди по възможност трябва да се избягва, особено при бебета и деца, тъй като може да настъпи потискане на надбъбречната функция, дори при приложение без оклузия.

При продължително лечение с мощни локални кортикоиди могат да настъпят атрофични промени, предимно върху лицето. Това трябва да се има предвид при лечение на заболявания като псориазис, дискоиден еритематозен лупус и тежки екземи.

При прилагане на Betnovate-N върху клепачите трябва да се внимава препаратурът да не попадне в очите, поради опасност от глаукома.

В случаите, когато Betnovate-N се прилага при деца или върху лицето лечението трябва да се ограничи при възможност до пет дни, като засегнатите участъци не трябва да се покриват с оклузивна превръзка.

Приложението на локалните кортикоиди за лечение на псориазис изисква специално внимание от страна на лекаря, поради рисък от хронифициране, развитие на толеранс, рисък от генерализиран пустулозен псориазис и развитие на локална или системна токсичност, причинена от нарушената защитна функция на кожата.

Всяко генерализиране на вторичната инфекция изисква спиране на лечението с локални кортикоиди и провеждане на системно противомикробно лечение. Бактериалната инфекция се влошава при затопляне и овлажняване на кожата, вследствие на оклузивната превръзка, поради което засегнатият участък трябва да се почисти преди налагане на нова превръзка.

В случай, че след 7 дневен курс на лечение с локални кортикоиди не настъпи клинично подобреие, приложението трябва да се прекрати, поради опасност от скрито разпространение на инфекцията, дължащо се на маскирация ефект на кортикоидите.

Широката и честа употреба на препарата може да увеличи риска от контактни алергични реакции.

Внимание: Продукти, които съдържат противомикробни вещества не трябва да се разреждат.

БРЕМЕННОСТ

Няма достатъчно клинични данни за безопасността на Betnovate-N при бременността на жените. Локалното приложение на кортикоиди върху бременностни животни понякога води до неправилно развитие на плода, като вродена цепка на небцето и вътрешматочно забавяне на растежа. Ето защо може да съществува известен малък рисък от увреждания на плода и при човека.

Използването на неомицин може да бъде свързано с теоретичен рисък от ототоксичност за плода (виж Противопоказания).

СТРАНИЧНИ ДЕЙСТВИЯ

Продължителното и интензивно лечение с високо активни кортикоидни препарати може да предизвика локални атрофични изменения на кожата като изтъняване, стрии и разширяване на повърхностните кръвоносни съдове, особено при използване на оклузивни превръзки и засягане на кожни гънки.

Както при другите локални кортикоステроиди, продължителното използване на големи количества или лечението на обширни участъчи от кожата може да доведе до значима системна абсорбция, в резултат на което да се появят признаци на хиперкортицизъм и потискане на хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната система. Тези ефекти са най-вероятни при бебета и деца и при използване на оклузивни превръзки. Пелените при бебетата могат да имат ефекта на оклузивна превръзка.

Съществуват съобщения за пигментационни промени и хипертрихоза при използването на локални кортикоステроиди.

Рядко лечението на лекоразис с кортикоステроиди (или прекратяването му) провокира пустулозната форма на заболяването (виж Предпазни мерки).

Обикновено всички форми на Betnovate се понасят добре, но при появява на признаци на свръхчувствителност, лечението трябва да се преустанови незабавно.

ПРЕДОЗИРАНЕ

Вероятността от остро предозиране е много малка, но в случай на хронично предозиране или при неправилна употреба, могат да се появят признаци на хиперкортицизъм, при което лечението с локални кортикоステроиди трябва да се преустанови.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРЕДПАЗНЕ МЕРКИ

Betnovate-N крем и унгвент се съхраняват при температура под 30°C.

ОПАКОВКИ

Betnovate-N крем и Betnovate-N унгвент са в тубички по 15 грама.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Betnovate-N крем и унгвент не съдържат ланолин или парабени.

Betnovate-N крем и унгвент се прилагат само по лекарско предписание.

Произведено за България
от Glaxo Wellcome Operations UK Ltd
Грайнфорд, Англия