



УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

BATRAFEN

Solution 20ml

Батрафен
Разтвор 20 мл

Активно вещество – **ciclopirox olamine**

Състав

В 1 мл Батрафен разтвор се съдържат 10mg **ciclopirox olamine**
Помощни вещества: изопропилов алкохол, макрогол 400, пречистена вода.

Какъв тип лекарство е Батрафен ?

Батрафен е антимикотично средство, което се отличава с широк спектър на действие и големи възможности за проникване в кожата. Циклопироксоламинът, който се съдържа в Батрафен разтвор притежава противовъзпалително и антибактериално действие върху грам-положителните и грам- отрицателните микроорганизми.

Показания:

Всички видове гъбичкови инфекции на кожата.

Притежател на разрешението за употреба

Aventis Pharma San.ve Tic.Ltd. Sti.

V Plaza Buyukdere Cad. № 5

34394 Mecidiyekoy - Istanbul

Кога не трябва да се използва Батрафен ?

Противопоказания

Лекарството не трябва да се прилага при пациенти, за които е известно, че имат свръхчувствителност към активното вещество **ciclopirox olamine** или към което и да е от помощните вещества.
Батрафен разтвор не трябва да се прилага на деца.

Как и кога да се използва Батрафен ?

Дозировка и начин на приложение



Дневни дози

Batrafen solution се прилага върху инфектираната област два пъти дневно.

Начин на приложение

Разтворът внимателно се втрива и се оставя да засъхне на въздуха. . Лечението трябва да продължи до отзвучаване на симптомите (обикновено 2 седмици). За предотвратяване на повторна инфекция, препоръчително е това лекарство да се прилага в продължение на една или две седмици след изчезване на всички клинични симптоми.

Какво да се вземе под внимание при употребата на Батрафен ? Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Да не се допуска попадането на Batrafen solution в очите.
Допълнителните хигиенни мерки, препоръчани от лекаря, трябва да се спазват стриктно.
След прилагане на лекарството, да се измиват старательно ръцете от него.

Как можете допълнително да подпомогнете лечението ?

Избягвайте облекло или обувки, задържащи топлината и влагата.
След измиване, баня или душ внимателно подсушете кожните гънки и ги поддържайте сухи.

Кърпите и кесиите, които са в съприкосновение със засегнатите от гъбички участъци на кожата, трябва да се сменят ежедневно и да се перат поне при 60°C , а още по-добре при 95°C . За препоръчване е да се използват кърпи за еднократна употреба.

Не разчесвайте засегнатите сърбящи участъци от тялото, това може да доведе до разпространяване на заболяването. При гъбичково заболяване на краката тръбва по възможност да пазите обувките си от заразяване. Това можете да постигнете с напръскване на антимикотична пудра в обувките. При най- малкото подозрение за подновяване на инфекцията трябва незабавно да потърсите Вашия лекар.

Употреба по време на бременност и кърмене

По време на бременност и кърмене Batrafen solution не се прилага поради липса на клинични данни.

Влияние върху способността за шофиране и управяване на машини

Няма съобщения за влияние на лекарството върху способността за шофиране и управление на машини.



Нежелани лекарствени реакции

В отделни случаи, по време на лечение с Batrafen solutio, е възможно да се усети сърбеж или парене с кожно дразнене. В случаите на прилагане върху големи площи и за продължителен срок от време, трябва да се вземе предвид повишаването на концентрацията на лекарството на третирани участъци кожа, поради непрекъснато повтарящия се процес на абсорбция.

Как се съхранява това лекарство ?

Да се съхранява на тъмно под 25°C

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

Да не се използва след изтичане срока на годност.

Вид на опаковката

Шишенца с 20 мл разтвор

Дата на последната редакция на текста

Октомври 200

