

Информация за пациента

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство. Ако не разбирате нещо или имате допълнителни въпроси, обърнете се към Вашия лекуващ лекар. Запазете я, защото може да се наложи да я прочетете отново. Това лекарство е предписано лично на Вас и не трябва да го давате на други. То може да им навреди, дори ако симптомите им са същите като Вашите.

RIMICID®
РИМИЦИД®
Таблетки

**КАКВО СЪДЪРЖА РИМИЦИД?**

Всяка таблетка съдържа лекарствено вещество isoniazid в количество 100 mg. Помощни вещества: пшенично нишесте, талк.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Таблетки по 50 броя в блистер от ПВХ/алуминиево фолио. По 2 блистера заедно с листовка в картонена кутия.

**ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ
СОФАРМА АД**

София 1220, ул. "Илиенско шосе" 16, България

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РИМИЦИД?

Римицид е лекарство за лечение на туберкулоза. Лекарственото вещество изониазид принадлежи към групата на хидразидите. Действа на вътреклетъчно и извънклетъчно разположените туберкулозни бактерии, като убива бързо размножаващите се и потиска растежа на тези в неактивна фаза.

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА РИМИЦИД?


В комбинация с други лекарства за лечение на активна белодробна и извънбелодробна туберкулоза; микобактериози; латентна туберкулозна инфекция; лечение на туберкулоза в съчетание с други заболявания - карцином, СПИН; кожна лайшманиоза.

Самостоятелно или с рифампицин за профилактика на туберкулозата при пациенти от високорискови групи - при положителна проба Манту, при болни на хемодиализа, при носители на вируса на СПИН, диабетици, болни на кортикостероидно лечение, с остатъчни фиброзни изменения и калцификати.

КОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РИМИЦИД?

РИМИЦИД не трябва да се прилага в следните случаи:

- Свръхчувствителност към изониазид, етионамид, пиразинамид, ниацин и други химически сходни с тях медикаменти, свръхчувствителност към помощните вещества;
- Тежки форми на алкохолизъм;
- Тежки нарушения на чернодробната функция;
- Тежки нарушения на бъбречната функция;



- Епилепсия или други гърчови състояния;
- Прекаран детски паралич (полиомиелит).

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ЛЕЧЕНИЕ С РИМИЦИД

Уведомете лекуващия си лекар в случай, че имате някакво хронично заболяване, свръхчувствителност към лекарства или храни или вземате други лекарства.

Предпазни мерки и предупреждения

Уведомете лекуващия си лекар в случай, че:

- Предразположени сте към гърчове, в миналото сте прекарвали психично заболяване, страдате от чернодробни или бъбречни нарушения, страдате от диабет, алкохолизъм, уремия (повишени стойности на урея в кръвта), СПИН, сърдечна и белодробна недостатъчност, високо кръвно налягане, исхемична болест на сърцето, атеросклероза, микседем, екзема, псориазис.
- При поява на чувство на умора, липса на апетит и гадене – обърнете се към лекуващия лекар. Възможно е той да преустанови лечението с изониазид.
- Не пренебрегвайте прегледа на очите, назначаван Ви периодично от лекаря по време на лечение с изониазид.
- Лечението с изониазид се провежда в комбинация с други лекарства, за да се избегне развитието на устойчиви към лекарственото вещество туберкулозни бактерии.
- Лекарственият продукт съдържа пшенично нишесте. Съществува риск от влошаване на състоянието при хора с цьолиакия (глутенова ентеропатия).

Бременност и кърмене

Уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Преди да започнете употреба на някакво лекарство по време на бременност, непременно се посъветвайте с лекуващия си лекар.

Изониазид е подходящ за лечение на туберкулоза при бременни жени. Приема се заедно с витамин В6.

В периода на кърмене е необходимо внимателно да се наблюдават кърмачетата за поява на евентуални нежелани реакции.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Поради нежеланите ефекти, които се наблюдават при някои пациенти по време на лечение с Римицид (световъртеж, превъзбуденост, психози, нарушение на походката) е необходимо повишено внимание при шофиране и работа с машини.

КАКВИ ЛЕКАРСТВА МОЖЕ ДА ВЗАИМОДЕЙСТВАТ С РИМИЦИД?

Моля, уведомете лекуващия си лекар за ВСИЧКИ лекарства, които употребявате в момента или сте вземали доскоро, независимо дали са предписани от лекар или са купени без рецепта.

Това е важно, защото Римицид може да промени активността на някои лекарства или някои лекарства може да променят неговите ефекти.

Уведомете лекуващия си лекар ако приемате:

- Карбамазепин и фенитоин (за лечение на епилепсия), етосукцимид и рифампицин (лекарства за лечение на туберкулоза), диазепам (използван при неврози), теофилин (за лечение на бронхиална астма), циклосерин (противотуморно средство), варфарин (лекарство с противосъсирващо действие), кетоназол (противогъбичково), кортикостероиди (хормонални лекарства),



парацетамол (обезболяващо и температуропонижаващо лекарство средство), дисулфирам (за лечение на алкохолизъм), продукти за лечение на язвена болест.

- При употреба на алкохол ефективността от лечението с изониазид се намалява. Рискът от поява на нежелани реакции от страна на периферната нервна система се повишава при лечение с изониазид и употреба на алкохол.
- Сърцебиене, ускорена сърдечна дейност, главоболие, дразнене на очната лигавица, учестено дишане, засилено потоотделяне са наблюдавани при прием на изониазид след консумация на сирене, червено вино, някои видове риба, което повишава опасността от проява на свръхчувствителност и повишено кръвно налягане.

ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Дозата и продължителността на лечение се определят от лекуващия Ви лекар.

Начин на приложение – през устата, на гладно.

Дозирането е в зависимост от възрастта, теглото и функционалното състояние на организма.

Препоръчвани дози: за възрастни – 300 mg еднократно дневно; за деца – 10 mg/kg тегло, но не по-високи от 300 mg дневно.

Продължителността на лечението и профилактиката са индивидуални, в зависимост от фазата на заболяването и се определят от лекуващия лекар.

Минимален курс на лечение - 2 месеца, максимален - 9 месеца.

Минимален курс на профилактика – 3 месеца, максимален – 1 година.

Ако вземете повече таблетки, отколкото трябва

Ако сте взели доза, по-голяма от предписаната, се посъветвайте с лекуващия си лекар.

Дози от 2 до 3 g (20-30 таблетки) изониазид са потенциално токсични.

Незабавно се обърнете към лекуващия лекар в случай, че се появи възбуда, имате халюцинации, разширение на зениците, повишени рефлексии, главоболие, треперене, пристъпи от гърчове, понижени стойности на кръвното налягане, изпотяване, чувство на затопляне, зачервяване на лицето.


Ако пропуснете поредната доза Римицид

Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Продължете да вземате лекарството, както Ви е предписано.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства Римицид може да има нежелани ефекти. Те обаче не се наблюдават задължително при всички пациенти, така че Ви може да не получите никаква нежелана лекарствена реакция

Когато се използва в предписаните лечебни дози изониазид е с добра поносимост. Много рядко могат да се наблюдават: гадене, повръщане, сухота в устата, запек; намаляване или пълна липса на гранулоцити в периферната кръв; анемия, понижен брой тромбоцити; повишаване броя на еозинофилите; кръвоизливи в кожата и лигавицата, зачервяване на лицето, подобно на това при вълчанката, болки в ставите, ревматичен синдром, атипични пневмонии; пелагра - кожно заболяване,



вследствие недостиг на витамините от групата на В-комплекс; повишена кръвна захар; нарушения на периферната нервна система по-често се проявяват при болни с туберкулоза в съчетание с други заболявания, като: диабет, бъбречни нарушения, при бременни, алкохолизъм, непълноценно хранене, болни с онкологични заболявания; потискане функцията на дихателния център; повишени рефлексивни реакции на свят; задръжка на урината; бързопреходен обрив.

Ако се появят нежелани ефекти, включително и такива, които не са споменати в тази листовка, информирайте лекуващия си лекар.

СЪХРАНЕНИЕ

На защитено от светлина място под 25°C.

Съхранявайте таблетките в оригиналната опаковка.

Съхранявайте таблетките на сигурно място, където децата не могат да ги видят и достигнат!

СРОК НА ГОДНОСТ

Не трябва да се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

НАЧИН НА ОТПУСКАНЕ

По лекарско предписание.

Тази листовка е редактирана за последен път: Февруари 2006 год.

