

UROSTIM® 25mg
УРОСТИМ® 25mg
за деца
UROSTIM® 50mg
УРОСТИМ® 50mg
за възрастни



Състав

Лекарствено вещество-Всяка таблетка Уростим® съдържа 50 mg лиофилизирано лекарствено вещество или 25 mg лиофилизирано лекарствено вещество съставено от убити бактериални култури от следните микробни видове: Escherichia coli 29 в количество съответстващо на 3×10^9 бактериални клетки, Escherichia coli J5 в количество съответстващо на 3×10^9 бактериални клетки и Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae в количества съответстващи на по $0,4 \times 10^9$ бактериални клетки от всеки вид за възрастни и съответно за деца Escherichia coli 29 в количество съответстващо на $1,5 \times 10^9$ бактериални клетки, Escherichia coli J5 в количество съответстващо на $1,5 \times 10^9$ бактериални клетки и по $0,2 \times 10^9$ бактериални клетки от микробните видове Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae. Съдържа от 0,001 до 0,1 mg формалдехид.

Помощни вещества за Уростим® таблетки в g

	Уростим® 50mg	Уростим® 25mg
Микрокристална целулоза	0,056	0,042
Пшенично нишесте	0,055	0,041
Колоидален силициев диоксид безводен	0,006	0,003
Повидон	0,010	0,007
Магнезиев стеарат	0,003	0,002
Декстран 40 включен в състава на лекарственото вещество	0,028	0,014

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ: - UROSTIM® представлява полибактериален имуностимулатор, който повишава естествената резистентност на организма и специфичния имунитет към различни



инфекции на урогениталния тракт чрез стимулиране на хуморалните и клетъчни фактори на имунната система. Активира системния и локален имунитет.

ПОКАЗАНИЯ: - Препаратът УРОСТИМ® е предназначен за перорална имунотерапия и имунопрофилактика на остри, рецидивиращи или хронични неспецифични заболявания на урогениталния тракт при деца и възрастни, независимо от вида на причинителя. Особено препоръчително е приложението му при цистити, приелонефрити, уретрити, простатити, безсимптомна бактериурия и др. При необходимост се прилага с антибиотична терапия. Особено показано е приложението на Уростим® при лица с потисната имунологична релаксарственост в резултат от продължителна антибиотична терапия.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Противопоказан е в случаите на автоимунни заболявания с повишен синтез на антитела.


НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ: Досега не са наблюдавани нежелателни реакции след приложение на УРОСТИМ®. Клиничните резултати показват много добра поносимост.

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: Не е наблюдавана несъвместимост с други лекарствени средства. Urostim® може да бъде комбиниран с всяко друго лечение, включително и с антибиотична терапия. Позволява многократно приложение без опасност от привикване.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА И СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Не се препоръчва да се прилага през първите три месеца на бременността. Препаратът съдържа пшенично нишесте, което може да представлява опасност за хора с цьолиаккия.

ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Urostim® се прилага под формата на таблетки от 50 mg за възрастни и за деца на възраст от 8 месеца до 14 години - таблетки по 25 mg. В остър стадий на урогенитални инфекции едновременно с антибиотичната терапия се приема по една таблетка сутрин преди ядене до изчезване на симптомите, но не по-малко от 10 последователни дни.

При хронични или рецидивиращи урогенитални инфекции се прилага по една таблетка сутрин преди ядене в течение на 2-3



поредни месеца. След прекъсване най-малко три месеца е възможно повторение на лечебния курс.

За профилактика на постоперативни усложнения - един месец преди операцията и един месец след операцията да се приема по 1 таблетка дневно.

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекуващия лекар.

СЪХРАНЕНИЕ: Да се съхранява на тъмно при температура под 25°C на места недостъпни за деца.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА: Таблетки 50 mg за възрастни и таблетки 25 mg за деца, по 30 броя в опаковка.

СРОК НА ГОДНОСТ: 36 месеца от датата на производство. Да не се използва лекарственото средство след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ: Таблетките са с бял до бледо-кафяв цвят с мозаечна структура. Таблетки с променен външен вид, напукани и/ или натрошени да не се използват.

Производител – БУЛ БИО НЦЗПБ ЕООД, София 1504, бул. "Янко Сакъзов" 26, тел 846 81 55.

Последна редакция 25.08.2004.

