

Какво трябва да знаете за Ceclo^r MR (Цеклор MR)

Моля, прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да взимате Вашето лекарство. Тя не съдържа цялата информация за Вашето лекарство, която може би е необходимо да знаете, затова, ако имате някакви въпроси се обърнете към Вашия лекар или фармацевт. Листовката се отнася само за таблетките *Ceclo^r MR*.

Какво съдържа Вашето лекарство?

Вашето лекарство се нарича *Ceclo^r MR*. Неговата активна субстанция е сефацлор (цефаклор). Това е таблетка с "удължено разтваряне" в стомаха. Всяка таблетка *Ceclo^r MR* от 500 милиграма съдържа 500 милиграма (mg) цефаклор. Таблетките съдържат още неактивните съставки: маңитол, метилхидроксипропил целулоза, хидроксипропил целулоза, метакрилова киселина кополимер, стеаринова киселина, магнезиев стеарат, полиетилен гликол и пропилен гликол. Цветовете са титаниев двуокис (E171) и индиго кармин (E132). Те са в опаковка по 10 таблетки.

Ceclo^r MR е антибиотик. Антибиотиците помагат на организма да се пребори с инфекцията. *Ceclo^r MR* действа чрез разрушаване на дадения микроорганизъм, причинител на инфекцията.

Ceclo^r MR се произвежда от Eli Lilly S.p.A., Via Gramsci, Sesto Fiorentino, Florence, Italy.

Защо *Ceclo^r MR*?

Ceclo^r MR се използва за лечение на бактериални инфекции, включително възпаление на гърлото, бронхити и пневмония, цистит, кожни инфекции като цирей, и инфектирани рани.

Преди да се лекувате с *Ceclo^r MR*

Трябва да сте сигурни, че *Ceclo^r MR* е безопасен за Вас. Не трябва да се дава на деца.

Ако отговорите с ДА на някой от следващите въпроси или не сте сигурни, кажете на Вашия лекар или фармацевт.

- Имали ли сте някога алергична реакция към антибиотици като пеницилин или цефалоспорици или към някои от съставките изброени по-горе или към друг тип медикамент? (Алергичната реакция може да включва обрив, сърбеж, оток или затруднено дишане)
- Бременна ли сте или бихте ли могли да сте?
- Кърмите ли?

- Имате ли проблеми с бъбреците или сте на диализа?
- Диабетик ли сте? *Ceclor MR* може да взаимодейства с някои тестове за захар в урината.

Ако взимате “антиациди” (вид лекарства за храносмилателната система), моля, вижте следващия раздел.

Как се прилага *Ceclor MR*

Следвайте инструкциите на Вашия лекар. Погледнете на опаковката, за това колко таблетки да взимате и колко често да ги взимате.

Обичайни дози :

Възпаление на гърлото, инфекции на кожа и меки тъкани: 375 милиграма два пъти дневно.

Инфекции на долните пътища на пикочо-половата система и при бронхити: 375 милиграма два пъти дневно или 500 милиграма два пъти дневно.

По-високи дози могат да бъдат необходими в случай на по-тежки инфекции като пневмония, синусити: 750 милиграма два пъти дневно.

Ако не сте сигурни колко таблетки да взимате, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

- Глътнете таблетките цели с вода по време на хранене
- Не взимайте “антиацидно” лекарство поне до 1 час след взимане на таблетките.
- Трябва да взимате лекарството, толкова дълго, колкото Ви е казал Вашия лекар. Обикновено периода е за 7 до 14 дни. Не спирайте да ги взимате, когато се почувствате добре, защото след това може да се почувствате по-зле.
- Ако сте пропуснали да вземете таблетката, то я вземете веднага щом можете. Ако обаче сте пропуснали няколко приема, уведомете Вашия лекар.
- Не взимайте повече таблетки, отколкото Ви е казал Вашия лекар. Ако сте взели повече отколкото трябва, отидете до най-близкото спешно звено или кажете веднага на Вашия лекар.

Докато се лекувате с *Ceclor MR*

- Таблетките могат да предизвикат нежелани лекарствени реакции като диария, гадене, повръщане или разстройство в храносмилането, вагинални смущения или сърбеж. Ако има кръв в диаричните изпражнения или слюз, обърнете се към Вашия лекар.
- Ако имате алергична реакция като обрив, сърбеж или внезапно нараснало затруднение в дишането, спрете взимането на таблетките и уведомете веднага Вашия лекар.
- При няколко пациента е било наблюдавано главоболие, замаяност или сънливост. Рядко, пациентите са имали нервни разстройства като

нервност или обърканост или проблеми със заспиването. Рядко, изследванията са показали преходни промени в броя на кръвните клетки или във функцията на черния дроб и бъбреците.

Ако имате някоя от изброените нежелани лекарствени реакции, кажете на Вашия лекар. Той/ тя има повече информация за *Ceclor MR* и ще Ви каже какво да правите.

Как да съхранявате Вашето лекарство

Да не се взимат таблетките след срока на годност отбелязан върху опаковката.

Съхранявайте таблетките на стайна температура под 30°C, на тъмно място и далеч от достъп на деца, тъй като таблетките могат да им навредят.

Внимание: Това лекарство не е предназначено за употреба при деца.

Запомнете: Това лекарство е за Вас. Може да бъде предписано само от лекар. Никога не го давайте на други. То може да им навреди, дори симптомите при тях да са същите като Вашите.

Дата на изготвяне на листовката: Юни 2000г.