



RGD: 62884/E/2
10.05.2005

Информация за пациента

TAMCOL (TAMSOL) капсули с изменено освобождаване 0,4 mg

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да приемате лекарството.

- Моля, пазете листовката. Възможно е да поискате да я прочетете отново.
- Ако искате да знаете повече за Вашето лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Лекарят е предписал лекарството лично на Вас и не трябва да го давате на друг. Възможно е да му навреди, дори симптомите му да са същите като Вашите.

В тази листовка може да прочетете:

1. Какво представлява TAMCOL капсули с изменено освобождаване 0,4 mg и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на TAMCOL капсули с изменено освобождаване 0,4 mg
3. Как да се приема TAMCOL капсули с изменено освобождаване 0,4 mg
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате TAMCOL капсули с изменено освобождаване 0,4 mg

TAMCOL капсули с изменено освобождаване 0,4 mg

Активното вещество е 0,4 mg tamsulosin hydrochloride във всяка капсула с изменено освобождаване.

Помощните вещества са:

Пълнеж: калциев стеарат, триетилов цитрат, талк, метакрилова киселина – етилакрилов кополимер 1:1 (включително: полисорбат 80, натриев лаурилсулфат), микрокристална целулоза.

Обвивка на капсулата: жълт железен оксид (E172), черен железен оксид (E172), червен железен оксид (E172), титаниев диоксид (E171), желатин.

Вид:

Пълнеж: бял или светлосив, със съдържание на зрънца

Обвивка на капсулата: размер №2; запушалка: стандартно матово кафяво; тяло: матово светлобежово.



Опаковка:

30 бр. капсули с изменено освобождаване са поставени в безцветен, прозрачен PVC/PVDC/Al блистер и картонена кутия.

100 бр. капсули с изменено освобождаване са поставени в безцветен, прозрачен PVC/PVDC/Al блистер и картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

Gedeon Richter Ltd., Budapest, Hungary.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТАМСОЛ КАПСУЛИ С ИЗМЕНЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ 0,4 MG И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Тамсол се използва за лечението на симптоми, свързани с доброкачествена простатна хиперплазия (ДПХ) при мъже, като затруднено уриниране, инконтиненция (незадържане) на урината, честа и незабавна нужда за уриниране.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ТАМСОЛ КАПСУЛИ С ИЗМЕНЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ 0,4 MG

Не приемайте Тамсол капсули с изменено освобождаване 0,4 mg:

- Ако сте свръхчувствителен (алергичен) към тамсулозин хидрохлорид или някое от помощните вещества на лекарството.
- Ако страдате от тежка чернодробна недостатъчност.
- Ако се чувствате замаян, когато седате или се изправяте.

Преди започване на лечението Вие трябва да информирате Вашия лекар, ако страдате от някакво друго заболяване, особено увреждания на бъбреците и черния дроб, болести на сърдечно-съдовата система.

Приемане на други лекарства:

Моля, уведомете Вашия лекар, ако приемате или наскоро сте приемали някакви други лекарства, дори такива, които не са по лекарско предписание. Някои лекарства (например лекарства, предпазващи от кръвосъсирване, наречени антикоагуланти, противовъзпалителни лекарства като диклофенак) могат да повлияят върху ефекта на тамсулозин. Поради това, Вие може да приемате съвместно с тамсулозин само лекарства, които Вашият лекар позволи.

Бременност, кърмене

Тамсол капсули с изменено освобождаване 0,4 mg е **предназначен само за мъже пациенти.**

Шофиране и работа с машини

Тамсол капсули с изменено освобождаване 0,4 mg може да повлияе неблагоприятно върху способността за шофиране и работа с машини. Трябва да



се вземе предвид, че при някои пациенти може да се появи сънливост, замъглено виждане, замаяност и синкоп.

3. КАК ДА СЕ ПРИЕМА ТАМСОЛ КАПСУЛИ С ИЗМЕНЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ 0,4 MG

Винаги приемайте Тамсол капсули с изменено освобождаване 0,4 mg точно така, както Вашият лекар Ви е предписал. Ако лекарството не Ви е предписано от Вашия лекар, обичайната дозировка е една капсула дневно, която трябва да се приема всеки ден след едно и също хранене. Капсулата трябва да се поглъща цяла и не трябва да се счусква или сдъвква.

Ако пропуснете да приемете Тамсол капсули с изменено освобождаване 0,4 mg:

Приемете пропуснатата капсула на същия ден. На следващия ден обаче не приемайте двойна доза; продължете лечението с една капсула дневно.

Ако приемете Тамсол капсули с изменено освобождаване 0,4 mg повече, отколкото трябва:

Обърнете се към Вашия лекар или посетете спешното отделение в най-близката болница, тъй като последиците от случайно или преднамерено приета свръхдоза могат да изискват медицинска намеса.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Тамсол капсули с изменено освобождаване 0,4 mg също може да причини нежелани лекарствени реакции.

Замаяност, особено когато сядате или се изправяте от стола или леглото; ретроградна еякулация (еякулация в пикочния мехур), умора, главоболие, сърцебиене, запушване или секреция от носа; могат да се срещнат реакции на свръхчувствителност като зачервяване, сърбеж и локално подуване. Рядко се наблюдава слабост.

Много рядко се среща приапизъм (болезнена, постоянна, принудителна ерекция на половия член), в този случай се налага незабавна медицинска помощ.

Ако се чувствате замаян или отпаднал, седнете или легнете, докато се почувствате по-добре.

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка, моля, информирайте Вашия лекар.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ТАМСОЛ КАПСУЛИ С ИЗМЕНЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ 0,4 MG

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.



Няма специални условия за съхранение на този продукт.

Не използвайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

Дата на последна редакция:

