

**Информация за пациента на лекарство отпускано само по лекарско предписание. Моля прочетете внимателно!**

**Cholagol®**  
oral drops, solution

**Холагол®**  
капки перорални, разтвор

**Състав**

*Активни съставки:* Curcumae radicis pigmenta 0,0225 g, Frangulaemodinum 0,009 g, Menthae piperitae etheroleum 3,6 g, Eucalypti etheroleum 1,926 g, Magnesii salicylas 0,18 g в 10 ml разтвор.

*Помощни вещества:* Ethanol anhydrate C, Menthol, Olive oil

1 ml = 30 капки

**Фармакотерапевтична група**

Холеретично и холекинетично средство.

**Действие**

Активните съставки съдържащи се в препарата са предимно от растителен произход. Повечето от тях стимулират образуването и отделянето на жълчната. Освен това Холагол облекчава спазмите на гладката мускулатура на жълчните пътища и проявява противовъзпалителен, дезинфекционен и умерен слабителен ефект.

**Показания**

Препарата се използва като помощно средство при холелитиаза и хронично възпаление на жълчния мехур, състояния след операция на жълчните пътища и при пациенти, страдащи от хронично заболяване на черния дроб. Преди да започнете да употребявате препарата е необходимо да се посъветвате с Вашия лекар дали е подходящо да използвате този препарат.

Холагол може да се прилага както при възрастни, така и при младежи.

Младежите обаче могат да използват този препарат само по лекарско предписание.

**Противопоказания**

Холагол не трябва да се прилага в случай на свръхчувствителност към някоя от неговите съставки.

Холагол не трябва да се прилага при пациенти, страдащи от остро възпаление на черния дроб или жълчните пътища, при пациенти с тежки бъбречни нарушения, при деца до 12 годишна възраст, по време на бременност и кърмене.

### **Нежелани лекарствени реакции**

Препаратът обикновено се понася добре. Много рядко може да се наблюдават оригване, гадене или парене и киселини в стомаха.

При появата на нежелани лекарствени или други необичайни реакции се посъветвайте с Вашия лекар относно по-нататъшната употреба на препарата.

### **Взаимодействия**

Не са наблюдавани.

### **Дозировка**

Дозата трябва да бъде определена от лекар.

Възрастни и младежи, които страдат от хронично заболяване на жълчните пътища или след оперативна намеса върху жълчния мехур вземат обикновено препарата в доза от 5 до 10 капки 3 пъти дневно. Интервалът между приетите дози не трябва да бъде по-малък от 5 часа. В случай на жълчни колики препаратът може да се взема в единична доза до 20 капки.

### **Начин на употреба**

Капките се накапват върху бучка захар и се приемат половин час преди хранене. Ако имате парене и киселини в стомаха или други симптоми на нарушен стомашен толеранс препаратът може да се приема по време на хранене или след хранене.

Накапете препарата от стъкления флакон поставен във вертикално положение с дъното нагоре.

### **Предпазни мерки**

Посъветвайте се с Вашия лекар дали е подходящо едновременното прилагане на Холагол с други лекарствени средства.

Ако симптомите не се подобрят след 3 дни или дори се влошат, или ако се наблюдават нежелани лекарствени или други необичайни реакции, посъветвайте се с Вашия лекар относно по-нататъшната употреба на препарата.

Препаратът съдържа 9.9 % етилов алкохол.

### **Предозиране**

В случай на предозиране или случайно погълдане на препарата от деца, което се проявява с гадене, коремни болки или спазми, повръщане и диария, посъветвайте се с Вашия лекар.

### **Съхранение**

Да се съхранява на тъмно място при температура от 10 до 25°C.

### **Предупреждения**

Да не се използва след изтичане срока на годност обозначен на опаковката.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.

**Опаковка**

Стъклен флакон, съдържащ 10 ml от препарата.

**Производител**

Galena a.s., Opava-Komarov, Czech Republic

**Дата на последната редакция на текста**