

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да вземате този лекарствен продукт.

- Пазете тази листовка. Може да се наложи да я четете отново.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля, задайте ги на Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарствено средство е предписано лично на Вас и Вие не трябва да го преотстъпвате на други хора. То може да им навреди, даже и ако техните оплаквания са същите като Вашите.

Съдържание на листовката:

1. Какво представлява ПРЕСТАРИУМ 5 mg и за какво се използва?
2. Преди да започнете да вземате ПРЕСТАРИУМ 5 mg
3. Как се взема ПРЕСТАРИУМ 5 mg?
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Съхранение на ПРЕСТАРИУМ 5 mg

ПРЕСТАРИУМ 5 mg, таблетки

Perindopril arginine

- Активното вещество е периндоприл аргинин. Всяка таблетка съдържа 5 mg периндоприл аргинин.
- Помощните вещества са лактоза монохидрат, хидрофобен колоиден силициев двуокис, магнезиев стеарат, малтодекстрин, натриев скорбелен гликолат (тип А), макрогол 6000, глицерол (Е422а), хипромелоза (Е464), медни съединения от хлорофилен (Е141 ii) лак и титанов диоксид (Е171).

Притежател на разрешението за употреба:


Les Laboratoires Servier
22 rue Garnier
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

Производители:

Les Laboratoires Servier Industrie
905 route de Saran
45520 Gidy
FRANCE

Servier Industries Limited
Gorey Road
Arklow, Co. Wicklow
IRELAND

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕСТАРИУМ 5 mg И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?

ПРЕСТАРИУМ 5 mg се предлага в картонени кутии, съдържащи светло зелени, продълговати филмирани таблетки, гравирани с  от едната страна и делими от двата края.

ПРЕСТАРИУМ 5 mg се доставя в картонени кутии с 30 филмирани таблетки.



ПРЕСТАРИУМ 5 mg е инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ). Той действа като разширява кръвоносните съдове, което облекчава изпомпването на кръв от сърцето в тях.

ПРЕСТАРИУМ 5 mg се използва за:

- лечение на високо кръвно налягане (артериална хипертония),
- лечение на сърдечна недостатъчност (състояние при което сърцето не може да изпомпва достатъчно кръв, за да отговори на нуждите на организма)
- за намаляване на риска от сърдечно-съдови инциденти, като например миокарден инфаркт, при пациенти със стабилна форма на коронарна болест на сърцето (състояние, при което снабдяването с кръв на сърцето е намалено или блокирано) и при пациенти, преживели миокарден инфаркт и/или операция за подобряване кръвоснабдяването на сърцето чрез разширяване на съдовете, които доставят кръвта.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ВЗЕМАТЕ ПРЕСТАРИУМ 5 mg **Не вземайте ПРЕСТАРИУМ 5 mg:**

- Ако е известно, че имате алергия към периндоприл или някое от гореспоменатите помощни вещества, или към други АСЕ инхибитори,
- Ако сте бременна или кърмите,
- Ако сте получавали прояви, като свирене на гърдите, подуване на лицето или езика, силен сърбеж или тежки кожни обриви при предшестващо лечение с АСЕ инхибитор или сте имали такива прояви при други обстоятелства (състояние, наречено ангионевротичен оток).

ПРЕСТАРИУМ 5 mg не се препоръчва за употреба при деца и подрастващи.

Бъдете особено внимателни с ПРЕСТАРИУМ 5 mg:

Ако някое от следващите условия се отнася за Вас, моля, говорете с Вашия лекар преди да вземете таблетките:

- Ако имате аортна стеноза (стесняване на главния кръвоносен съд излизащ от сърцето) или хипертрофична кардиомиопатия (вид болест на сърдечния мускул) или стеноза на бъбречните артерии (стесняване на артериите снабдяващи бъбрека с кръв),
- Ако имате други сърдечни проблеми или проблеми с бъбреците си,
- Ако сте на безсолна диета или употребявате заместители на готварската сол, които съдържат калий,
- Ако имате диабет.

Трябва също да уведомите Вашия лекар или медицинския персонал, че вземате ПРЕСТАРИУМ 5 mg:

- Ако Ви предстои анестезия и/или голяма хирургична интервенция,
- Ако Ви предстои провеждане на бъбречна диализа с полиакрилонитрилни мембрани,
- Ако Ви предстои LDL афереза (което означава отстраняване на холестерол от кръвта с апарат),



- Ако Ви предстои десенсibiliзиращо лечение за намаляване на ефектите при алергия към ужилване от пчели или оси,
- Ако наскоро сте имали диария или повръщане.

Бременност и кърмене:

Не вземайте ПРЕСТАРИУМ 5 mg:

- Ако сте бременна, планирате да забременеете или ако подозирате, че сте бременна,
- Ако кърмите.

Шофиране и работа с машини:

ПРЕСТАРИУМ 5 mg не засяга будността, но при някои пациенти са възможни различни реакции, като замаяност или умора във връзка с понижаване на кръвното налягане. Ако получите такава реакция, способността Ви за шофиране или за работа с машини може да бъде нарушена.

Прием на таблетките с други лекарства:

Лечението с ПРЕСТАРИУМ 5 mg на високото Ви кръвно налягане или на Вашата сърдечна недостатъчност може да бъде повлияно от други лекарства, които са Ви били предписани или сте купили в аптеката, като например:

- Други средства за високо кръвно налягане,
- Калий-спестяващи диуретици (спиронолактон, триамтерен), калиеви добавки или калий-съдържащи заместители на готварската сол,
- Литий за лечение на депресия,
- Антидиабетни средства,
- Нестероидни противовъзпалителни средства (напр., ибупрофен) или високи дози салицилати (напр., аспирин),
- трициклични антидепресанти, антипсихотици и анестетици.

Попитайте Вашия лекар, ако не сте сигурен какви са тези лекарства.

Винаги трябва да информирате Вашия лекар или фармацевт относно всички лекарствени средства, които вземате, даже и тези, закупени без лекарска рецепта.

3. КАК СЕ ВЗЕМА ПРЕСТАРИУМ 5 mg

Общата дневна доза се определя и коригира от Вашия лекар.

Обичайните дози са както следва:

Артериална хипертония: обичайната начална и поддържаща доза е 5 mg веднъж дневно. След един месец, дозата може да бъде увеличена до 10 mg веднъж дневно при необходимост. 10 mg дневно е максималната препоръчителна доза при лечение на артериална хипертония.

Ако сте на 65 или повече години, обичайната начална доза е 2.5 mg веднъж дневно. След един месец, дозата може да бъде увеличена до 5 mg веднъж дневно и при необходимост до 10 mg веднъж дневно.

Сърдечна недостатъчност: обичайната начална доза е 2.5 mg веднъж дневно. След 2 седмици, дозата може да бъде увеличена до 5 mg веднъж дневно, което е максималната препоръчителна доза при лечение на това състояние.

Стабилна форма на коронарна болест на сърцето : обичайната начална доза е 5 mg веднъж дневно. След 2 седмици, дозата може да бъде увеличена до 10 mg



веднъж дневно, което е максималната препоръчителна доза при лечение на това състояние.

Ако сте на 65 или повече години, обичайната начална доза е 2.5 mg веднъж дневно. След 1 седмица дозата може да бъде увеличена до 5 mg веднъж дневно и след още 1 седмица до 10 mg веднъж дневно.

Таблетките трябва да бъдат приемани с чаша вода, за предпочитане сутрин, преди храна.

Лечението на високо кръвно налягане или сърдечна недостатъчност обикновено трае цял живот.

Ако вземете по-голямо от предписаното количество таблетки:

В случай на предозиране, свържете се с най-близкото звено за бърза помощ или кажете незабавно на Вашия лекар. Най-вероятният ефект в случай на предозиране е ниско кръвно налягане. Ако настъпи изразено понижение на кръвното налягане (оплаквания, като замаяност или прималяване), може да бъде полезно заемане на хоризонтално положение с повдигнати долни крайници.

Ако пропуснете да вземете Вашите таблетки:

Важно е да вземате Вашето лекарство ежедневно. Все пак, ако пропуснете една или повече дози, вземете предписаната доза веднага щом се сетите за това и след това продължете приема, както Ви е предписано.

Не вземайте двойна доза.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарствени продукти ПРЕСТАРИУМ 5 mg може да причини нежелани странични ефекти.

Те могат да бъдат: главоболие, замаяване, световъртеж, парестезие, разстройства на настроението или съня, зрителни нарушения, шум в ушите, хипотония, кашлица (често описвана като суха и дразнеща), задух, стомашно-чревни нарушения (гадене, болки в корема, повръщане, запек), променен вкус, сърбеж, кожни обриви, уморяемост и мускулни крампи.

Тези странични ефекти, ако настъпят такива, са обичайно леки. Ако, обаче, почувствате някои от тези оплаквания или други неупоменати по-горе странични ефекти, трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако почувствате някои от следните ефекти, спрете веднага приема на таблетките и кажете незабавно на Вашия лекар: оток на лицето, устните, устата, езика или гърлото, затруднение в дишането, необичайно ускорена или неравномерна сърдечна дейност.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕСТАРИУМ 5 mg

Пазете на недостъпно за деца място.

Пазете кутията плътно затворена.

Не употребявайте този лекарствен продукт след датата на годност, която е отбелязана четливо върху картонената опаковка.

Ако Вашият лекар реши да спре лечението, върнете всички останали таблетки на фармацевта. Задръжте ги, само ако Вашият лекар Ви каже да постъпите по този начин.

Тази листовка е одобрена на: 09.2006

