

Листовка за пациента

IMIGRAN SPRINT
ИМИГРАН СПРИНТ

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 05.10.06.

Диспергиращи се таблетки

sumatriptan

Тази листовка се отнася само за *Imigran Sprint*. Моля, прочетете я внимателно преди да започнете приема на лекарството. Тя ви информира за най-важното относно *Imigran Sprint*. Може да ви се наложи да прочетете листовката отново, затова не я изхвърляйте, докато се лекувате с това лекарство. За повече информация или съвет се обърнете към лекуващия лекар.

Наименование на лекарството

Името на вашето лекарство е *Imigran Sprint* (Имигран Спринт).

Какво съдържа лекарството

Лекарственото вещество в *Imigran Sprint* таблетки е *sumatriptan* (суматриптан), под формата на сукцинатна сол. Всяка таблетка съдържа 50 mg или 100 mg *sumatriptan*. Лекарството съдържа и следните помощни вещества: безводен калциев хидрогенфосфат, микрокристална целулоза, натриев хидрогенкарбонат, натриева кроскармелоза, магнезиев стеарат. Като филмово покритие таблетките от 50 mg съдържат Opadry Pink YS-1-1441-G, а таблетките от 100 mg Opadry White OY-S-7322.

Кой произвежда и кой притежава разрешението за употреба на лекарството

Imigran Sprint се произвежда от GlaxoWellcome Operations, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ, UK. Притежател на разрешението за употребата му е Glaxo Group Ltd., Greenford, Middlesex, UK, представляван в България от ГлаксоСмитКлейн ЕООД с адрес: София 1408, кв. Иван Вазов, ул. Димитър Манов, блок 10.

За какво се използват *Imigran Sprint* таблетки

Imigran Sprint таблетки се използва за овладяване на мигренозния пристъп. Препоръчва се таблетките да се приемат при поява на симптоми на мигренозен пристъп, а не предварително за предотвратяване на пристъпа.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЕМА НА ЛЕКАРСТВОТО

Не приемайте това лекарство, ако сте свръхчувствителни (алергични) към *Imigran Sprint*, *sumatriptan* или някоя от другите съставки на лекарството.

Ако отговорът на някой от следните въпроси е "Да", съобщете за това на лекуващия лекар, преди да започнете прием на лекарството, тъй като то може да не е подходящо за вас:

- Бременна ли сте или се опитвате да забременеете?
- Кърмите ли? Не бива да кърмите 12 часа след прием на *Imigran Sprint*.
- Това главоболие по-различно ли е от обичайните ви пристъпи на мигрена?
- Приемате ли други лекарства за мигрена, които съдържат ерготамин или дихидроерготамин? Ако приемате такива лекарства, не трябва да употребявате *Imigran Sprint* таблетки по същото време.
- Приемате ли или сте приемали през последните две седмици някакви лекарства за лечение на депресия, особено такива, съдържащи инхибитори на моноаминооксидазата? Едновременноят прием на *Imigran Sprint* и лекарства - инхибитори на моноаминооксидазата не е препоръчителен.
- Имате ли алергия към сулфонамиди? Ако сте алергичен към някое антибактериално лекарство, но не знаете със сигурност дали то принадлежи към групата на сулфонамидите, консултирайте се с лекаря.
- Страдате ли от исхемичен колит?



- Страдате ли от неочеквани пристъпи на задух или болка, или стягане в гръденния кош (които могат да обхванат челюстта или горната част на мишниците)?
- Имали ли сте някога сърдечни пристъпи?
- Страдате ли от високо кръвно налягане?
- Имате ли никакво сърдечно заболяване; страдате ли от стенокардия?
- Прекарали ли сте инсулт?
- Страдате ли от болест на Рейно (заболяване на периферните съдове, проявяващо се с болка по задната страна на краката, изстиване, изтръпване или сковаване на ръцете и краката)?
- Информирани ли сте, че при вас рисъкът от развитие на сърдечно заболяване е повишен? Приема се, че повишен риск от сърдечно заболяване има при: мъже над 40 годишна възраст, жени в менопауза, диабетици, пушачи, хора с висок холестерол в кръвта или наднормено тегло. Възможно е също така да имате повишен риск от сърдечно заболяване, ако някои от кръвните ви родственици са страдали от сърдечно заболяване.
- Страдате ли от чернодробно заболяване? Ако възнамерявате да провеждате някакви изследвания на кръвта, това лекарство може да повлияе на резултатите.
- Страдате ли от заболяване на бъбреците?
- Имали ли сте припадъци или гърчове в миналото? Казвали ли са ви, че сте предразположени (склонни) към припадъци или гърчове?
- Под 18 години ли сте?
- Над 65 години ли сте?

Непременно уведомете лекаря за всички други лекарства, които приемате в момента, дори за тези, които сте си купили сами, без лекарско предписание (вкл. билки, хранителни добавки, напр. витамини, желязо или калций).

Внимавайте, ако шофирате или работите с машини, тъй като мигрената или лечението с Imigran Sprint могат да ви направят сънливи.

Как да приемате Imigran Sprint таблетки

Приемайте лекарството така, както ви е предписан лекарят.

Таблетките трябва да се приемат веднага след появата на симптомите на мигрена, но те могат да се приемат и по всяко време в хода на мигренозния пристъп. Не приемайте таблетките когато нямате симптоми с цел предотвратяване на мигренозен пристъп.

Това лекарство не трябва да се прилага при деца (под 18 години) и при пациенти в напреднала възраст (над 65 години).

Препоръчителната доза Imigran Sprint при възрастни е 50 mg (1 таблетка от 50 mg). При необходимост, при някои пациенти може да се приложи доза от 100 mg (1 таблетка от 100 mg). Ако симптомите се възобновят, могат да се приемат още таблетки. Не приемайте обаче повече от 300 mg за 24 часа (т.е. 3 таблетки от по 100 mg или 6 таблетки от по 50 mg).

Ако след първоначално приемата доза не последва никакво облекчение, не приемайте повече таблетки за този пристъп.

Вие можете същевременно да приемете таблетките, които обикновено облекчават болката ви, ако сте сигурни, че не съдържат ерготамин или дихидроерготамин.

Трябва да изчакате поне шест часа преди приемането на всякакви лекарства, съдържащи ерготамин или дихидроерготамин. Ако сте приемали някакви лекарства, съдържащи ерготамин или дихидроерготамин, трябва да изчакате поне 24 часа преди да приемете Imigran Sprint.

При малък брой пациенти мигренозното главоболие започва да намалява 30 минути след приема на Imigran Sprint таблетки 50 mg и 20 минути след приема на Imigran Sprint таблетки 100 mg. Повечето хора чувстват облекчение на мигрената до два часа след приемането на таблетките от 50 mg или от 100 mg.

Погълщайте таблетката цяла, с малко вода. Пациентите, които се затрудняват с прегъдането на таблетката, могат да я диспергираат в малко количество вода преди прием. Imigran Sprint таблетки, диспергирали във вода имат горчив вкус.

Какво да направите, ако приемете повече от предписаното

Важно е да се придържате към препоръчената доза. Независимо се консултирайте с лекар, ако случайно погълнете по голяма доза от максималната дневна доза (300 mg).



СЛЕД ПРИЕМАНЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, при някои пациенти Imigran Sprint може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

Някои хора са алергични към лекарства. СПРЕТЕ приема на лекарството и съобщете незабавно на лекуващия лекар, ако скоро след приема на Imigran Sprint забележите някой от следните признания:

- Внезапно свиркащо дишане или болка/стягане в гръден кош.
- Подуване на клепачите, лицето, устните или езика.
- Гърчове/припадъци.
- Обрив по кожата или "копривна треска" някъде по тялото.
- Болка ниско в корема и/или тежко кървене от правото черво.

Някои хора могат да усетят болка или чувство на мравучкане, топлина, тежест или натиск в някоя част от тялото, включително гръден кош и гърлото след прием на Imigran Sprint. Тези симптоми може да са силно проявени, но обикновено преминават бързо. Уведомете незабавно лекуващия лекар, ако симптомите не изчезнат или се засилят. Това може да бъде признак на сърдечен пристъп. Не приемайте повече таблетки от лекарството преди да се консултирате с лекуващия лекар.

Може да се появи някой от следните симптоми:

- Лесна уморяемост или сънливост
- Виене на свят
- Необичайно бавен или бърз пулс, или сърцебиене
- Чувство на слабост
- Краткотрайно зачервяване на лицето
- Гадене или повръщане
- Зрителни нарушения
- Загуба на нормалния цвят на пръстите на ръцете и краката
- Треперене или тремор
- Неконтролирани движения.

При поява на някой от гореизброените симптоми не трябва да спирате приема на лекарството, но съобщете на лекаря при следващата си среща с него. Обаче, ако имате постоянно обезцветяване на ръцете или краката, спрете приема на лекарството и уведомете лекаря незабавно.

Съобщете на лекаря, че приемате Imigran Sprint в случай, че ви е назначил лабораторни изследвания за функцията на черния дроб, тъй като те могат да бъдат повлияни от приема на лекарството.

Ако забележите някакви други нежелани реакции, които не са описани в тази листовка, обърнете се към лекуващия лекар.

Съхранение на лекарството

Съхранявайте Imigran Sprint таблетки при температура под 30°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте лекарството след датата на изтичане на срока на годност, посочена върху опаковката.

ПОМНЕТЕ!

Това лекарство е предназначено само за вас. Никога не го преотстъпвайте на друг човек. То може да му навреди, дори ако неговите симптоми са същите или подобни на вашите.

Допълнителна информация

Тази листовка не съдържа цялата информация за Imigran Sprint. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, обърнете се към лекаря.

Imigran Sprint е запазена търговска марка на GlaxoSmithKline group of companies.

