

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 07.11.06г.

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете лечението с Gabitril®. Ако имате някакви въпроси се обърнете към Вашия лекар или фармацевт.

ГАБИТРИЛ®
tiagabine
2.5 mg филмирани таблетки

ЗА ТАБЛЕТКИТЕ ГАБИТРИЛ®

Какво съдържат таблетките Габитрил®?

Активното вещество на Габитрил® е tiagabine (под форма на hydrochloride monohydrate). Таблетките Габитрил® съдържат също помощни вещества: микрокристална целулоза (Е 460), аскорбинова киселина (Е 300), безводна лактоза, прежелатинизирано царевично нишесте, кросповидон, колоиден безводен силиций (Е 551), хидрогенирана растителна мазнина, стеаринова киселина, магнезиев стеарат, хипромелоза, хидроксипропилцелулоза (Е 463) и титанов диоксид (Е171).

Как изглеждат таблетките Габитрил®?

Таблетките Габитрил® 2.5 mg са бели, овални и маркирани с 254 от едната страна.

Всяка опаковка съдържа шишенце от 50 таблетки. Във всяка опаковка се съдържа малък контейнер с подсушаващо вещество, който не трябва да се погълща.

КОЙ ПРОИЗВЕЖДА ГАБИТРИЛ®?

Притежател на разрешението за употреба:

Torrex Chiesi Pharma GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Vienna, Austria

Производител:

Torrex Chiesi Pharma GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Vienna, Austria

ЗА КАКВО СЕ ПРЕДПИСВА ГАБИТРИЛ®?

Габитрил® е антиепилептично лекарство, което се използва за допълнително лечение на парциални гърчове с или без вторична генерализация, които не са лекувани успешно с други антиепилептични лекарства.

Лекарството трябва да се използва само при възрастни и деца над 12 години.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТАБЛЕТКИТЕ ГАБИТРИЛ®

Дали Габитрил® е подходящото за мен лекарство?

Преди да вземете таблетките Габитрил® Вие трябва да предупредите Вашия лекар ако:

- имате свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества в Габитрил® (напр. към лактоза);
- сте бременна или планирате бременност;
- кърмите;
- страдате от чернодробно заболяване.

Мога ли да използвам Габитрил® ако приемам други лекарства?



Габитрил® може да бъде използван съвместно с други лекарства, включително антиепилептични лекарства и перорални контрацептиви. Независимо от това е важно да предупредите Вашия лекар, ако приемате или планирате да вземате други лекарства.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Ако усещате виене на свят или умора, докато приемате Габитрил® е особено важно да не изпълнявате операции, които изискват повишено внимание, като напр. шофиране или работа с машини.

КОГАТО ПРИЕМАТЕ ТАБЛЕТКИТЕ ГАБИТРИЛ®

- Приемайте лекарството точно, както Вашият лекар и фармацевт са Ви посъветвали.
- Предписанието върху опаковката ще Ви посочи точно колко таблетки и колко често да ги вземете. Ако указанието не е ясно и имате някакви съмнения, моля посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.
- Таблетките се приемат по време на хранене и се погълват с чаша вода.
- Вашият лекар ще прецени каква е точната за Вас дозировка.
- Дозата ще бъде повишавана постепенно, до постигане на контрол върху епилепсията. Обикновено това се постига с дози от 30 – 45 mg/ дневно, разделени в 3 приема дневно.

Какво би могло да се получи, ако приема повече таблетки?

Ако приемете много повече от предписаните Ви таблетки, моля обърнете се незабавно към Вашия лекар.

Какво да направя ако забравя да взема таблетките Габитрил®?

Ако сте забравили да вземете една доза, вземете обичайната доза още в момента, когато осъзнавате този факт, но ако това е непосредствено преди следващия прием, не дублирайте дозата. По-нататък продължете както обикновено.

Колко продължително е необходимо да приемам Габитрил®?

Габитрил® е предназначен за продължително лечение, затова Вие трябва да го приемате толкова време, колкото е препоръчал Вашият лекар. Не спирайте приема на лекарството преди да се посъветвате с Вашия лекар. Ако Вашият лекар прецени, че нямаете повече нужда от Габитрил®, дозата Ви ще бъде намалена бавно и постепенно за период от 2 – 3 седмици.

КАКВИ НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ГАБИТРИЛ®

При някои пациенти, особено през първите месеци от лечението, Габитрил® може да причини някои нежелани ефекти. Най-често срещаните нежелани ефекти са:

- Чувство за замайване и нестабилност
- Чувство на умора или сънливост
- Безпричинна нервност

Други нежелани ефекти включват трепор, диария, затруднения в концентрацията, потиснато настроение, емоционална лабилност, забавен говор и риск от възстановяване на сериозни поведенчески проблеми.

Някои пациенти могат да изпитват други нежелани ефекти, като зрителни нарушения или появя на кръвонасядания по кожата.

ИНФОРМИРАЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА ВСЕКИ НЕЖЕЛАН ЕФЕКТ, ПРИЧИНЯВАЩ ДИСКОМФОРТ, НЕСПОМЕНЕНАТ В ТАЗИ ЛИСТОВКА.

ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Не предлагайте вашето лекарство на никой друг, дори да Ви се струва, че има същите като Вашите симптоми.



- Не използвайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.
- Не използвайте таблетките, ако забележите промяна във вънния им вид (например промени в цвета на таблетките).

СЪХРАНЕНИЕ НА ТАБЛЕТКИТЕ ГАБИТРИЛ®

- Пазете лекарството на място, недостъпно за деца.
- Да се съхранява при температура под 25⁰ С.
- Да не се охлажда (между 2⁰ – 8⁰ С) и да не се замразява.
- Да се съхранява в оригинална опаковка. Да не се отстранява подсушаващия контейнер от шишенцето. Да не се погъща подсушаващото вещество.
- Моля, върнете всички неизползвани таблетки във Вашата аптека.

Срок на годност

2 години.

Дата на последна актуализация на текста:

Януари, 2005 г.

