

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 1442/14.11.06	
706/07.11.06	Милан

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

CellCept 1g/5 ml прах за перорална супензия

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка бутилка съдържа 35 г mycophenolate mofetil (микофенолат мофетил) в 110 г прах за перорална супензия. 5 мл от приготвената супензия съдържат 1 г микофенолат мофетил.

За пълен списък на помощните вещества, виж раздел 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за перорална супензия

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1. Терапевтични показания

CellCept 1 g/5 ml прах за перорална супензия в комбинация с циклоспорин и кортикоステроиди е показан за профилактика на остро отхвърляне на транспланта при пациенти с алогенна трансплантация на бъбреци, сърце или черен дроб.

4.2. Дозировка и метод на приложение

Лечението със CellCept трябва да се започне и поддържа от специалисти с подходяща квалификация в областта на трансплантацията.

Употреба при бъбречна трансплантация:

Възрастни: Пероралното лечение със CellCept 1 g/5 ml прах за перорална супензия трябва да започне до 72 часа след трансплантацията. Препоръчваната доза при пациенти с бъбречна трансплантация е 1.0 г два пъти дневно (2 г дневна доза), т.е. 5 ml перорална супензия два пъти дневно.

Деца и младежи (на възраст от 2 до 18 години): Препоръчваната доза CellCept 1 g/5 ml прах за перорална супензия е 600 mg/m², прилагани два пъти дневно (до максимална доза 2 g/10 ml перорална супензия дневно). Тъй като някои нежелани реакции възникват по-често в тази възрастова група (виж раздел 4.8.) в сравнение с възрастните, може да се наложи временно намаляване на дозата



или прекъсване на лечението. При това ще трябва да се вземе предвид съответните клинични фактори, включително тежестта на реакцията.

Деца (< 2 години): Денните относно безопасността и ефективността при деца под 2-годишна възраст са ограничени. Те са недостатъчни, за да се направят препоръки за дозиране и поради това употребата в тази възрастова група не се препоръчва.

Употреба при сърдечна трансплантация:

Възрастни: Пероралното лечение със CellCept трябва да започне до 5 дни след трансплантацията. Препоръчваната доза при пациенти със сърдечна трансплантация е 1.5 г два пъти дневно (3 г дневна доза).

Деца: Няма данни за приложение при трансплантация на сърце при деца.

Употреба при чернодробна трансплантация:

Възрастни: Интравенозното лечение със CellCept трябва да започне през първите 4 дни след трансплантацията на черен дроб. Препоръчваната доза при пациенти с чернодробна трансплантация е 1.5 г два пъти дневно (3 г дневна доза).

Деца: Няма данни за приложение при трансплантация на черен дроб при деца.

Употреба при пациенти в напреднала възраст (≥ 65 години): Препоръчваните дози от 1.0 г два пъти дневно при пациенти с бъбречна трансплантация и 1.5 г два пъти дневно при болни с трансплантация на сърце или черен дроб са подходящи за пациенти в напреднала възраст.

Употреба при бъбречно увреждане: При пациенти с трансплантация на бъбреци с тежко хронично бъбречно увреждане (скорост на гломерулната филтрация $< 25 \text{ ml/min}/\text{l} \cdot 1.73\text{m}^2$) извън периода непосредствено след трансплантацията трябва да се избягват дози по-високи от 1 г два пъти дневно. Тези пациенти трябва също да се наблюдават внимателно. Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти със забавено постоперативно функциониране на бъбречната присадка (вж раздел 5.2.). Няма данни при пациенти със сърдечна или чернодробна трансплантация и тежко хронично бъбречно увреждане.

Употреба при тежко чернодробно увреждане: Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с бъбречна трансплантация и тежко паренхимно заболяване на черния дроб. Няма данни при сърдечни пациенти с тежко паренхимно заболяване на черния дроб.

Лечение по време на епизоди на отхвърляне: МФК (микофенолова киселина) е активният метаболит на микофенолат мофетил. Отхвърлянето на бъбречния



транспланtag не води до промени във фармакокинетиката на МФК; не се налага намаляване на дозата или преустановяване на CellCept. Няма основание за коригиране на дозата на CellCept след отхвърляне на присадката при сърдечна трансплантация. Няма фармакокинетични данни при отхвърляне на чернодробна присадка.

Забележка

При необходимост CellCept 1 г/5 мл прах за перорална суспензия може да се прилага през назогастрална сонда с минимален размер 8 French (минимум 1.7 mm вътрешен диаметър).

4.3. Противопоказания

Наблюдавани са реакции на свръхчувствителност към CellCept (виж раздел 4.8.). Поради това CellCept е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към микофенолат мофетил или микофенолова киселина.

CellCept е противопоказан при кърмачки (виж раздел 4.6.).

За информация за употреба по време на бременност и изисквания за контрацепция виж раздел 4.6.

4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

Пациентите, получаващи комбинирана имуносупресивна терапия, включително CellCept, са подложени на повишен рисък от развитие на лимфоми и други злокачествени заболявания, особено на кожата (виж раздел 4.8.). Рискът изглежда е свързан по-скоро с интензивността и продължителността на имуносупресията, отколкото с употребата на някой специфичен продукт. Като общ съвет за намаляване до минимум на риска от кожен рак трябва да се ограничи излагането на слънчева светлина и UV облъчване, като се носи защитно облекло и се използват слънцезащитни продукти с висок защитен фактор.

Пациентите, получаващи CellCept, трябва да се инструктират да съобщават незабавно за всеки признак на инфекция, неочаквано кръвонасядане, кървене или друга проява на подтискане на костния мозък.

Прекомерното потискане на имунната система увеличава чувствителността към инфекции, включително опортюнистични инфекции, инфекции с летален изход и сепсис (виж раздел 4.8.).

Пациентите, получаващи CellCept, трябва да се проследяват за появата на неутропения, която може да бъде свързана със самия CellCept, съществуващо



медикаментозно лечение, вирусна инфекция или комбинация от няколко причини. Пълна кръвна картина на болните, лекувани със CellCept, трябва да се изследва всяка седмица през първия месец, два пъти месечно през втория и третия месец на лечението, след това ежемесечно през първата година. Ако се развие неутропения (абсолютен брой на неутрофилите $< 1.3 \times 10^3/\mu\text{l}$), може да се наложи да се прекъсне или преустанови лечението със CellCept.

Пациентите трябва да се информират, че по време на лечение със CellCept ваксинациите може да бъдат по-малко ефективни и употребата на живи атенюирани ваксини трябва да се избягва (виж раздел 4.5.). Противогрипната вакцина може да бъде от полза. Предписващите лекари трябва да направят справка с националните указания за противогрипна ваксинация.

Тъй като приложението на CellCept е било свързано с повищена честота на нежелани събития от страна на храносмилателната система, включително нечести случаи на улцерация, кръвоизлив и перфорация на стомашно-чревния тракт, CellCept трябва да се прилага внимателно при пациенти с активно сериозно заболяване на храносмилателната система.

CellCept е инхибитор на IMPDH (инозин монофосфат дехидрогеназа). Поради това теоретически приложението му трябва да се избягва при пациенти с рядката наследствена недостатъчност на хипоксантин-гуанин фосфорибозил-трансферазата (HGPRT), като синдром на Lesch-Nyhan и Kelley-Seegmiller.

Препоръчва се CellCept да не се прилага едновременно с азатиоприн, защото такова приложение не е изследвано.

С оглед на значителното намаление на AUC на МФК от колестирамин, трябва да се внимава при едновременното приложение на CellCept с *лекарствени продукти*, които повлияват ентерохепаталния кръговрат, поради потенциалното намаление на ефективността на CellCept.

CellCept 1 г/5 мл прах за перорална суспензия съдържа аспартам. Поради това трябва да се внимава, ако CellCept 1 г/5 мл прах за перорална суспензия се прилага при пациенти с фенилкетонурия (виж раздел 6.1.).

Наличие на риск: Не е установена ползата от микофенолат мофетил в комбинация с тациримус (виж също раздел 4.5.).

4.5. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Изследвания за проучване на взаимодействията са провеждани само при възрастни.



Aciclovir: Наблюдавани са по-високи плазмени концентрации на МФКГ и ацикловир, когато микофенолат мофетил е прилаган с ацикловир, отколкото при самостоятелно приложение на всяко лекарство. Промените във фармакокинетиката на МФКГ (МФКГ се повишава с 8%) са били минимални и не се считат за клинически значими. Тъй като плазмените концентрации на МФКГ, както и концентрациите на ацикловир, се повишават при бъбречно увреждане има възможност двете лекарства да се конкурират за тубулната секреция в бъбреците и по този начин допълнително да се увеличат концентрациите на двете вещества.

Антиациди с магнезиев и алуминиев хидроксид: резорбцията на микофенолат мофетил и била намалена при приложение с антиациди.

Colestyramine: след еднократно прилагане на 1.5 г микафенолат мофетил на здрави лица, на които предварително са давани 4 г колестирамин три пъти дневно в продължение на 4 дни, е наблюдавано намаление на AUC на МФК с 40% (виж раздел 4.4.). При едновременно приложение трябва да се внимава поради потенциалната възможност за намаление на ефективността на CellCept.

Лекарствени продукти, които повлияват ентерохепаталния кръговрат: Трябва да се внимава при употребата на лекарствени продукти, които повлияват ентерохепаталния кръговрат, поради потенциалната възможност за намаление на ефективността на CellCept.

Ciclosporin A: Фармакокинетиката на циклоспорин А не се повлиява от микафенолат мофетил.

Няколко изследвания са доказали, че циклоспорин А намалява AUC на МФК с 19-38%, вероятно в резултат от инхибиране на жлъчната секреция с последващо намаление на ентерохепаталния кръговрат. Тъй като обаче изследванията за ефективност са провеждани със CellCept в комбинация с циклоспорин А и кортикоステроиди, тези находки не се отразяват на препоръчваната доза (виж раздел 4.2.).

Ganciclovir: въз основа на резултатите от едно изследване с еднократно приложение на препоръчваните дози микафенолат перорално и ганцикловир интравенозно и известните ефекти на бъбречното увреждане върху фармакокинетиката на CellCept (виж раздел 4.2.) и ганцикловир, очаква се, че едновременното приложение на тези продукти (които се конкурират за механизма на тубулна секреция в бъбреците) ще доведе до увеличение на концентрациите на МФКГ и ганцикловир. Не се очаква значителна промяна на фармакокинетиката на МФК и не се налага коригиране на дозата на CellCept. При пациенти с бъбречно увреждане, при които CellCept и ганцикловир се прилагат едновременно, трябва да се спазват препоръките за дозиране на ганцикловир и болните да се наблюдават внимателно.



Орални контрацептиви: Фармакокинетиката и фармакодинамиката на оралните контрацептиви не са се повлияли от едновременното приложение със CellCept (виж също раздел 5.2.).

Trimethoprim/sulfamethoxazole: не е наблюдаван ефект върху бионаличността на МФК.

Tacrolimus: при пациенти с бъбречна трансплантация: стабилни пациенти с бъбречна трансплантация, получаващи циклоспорин и CellCept (1 г два пъти дневно), са показали около 30% увеличение на плазмената AUC на МФК и около 20% намаление на плазмената AUC на МФКГ, когато циклоспорин е бил заменен с такролимус. C_{max} на МФК не се е повлияла, а C_{max} на МФКГ е била намалена с приблизително 20%. Механизмът на тази находка не е добре изяснен. Повишенната жлъчна секреция на МФКГ заедно с ентерохепаталния кръговрат може да са частично отговорни за находката, тъй като повишението на концентрацията на МФК, свързано с приложението на такролимус, е било по-подчертано в последната част на профила концентрация-време (4-12 часа след приложението). При друго изследване на пациенти с бъбречна трансплантация е доказано, че концентрацията на такролимус изглежда не се променя от CellCept.

При пациенти с чернодробна трансплантация: има много малко фармакокинетични данни за AUC на МФК при пациенти с чернодробна трансплантация, лекувани със CellCept в комбинация с такролимус. При едно проучване, проведено с цел оценка на ефекта на CellCept върху фармакокинетиката на такролимус при стабилни пациенти с чернодробна трансплантация, е наблюдавано повишение с приблизително 20% на AUC на такролимус при многократно приложение на CellCept (1.5 г два пъти дневно) на болни, приемащи такролимус.

Други взаимодействия: едновременното приложение на пробенецид с миофенолат мофетил на маймуни е довело до трикратно повишение на плазмената AUC на МФКГ. По този начин, други *вещества*, за които се знае, че са подложени на тубулна секреция в бъбреците, може да се конкурират с МФКГ и така да се повишат плазмените концентрации на МФКГ или на други *вещества*, елиминирани чрез тубулна секреция.

Живи ваксини: живи ваксини не трябва да се прилагат при болни с увреден имунен отговор. Антитяловият отговор към други ваксини може да бъде намален (виж също раздел 4.4.).

4.6. Бременност и кърмене



Препоръчва се лечението със CellCept да не се започва преди получаването на отрицателен тест за бременност. Ефективна контрацепция трябва да се прилага преди началото на лечение със CellCept, по време на терапията и в продължение на шест седмици след преустановяване на лечението (виж раздел 4.5.). Пациентките трябва да се инструктират да се консултират незабавно с лекуващия си лекар при възникване на бременност.

Употребата на CellCept по време на бременност не се препоръчва и той трябва да се запази за случаи, при които няма подходящо алтернативно лечение. CellCept трябва да се използва при бременни жени само когато потенциалната полза надхвърля потенциалния рисък за плода. Няма адекватни данни от употребата на CellCept при бременни жени. Изследванията при животни са показвали репродуктивна токсичност (виж раздел 5.3). Потенциалният рисък за човека е неизвестен.

Проучвания върху плъхове са показвали, че микофенолат мофетил се екскретира в кърмата. Не е известно дали това вещество се екскретира в кърмата при човека. Поради вероятността от сериозни нежелани реакции на микофенолат мофетил при кърмачетата, CellCept е противопоказан при кърмачки (виж раздел 4.3.).

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани изследвания на ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Фармакокинетичният профил и съобщените нежелани реакции показват, че появата на ефект е малко вероятно.

4.8. Нежелани реакции

Следните нежелани ефекти са съобщени по време на клиничните изпитвания: Главните нежелани реакции, свързани с прилагането на CellCept в комбинация с циклоспорин и кортикоステроиди, включват диария, левкопения, сепсис и повръщане и има данни за по-голяма честота на някои видове инфекции (виж раздел 4.4.).

Злокачествени заболявания:

Пациентите, получаващи комбинирана имуносупресивна терапия, включително CellCept, са подложени на повишен рисък от развитие на лимфоми и други злокачествени заболявания, особено на кожата (виж раздел 4.4.). При контролирани клинични изпитвания при пациенти с бъбречна (2 г дневно), сърдечна или чернодробна трансплантиация, проследявани в продължение на най-малко 1 година, лимфопролиферативно заболяване или лимфом са развили 0.6% от болните, получавали CellCept (2 г или 3 г дневно) в комбинация с други имуносупресори. Немеланомен кожен рак е наблюдаван при 3.6% от пациентите; други видове злокачествени заболявания са наблюдавани при 1.1%



от пациентите. Данните от безопасността при едно 3-годишно проучване върху пациенти с бъбречна и сърдечна трансплантация не са показвали неочеквани промени на честотата на злокачествените заболявания в сравнение с данните от изследването, провеждано в продължение на 1 година. Болните с трансплантация на черен дроб са били проследявани най-малко 1 година, но по-малко от 3 години.

Опортоунистични инфекции

Всички пациенти са подложени на рисък от опортоунистични инфекции, като рисъкът нараства с общото имуносупресорно натоварване (виж раздел 4.4.). Повечето обичайни опортоунистични инфекции при пациенти, получаващи CellCept (2 г или 3 г дневно) заедно с други имуносупресори по време на контролирани клинични изпитвания върху болни с бъбречна (2 г дневно), сърдечна и чернодробна трансплантация, проследявани в продължение на най-малко 1 година, са били кожно-лигавична кандидоза, синдром на CMV виремия и herpes simplex. Пациентите със синдром на CMV виремия са били 13.5%.

Деца и младежи (на възраст от 2 до 18 години):

Видът и честотата на нежеланите реакции по време на едно клинично изпитване, в което са участвали 92 деца на възраст от 2 до 18 години, лекувани перорално с 600 mg/m^2 микофенолат мофетил два пъти дневно, са били подобни на тези, наблюдавани при възрастни пациенти, лекувани с 1 г CellCept два пъти дневно. Следните нежелани ефекти, свързани с лечението, обаче са били по-чести при децата, особено при децата под 6-годишна възраст, в сравнение с възрастните: диария, сепсис, левкопения, анемия и инфекция.

Пациенти в напреднала възраст (≥ 65 години):

Пациенти в напреднала възраст (≥ 65 години) може по принцип да са изложени на по-голям рисък от нежелани реакции, дължащи се на имуносупресия. В сравнение с по-младите индивиди пациентите в напреднала възраст, които получават CellCept като част от комбинирана имуносупресорна терапия, могат да бъдат изложени на повишен рисък от някои инфекции (включително заболяване с тъканна инвазия на цитомегаловирус) и вероятно от кръвоизливи в стомашно-чревния тракт и белодробен оток.

Други нежелани реакции:

Нежеланите реакции, вероятно или възможно свързани с приложението на CellCept, съобщени при $\geq 1/10$ и при $\geq 1/100$ до $< 1/10$ от пациентите, лекувани със CellCept по време на контролираните клинични изпитвания с трансплантация на бъбреци (2 г дневно), сърце и черен дроб са изброени в следващата таблица.

Нежелани лекарствени реакции, вероятно или възможно свързани с приложението на CellCept, съобщени при пациенти, лекувани със CellCept



в комбинация с циклоспорин и кортикоステроиди по време на клинични изпитвания с трансплантиация на бъбреци, сърце и черен дроб

В системата орган-клас, нежеланите ефекти са изброени според честотата, като са използвани следните категории: много чести ($\geq 1/100$ до $<1/10$), нечести ($\geq 1/1000$ до $\leq 1/100$), редки ($\geq 1/10\ 000$ до $\leq 1/1000$), много редки ($\leq 1/10\ 000$), неизвестна (не може да се оцени от наличните данни). Вътре във всяка група на честота, нежеланите ефекти са представени по реда на намаляване на сериозността им.

<i>Система орган-клас</i>		<i>Нежелани лекарствени реакции</i>
<i>Инфекции и опаразитяване</i>	<i>Много чести</i>	Сепсис, кандидоза на стомашно-чревния тракт, инфекция на никочните пътища, <i>herpes simplex</i> , <i>herpes zoster</i>
	<i>Чести</i>	Пневмония, грип, инфекция на дихателните пътища, респираторна монилиаза, инфекция на стомашно-чревния тракт, кандидоза, гастроентерит, инфекция, бронхит, фарингит, синузит, микотична инфекция на кожата, кожна кандидоза, вагинална кандидоза, ринит,
<i>Неоплазми доброкачествени, злокачествени и неспецифицирани (вкл. кисти и полипи)</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	Рак на кожата, доброкачествена неоплазма на кожата
<i>Нарушения на кръвта и лимфната система</i>	<i>Много чести</i>	Левкопения, тромбоцитопения, анемия
	<i>Чести</i>	Панцитопения, леукоцитоза
<i>Метаболитни и хранителни нарушения</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	Ацидоза, хиперкалиемия, хипокалиемия, хипергликемия, хипомагнезиемия, хипокалциемия, хиперхолестерolemия, хиперлипидемия, хипофосфатемия, хиперурикемия, подагра, анорексия
<i>Психични нарушения</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	Ажитация, състояния на объркане, депресия, тревожност, абнормно мислене, безсъние,
<i>Нервна система</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	Гърчове, хипертония, замайване, трепор, съниливост, миастенен синдром, замайване, главоболие, парестезии, промяна на вкуса
<i>Сърдечни нарушения</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	Тахикардия
<i>Съдови нарушения</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	Хипотония, хипертония, вазодилатация
<i>Дихателни, торакални и медиастинални нарушения</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	Плеврален излив, диспнея, кашлица
<i>Стомашно-чревна система</i>	<i>Много чести</i>	Повръщане, коремна болка, диария, гадене
	<i>Чести</i>	Кръвоизлив от стомашно-чревния тракт, перитонит, илеус, колит, стомашна язва, дуоденална язва, гастрит, езофагит, stomatit, запек, диспепсия, метеоризъм, уригване
<i>Хепато-билиарни нарушения</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	Хепатит, жълтеница, хипербилирубинемия
<i>Кожа и кожни</i>	<i>Много чести</i>	-



<i>придатъци</i>	<i>Чести</i>	<i>Кожна хипертрофия, обрив, акне, алопеция</i>
<i>Мускуло-скелетни и съединително-тъканни нарушения</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	<i>Артрапалгия</i>
<i>Бъбречни и пикочни нарушения</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	<i>Бъбречно увреждане</i>
<i>Общи нарушения и състояния на мястото на приложение</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	<i>Оток, пирексия, студени тръпки, болка, неразположение, астемия</i>
<i>Изследвания</i>	<i>Много чести</i>	-
	<i>Чести</i>	<i>Повишени чернодробни ензими, повишен креатинин в кръвта, повишен лактат дехидрогеназа в кръвта, повищена урея в кръвта, повишена кръвна алкална фосфатаза, намаление на теглото</i>

Забележка: 501 (2 г CellSept дневно), 289 (3 г CellSept дневно) и 277 (2 г i.v./ 3 г перорално CellSept дневно) пациенти са били лекувани по време на клинични изпитвания фаза III за предотвратяване на отхвърляне на присадката при бъбречна, сърдечна и чернодробна трансплантация съответно.

Следните нежелани ефекти са наблюдавани след излизането на пазара:

Видовете нежелани реакции, които се съобщават след излизането на CellSept на пазара, са подобни на отбелязаните по време на контролираните клинични изпитвания с бъбречна, сърдечна и чернодробна трансплантация.

Допълнителните нежелани реакции, съобщени в пост-маркетинговия период, са описани по-долу, като честотата на съобщаване е дадена в скоби, ако е известна.

Стомашно-чревен тракт: колит (включително колит, причинен от цитомегаловирус, $\geq 1/100$ до $< 1/10$), панкреатит ($\geq 1/100$ до $< 1/10$) и атрофия на чревните реснички.

Нарушения, свързани с имуносупресията: сериозни животозаплашващи инфекции, включващи менингит, ендокардит, туберкулоза и атипична микобактериална инфекция. Има съобщения за агранулоцитоза ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$) и неутропения, поради това се препоръчва редовно проследяване на болните, лекувани със CellSept (виж раздел 4.4.).

Докладвани са отделни случаи на апластична анемия и подтисканена костния мозък при пациенти лекувани със CellSept, някои от които с фатален край.

Свръхчувствителност: Съобщават се реакции на свръхчувствителност, включително ангионевротичен оток и анафилактична реакция.

4.9. Предозиране

Опитът с предозиране на CellSept при хора е много ограничен. Събитията, получени със съобщенията за предозиране, не излизат извън познатия профил на безопасност на лекарствения продукт.



Не може да се очаква, че хемодиализа ще може да отстрани клинично значими количества МФК и МФКГ. Секвестранти на жълчните киселини като колестирамин намаляват AUC на МФК чрез повлияване на ентерохепаталния кръговрат на лекарствения продукт.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: имуносупресорни средства; ATC код L04AA06.

Микофенолат мофетил е 2-морфолиноетилов естер на МФК. МФК е мощен, селективен, неконкурентен и обратим инхибитор на инозин монофосфат дехидрогеназата и поради това инхибира пътищата на de novo синтезата на гуанозиновия нуклеотид без инкорпориране в ДНК. МФК има по-мощен цитостатичен ефект върху лимфоцитите отколкото върху другите клетки, тъй като пролиферацията на Т- и В-лимфоцитите зависи критично от de novo синтезата на пурините, докато другите клетки могат да използват резервни пътища.

5.2. Фармакокинетични свойства

След перорално приложение микофенолат мофетил се резорбира бързо и в голяма степен и се подлага на пълен пресистемен метаболизъм до активния метаболит МКФ. Както се доказва чрез потискането на острото отхвърляне след бъбречна трансплантиация, имуносупресивната активност на CellScept корелира с концентрацията на МФК. Средната бионаличност на пероралния микофенолат мофетил, основаваща се на AUC на МФК, е 94% от интравенозно приложения микофенолат мофетил. Храната не повлиява степента на резорбция (AUC на МФК), когато микофенолат мофетил се прилага в дози от 1.5 г два пъти дневно на пациенти с трансплантирана бъбреците. C_{max} на МФК обаче е била намалена с 40% при наличие на храна. След перорално приложение микофенолат мофетил не се измерва системно в плазмата. В концентрации от клинично значение МФК се свързва с плазмените албумини в 97%.

В резултат от ентерохепаталния кръговрат вторично повишение на плазмената концентрация на МФК обикновено се наблюдава приблизително 6-12 часа след приемане на дозата. Едновременното приложение на колестирамин (4 г три пъти дневно) се свързва с намаление на AUC на МФК с приблизително 40% което показва, че ентерохепаталният кръговрат е значителен.

МФК се метаболизира предимно чрез глюкуронил трансферазата до фенолов глюкуронид на МФК (МФКГ), който не е фармакологично активен.



Незначително количество от *веществото* ($< 1\%$ от дозата) се екскретира в урината като МФК. След перорално приложение на белязан микофенолат мофетил е наблюдавано пълно елиминиране на приемата доза, като 93% от нея са открити в урината, а 6% - във фекалиите. По-голямата количества (около 87%) от приложената доза се екскретира в урината като МФКГ.

При концентрации, които се наблюдават при клиничното приложение, МФК и МФКГ не се отстраняват чрез хемодиализа. При високи плазмени концентрации на МФКГ обаче ($> 100 \text{ мкг/мл}$) се отделят малки количества от МФКГ.

В ранния пост-транспланционен период (< 40 дни след трансплантацията) средната AUC на МФК е била приблизително с 30% по-малка, а C_{max} приблизително с 40% по-ниска при пациенти с бъбречна, сърдечна и чернодробна трансплантация в сравнение с късния пост-транспланционен период (3-6 месеца след трансплантацията).

Бъбречно увреждане:

В едно проучване с еднократна доза (6 лица в група) средната плазмена AUC на МФК, наблюдавана при болни с тежко хронично бъбречно увреждане (скорост на гломерулната филтрация $< 25 \text{ ml/min}/1.73 \text{ m}^2$) е била с 28-75% по-висока в сравнение със средната стойност при здрави индивиди или лица с по-малка степен на бъбречно увреждане. Средната AUC на МФКГ при единична доза обаче е била 3-6 пъти по-голяма при лица с тежко бъбречно увреждане в сравнение с лица с леко бъбречно увреждане или нормални здрави индивиди, което е логично при известното бъбречно елиминиране на МКФГ. Не е изследвано многократното приложение на микофенолат мофетил при пациенти с тежко хронично бъбречно увреждане. Няма данни от пациенти със сърдечна или чернодробна трансплантация и тежко хронично бъбречно увреждане.

Забавено функциониране на присадения бъбреck:

При болни със забавено постоперативно функциониране на присадката средната AUC_{0-12} на МФК е била сравнима с наблюдаваната при пациенти без забавяне на функционирането. Средната AUC_{0-12} на МФКГ е била 2-3 пъти по-голяма отколкото при болни след трансплантация без забавяне на функционирането на присадката. Може да се наблюдава преходно увеличение на свободната фракция и концентрация на плазмената МФК при пациенти със забавена функция на бъбречната присадка. Изглежда не се налага коригиране на дозата на CellCept.

Чернодробно увреждане:

При доброволци с алкохолна цироза процесите на глукuronизиране на МФК в черния дроб са били относително незасегнати от паренхимното заболяване на черния дроб. Ефектите на чернодробното заболяване върху този процес вероятно зависят от специфичната болест. Чернодробно заболяване с предимно

билиарно увреждане обаче, като първичната билиарна цироза, може да има различен ефект.

Деца и младежи (на възраст от 2 до 18 години):

Оценявани са фармакокинетичните показатели при 49 деца с бъбречна трансплантация, лекувани с 600 мг/м² микофенолат мофетил два пъти дневно. При тази доза са достигнати стойности на AUC на МФК подобни на тези при възрастни с трансплантация на бъбреци, получавали 1 г два пъти дневно в ранния и късния пост-трансплантационен период. Вътре във възрастовите групи стойностите на AUC на МФК в ранния и късния пост-трансплантационен период са били подобни.

Пациенти в напреднала възраст (≥ 65 години) &

Фармакокинетичното поведение на CellCept при пациенти в напреднала възраст не е изрично изследвано.

Орални контрацептиви:

Фармакокинетиката на оралните контрацептиви не се е повлияла от едновременното приложение със CellCept (виж също раздел 4.5.). Едно проучване с едновременно прилагане на CellCept (1 г два пъти дневно) и комбинирани орални контрацептиви, съдържащи етинилестрадиол (0.02 мг до 0.04 мг) и левоноргестрел (0.05 мг до 0.15 мг), дезоргестрел (0.15 мг) или гестоден (0.05 мг до 0.10 мг), проведено при 18 жени без трансплантация (без приемане на други имуносупресори) в продължение на 3 последователни менструални цикъла, не е показвало клинично значимо влияние на CellCept върху подтискация ефект на оралните контрацептиви върху яйчниците. Серумните нива на LH, FSH и прогестерона не са се повлияли значително.

5.3. Предклинични данни за безопасност

При експериментални модели микофенолат мофетил не е бил туморогенен. Най-високите дози, тествани при проучванията на канцерогенността върху животни, са довели до приблизително 2 до 3 пъти по-висока системна експозиция (AUC или C_{max}) в сравнение с наблюдаваната при препоръчваната клинична доза от 2 г дневно и 1.3-2 пъти по-висока от системната експозиция (AUC или C_{max}), установена при пациенти със сърдечна трансплантация при препоръчваната клинична доза от 3 г дневно.

Два теста за генотоксичност (in vitro тест с миша лимфома и in vivo микронуклеус тест върху костен мозък на мишки) са демонстрирали, че микофенолат мофетил има потенциал да предизвика хромозомни аберации. Тези ефекти може да са свързани с фармакодинамичния начин на действие, т.е. с инхибиране на нуклеотидната синтеза в чувствителните клетки. Други тестове in vitro за откриване на генни мутации не са показвали генотоксична активност.




Микофенолат мофетил няма ефект върху фертилността на мъжки плъхове при перорални дози до 20 мг/кг дневно. Системната експозиция при тази доза представлява 2 до 3 пъти клиничната експозиция при препоръчваната клинична доза от 2 г дневно при пациенти с бъбречна трансплантація и 1.3-2 пъти клиничната експозиция при препоръчваната клинична доза от 3 г дневно при пациенти със сърдечна трансплантація. При проучване на женската фертилност и репродукция, проведено върху плъхове, орални дози от 4.5 мг/кг дневно са предизвикали малформации (включително анофталмия, агнатия и хидроцефалия) в първо поколение при отсъствие на майчина токсичност. Системната експозиция при тази доза е била приблизително 0.5 пъти клиничната експозиция при препоръчваната клинична доза от 2 г дневно при пациенти с бъбречна трансплантація и приблизително 0.3 пъти клиничната експозиция при препоръчваната клинична доза от 3 г дневно при пациенти със сърдечна трансплантація. Не са установени ефекти върху фертилността или репродуктивните показатели при майките или при следващото поколение.

При тератологичните проучвания върху плъхове и зайци са наблюдавани фетални резорбции и малформации при плъхове при доза от 6 мг/кг дневно (включително анофталмия, агнатия и хидроцефалия) и при зайци при доза 90 мг/кг дневно (включително сърдечно-стъдови и бъбречни аномалии, като ектопия на сърцето и бъбреците и диафрагмална и умбиликална херния) при липса на майчина токсичност. Системната експозиция при тези нива е приблизително равна или по-малка от 0.5 пъти клиничната експозиция при препоръчваната клинична доза от 2 г дневно при пациенти с бъбречна трансплантація и приблизително 0.3 пъти клиничната експозиция при препоръчваната клинична доза от 3 г дневно при пациенти със сърдечна трансплантація.

Виж раздел 4.6.

Хемо.poетичната и лимфната системи са били основните органи, засегнати при токсикологичните изследвания, проведени с микофенолат мофетил при плъхове, мишки, кучета и маймуни. Тези ефекти са наблюдавани при нива на системна експозиция равни или по-малки от клиничната експозиция при препоръчваната доза от 2 г дневно при реципиенти на бъбречни трансплантати. Стомашно-чревни ефекти са били наблюдавани в кучета при нива на системна експозиция равни или по-малки от клиничната експозиция при препоръчваната доза. Стомашно-чревни и бъбречни ефекти, които свидетелстват за дехидратация, също са били наблюдавани при маймуни при най-високата доза (нива на системна експозиция равни или по-високи от клиничната експозиция). Профилът на неклинична токсичност на микофенолат мофетил изглежда е съвместим с нежеланите събития, наблюдавани при клиничните изпитвания върху хора, които сега осигуряват данни за безопасност от по-голямо значение за популацията пациенти (виж раздел 4.8.).



6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1. Списък на помощните вещества

CellCept 1 g/5 ml прах за перорална суспензия:
сorbitол,
безводен силициев диоксид,
натриев цитрат,
соев лецитин,
месен плодов ароматизатор,
ксантанова смола,
аспартам (E951),*
метил парабеноксибензоат (E218),
безводна лимонена киселина.

*съдържа фенилаланин, еквивалентен на 2.78 mg на 5 ml суспензия.

6.2. Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на тези, споменати в раздел 6.6.

6.3. Срок на годност

Срокът на годност на праха за перорална суспензия е две години.
Срокът на годност на приготвената суспензия е два месеца.

6.4. Специални предпазни мерки при съхранение

Прах за перорална суспензия и приготвената суспензия: да не се съхраняват при температура над 30°C.

6.5. Естество и съдържание на опаковката

Всяка бутилка съдържа 110 g прах за перорална суспензия. Когато се приготви за употреба, обемът на суспензиите е 175 ml, които осигуряват използваем обем 160-165 ml.

Осигуряват се също адаптор към бутилката и 2 дозатора.

6.6. Инструкции за употреба и работа и изхвърляне на продукта (ако е подходящо)

Тъй като микофенолат мофетил е показал тератогенна активност при плъхове и зайци, трябва да се избягва вдишване или директен контакт на сухия прах с кожата или лигавиците, както и директен контакт с приготвената суспензия.



Ако настъпи такъв контакт, мястото трябва да се измие обилно с вода и сапун, очите да се промият с обикновена вода.

Препоръчва се CellCept 1 г/5 мл прах за перорална суспензия да се приготви от фармацевт преди отпускането му на пациента.

Приготвяне на суспензиията

1. Разтърсете затворената бутилка няколко пъти, за да се разрохка прахът.
2. Отмерете 94 мл пречистена вода с градуиран цилиндрър.
3. Прибавете приблизително половината от цялото количество пречистена вода в бутилката и разклатете затворената бутилка добре в продължение на около 1 минута.
4. Добавете остатъка от водата и разклатете затворената бутилка добре за около 1 минута.
5. Махнете капачката, осигурена против отваряне от деца, и пъхнете адаптора на бутилката в гърлото й.
6. Затворете плътно бутилката с капачката, осигурена против отваряне от деца. Това ще осигури правилно положение на адаптора в бутилката и невъзможността от отварянето й от деца.
7. Напишете датата на изтичане на срока на годност на приготвената суспензия върху етикета на бутилката. (Срокът годност на приготвената суспензия е два месеца).

Всеки неизползван продукт или отпадъчен материал трябва да се изхвърли в съответствие с местните изисквания.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Рош България ЕООД, ул."Бяло поле" 16, 1618 София, България

8. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА В БЪЛГАРИЯ

II-5472

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА / ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА В БЪЛГАРИЯ

14.06.2002г.

10. ДАТА НА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

*Подробна информация за този лекарствен продукт се намира на уеб страницата на Европейската лекарствена агенция (EMEA)
<http://www.emea.eu.int/>*

