




ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Spasmomen®

Спазмомен®

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Spasmomen®
Спазмомен®



Какво съдържа Вашето лекарство?

Лекарствено вещество

Една таблетка съдържа 40 mg otilonium bromide.

Помощни вещества

Лактоза, нишесте, натриев нишесте гликолат, магнезиев стеарат, хидроксипропилметилцелулоза, титаниев диоксид, полиетиленгликол, талк.

Опаковка

30 филмирани таблетки за перорално приложение.

Как действа **Спазмомен®**?

Спазмомен® притежава спазмолитичен ефект (облекчава спазмите на гладката мускулатура в храносмилателната система).

Притежател на разрешението за употреба

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.,
Via Sette Santi, 3 – Florence, Италия

Производител

Berlin Chemie AG – Berlin, Германия

За какво се използва **Спазмомен®**?

Спазмомен® се прилага при т. нар синдром на раздразненото черво (болки и функционални смущения в дебелото черво при липса на болестни структурни промени), спазми и болезнени оплаквания от долната част на храносмилателната система.

Кога не трябва да се прилага **Спазмомен®**?

Известна свръхчувствителност към лекарството.

Кога е необходимо особено внимание при приложение на **Спазмомен®**?

Трябва да се прилага с внимание при хора с глаукома, хипертрофия на простатата и стеноза на пилора.

Може ли да се прилага **Спазмомен®** при деца?

Няма научни данни за ефективност и безопасност при лечение на деца. Ето защо не се препоръчва лечение със **Спазмомен** в детска възраст.

Какви взаимодействия може да има между **Спазмомен®** и други лекарства, които приемате?

Няма взаимодействия.

Може ли да се прилага **Спазмомен®** по време на бременност и кърмене?

Приложението по време на бременност и кърмене трябва да се ограничи до случаи на истинска необходимост и да се осъществява само под пряко лекарско наблюдение.

Повлиява ли **Спазмомен®** способността за шофиране и работата с машини?

Не са съобщавани ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.



Как и колко време трябва да се прилага *Спазмомен*[®]?

Спазмомен[®] се приема по 1 таблетка 2-3 пъти дневно според лекарските указания. Продължителността на лечение е според лекарското предписание.

Какво трябва да се прави при предозирание с *Спазмомен*[®]?

Otilonium bromide на практика е лишен от токсични ефекти при животни. Следователно и при хора не би трябвало да се наблюдават особени проблеми при предозирание.

Ако при предозирание се появят проблеми, се препоръчва симптоматично и поддържащо лечение.

Какви нежелани лекарствени реакции може да причини *Спазмомен*[®]?

Лекарството не води до нежелани лекарствени реакции в препоръчаните терапевтични дози и най-вече – не води до атропино-подобни ефекти.

При проява на някакви нежелани лекарствени реакции, информирайте Вашия лекар или фармацевт!

Как да съхранявате *Спазмомен*[®]?

Да се съхранява под 30 °C!

Да не се използва след срока на годност, обозначен на опаковката!

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Дата на последната редакция на листовката

Август, 2006 г.

