

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Inkontan 30mg , Инконтан 30мг

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

1 филмирана таблетка съдържа 30 мг Троспиум хлорид

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирани таблетки

4. КЛИНИЧНИ СВОЙСТВА

4.1 Терапевтични показания

Лечение на функционални смущения на пикочния мехур (нестабилност или хиперрефлексия на детрузора) със симптоми на често уриниране, чести позиви за уриниране и неволно изпускане на урина с или без позиви.

4.2 Дозировка и начин на приложение

3 пъти дневно по 1/2 таблетка (=15 мг) или сутрин 1 таблетка (30 мг) и вечер 1/2 таблетка (=15 мг) /отговаря на дневна доза от 45 мг Троспиум хлорид/.

При пациенти с тежка бъбречна недостатъчност (креатининов клирънс 10-30 ml/min/1,73 m²) се препоръчва индивидуално намаление на дневната доза, в зависимост от съотношението между добър терапевтичен ефект и минимално нежелано действие (25-50 % от обичайната дневна доза).

За употребата на Инконтан при пациенти с чернодробна недостатъчност няма данни (виж Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба).

Поради липса на данни Инконтан не трябва да се прилага при деца под 12 години.

Филмираните таблетки трябва да се приемат цели, с достатъчно количество вода, преди хранене.

Нуждата от продължителна употреба трябва да се проверява редовно, на всеки 3-6 месеца.

4.3 Противопоказания

- свръхчувствителност към някоя от съставките на лекарството
- задръжка на урина
- тесноъгълна глаукома
- тахиаритмия
- Myastenia gravis

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 11-15331/22.12.06	
708/05.12.06	



- тежък Colitis ulcerosa
- токсичен мегаколон
- бъбречна недостатъчност със задължителна диализа (креатининов клирънс под $10 \text{ ml/min}/1,73 \text{ m}^2$)
- деца под 12 години

4.4 Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Троспиум хлорид трябва да се използва с внимание при:

- обструкция в стомашно-чревния тракт (напр. стеноза на пилора)
- обструкция на пикочните пътища, ако има рисък от задръжка на урина
- автономна невропатия
- хиатусна херния с рефлукс-езофагит
- заболявания, при които пулсът не трябва да се ускорява, напр. хипертиреоидизъм, коронарна болест на сърцето, сърдечна слабост (в тези случаи се препоръчва честото измерване на пулса)

При наличие на детрузор-сфинктерна диссинергия се препоръчва интермитентна катетеризация, по възможност извършена от самия пациент, за постигане на пълно изпразване на мехура, без остатъчна урина. В противен случай употребата на Инконтан не се препоръчва.

Троспиум хлорид се екскретира главно чрез бъбреците. Значително повишени стойности на плазмената концентрация се наблюдават при пациенти със силно ограничени бъбречни функции. Затова трябва да се внимава при пациенти с нарушенa бъбречна функция.

Няма данни за употребата на Инконтан при пациенти с чернодробна недостатъчност. При *in vitro* изследвания с редица Cytochrome P 450-ензими, които участват при метаболизма на лекарствените вещества (1A1, 1A2, 2A6, 3A4, 2B6, 2C8, 2C9-Arg, 2C19, 2D6-Val, 2E1), Троспиум хлорид в концетрации, които отговарят на плазмената концентрация след орално приложение на терапевтичната доза при хора, не се метаболизира.

Преди началото на терапията трябва да барат изключени органични причини за изброените в точка 4.1 /Терапевтични показания/ симптоми като сърдечни и бъбречни заболявания, полидипсия, инфекции и тумори на пикочните органи.

Една филмирана таблетка Инконтан 30 mg съдържа 100 mg лактоза. Това количество е вероятно недостатъчно, за да предизвика при предразположени пациенти симптоми на лактозна неперенаност.

4.5 Взаимодействия с други лекарствени средства

Възможни са следните взаимодействия :

- засилване ефекта на антихолинергичните средства като аманадин, трициклични антидепресанти, хинидин, антихистамини и дизопирамид
- засилване на тахикардните ефекти, причинени на бета-симпатикомиметици
- отслабване действието на прокинетични средства като метоклопрамин, физаприй
- Троспиум хлорид влияе на стомашно-чревния мотилитет и секреция. Затова при едновременна употреба е възможна промяна в резорбцията на други лекарствени средства
- лекарствени продукти като гуар, холестирамин, холестипол могат да понижат резорбцията на Троспиум хлорид. Затова едновременната им употреба е нежелана.



При *in vitro* изследвания с редица Cytochrom P 450-ензими, които участват при метаболизма на лекарствените вещества (1A1, 1A2, 2A6, 3A4, 2B6, 2C8, 2C9-Arg, 2C19, 2D6-Val, 2E1), Троспиум хлорид не променя тяхната активност. Тъй като Троспиум хлорид се метаболизира в незначителна степен и главно чрез хидролиза на естер, не се очакват метаболитни взаимодействия.

4.6 Бременност и кърмене

При опити с животни не са открити доказателства за негативни ефекти.

При пътевые Троспиум хлорид преминава през плацентарната бариера и се екскретира в кърмата. За употребата при хора няма данни.

Затова Инконтан 15 мг не трябва да се приема по време на бременност или кърмене, освен ако това не е абсолютно необходимо.

4.7 Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Поради смущения в акомодацията, способността за шофиране или работа с машини може да бъде намалена.

Изследвания за влиянието на Троспиум хлорид върху други параметри (визуална ориентация, обща скорост на реакциите, рекции при стрес, концентрация и моторна координация), които определят способността за шофиране и работа с машини, не показват ефект на Троспиум хлорид.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Антихолинергични ефекти като намалена секреция на слюнка, диспепсия, запек могат да бъдат проявени при лечение с Троспиум хлорид.

Чести случаи (>1 %)

Стомашно-чревен тракт: сухота в устата, диспепсия, запек, болки в корема, гадене

Редки случаи (< 1 %)

Пикочни органи: проблеми при уриниране (напр. задръжка на урина)

Сърдечно-съдова система: тахикардия

Стомашно-чревен тракт: диария, газообразуване

Дихателна система: диспнеа

Кожа: обриви

Сетивни органи: смущенията в акомодацията (преди всичко при пациенти с хиперметропия и без коригиран *vusus*)

Общи: астения, болка в гърдите.

Отделни случаи (< 0,1 %)

Пикочни органи: задръжка на урина

Сърдечно-съдовасистема: тахиаритмия

Кожа: отоци на тъканите (angioedem)

Черен дроб и жълчка: леко до средно повишение на трансаминазите



Общи: Анафилактична реакция

4.9 Предозиране

При употреба на максималната доза от 360 mg троспиум хлорид при доброволци е наблюдавана сухота в устата, тахиаритмия, миционни смущения.

Досега не са наблюдавани тежки случаи на предозиране и интоксикация при хора.

Симптоми на предозиране са и антихолинергичните ефекти.

Мерки в случай на предозиране:

- стомашна промивка и намаляване на резорбцията (активен въглен)
- локално приложение на пилокарпин при пациенти с глаукома
- катетеризация при задръжка на урина
- приложение на парасимпатомиметик (напр. неостигмин) при тежки симптоми
- приложение на бета-рецепторен блокер при недостатъчен отговор на приложената терапия, изразена тахикардия и/или нестабилно кръвообръщение (напр. първоначално 1 mg пропранолол i.v. под ЕКГ-контрол и контрол на кръвното налягане)

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 Фармакодинамични свойства

Троспиум хлорид, кватернерно амониево производно на нортропанол, спада към групата на парасимпатолитичните или антихолинергичните съединения. Лекарственият продукт се конкурира, в зависимост от концентрацията, с ендогения медиатор ацетилхолин в постсинаптичните парасимпатични рецептори. Троспиум хлорид има висок афинитет към M1-, M2- и M3-субтипов мускаринови рецептори и е с нисък афинитет към никотиновите рецептори.

Антихолинергичното действие на Троспиум хлорид води до релаксиращ ефект върху гладките мускули и органи чрез мускариновите рецептори.

При опити с животни и при хора Троспиум хлорид понижава тонуса на гладките мускули в стомашно-чревния и урогениталния тракт. Троспиум хлорид понижава също бронхиалната секреция, отделянето на слюнка и пот, смузва акомодацията на очите.

5.2 Фармакокинетични свойства

4-6 часа след орален прием на Троспиум хлорид се достига максимална плазмена концентрация. Абсолютната бионаличност на единичната доза от 45 mg Троспиум хлорид (3 таблетки Инконтан 15 mg) е 6 % (конфиденционен интервал 5-8 %).

Едновременното приемане на храна, особено на мазна храна, намалява бионаличността на Троспиум хлорид (AUC_{ss} спада на 59 % от стойността на гладно).

Системно наличния Троспиум хлорид се екскретира чрез бъбреците главно непроменен, малка част се екскретира като спироалкохол, метаболит образуван чрез хидролиза на естер.



Времето на полуелиминиране е 5-20 часа.

Не се наблюдава акумулация.

Троспиум хлорид се свързва с плазмените протеини до 60-75 %.

Няма разлика в кинетиката в зависимост от възрастта и пола.

При изследване на пациенти с тежки нарушения на бъбрената функция (креатининов клирънс 8-32 ml/min) средната стойност на AUC бе 4 пъти по-висока, на C_{max} - 2 пъти по-висока, времето на полуживот - 2 пъти по-дълго. За употребата на Инконтан при пациенти с по-ниска степен на бъбренна недостатъчност няма данни.

За употребата на Инконтан при пациенти с чернодробна недостатъчност няма данни. При *in vitro* изследвания с редица Cytochrome P 450-ензими, които участват при метаболизма на лекарствените вещества (1A1, 1A2, 2A6, 3A4, 2B6, 2C8, 2C9-Arg, 2C19, 2D6-Val, 2E1), Троспиум хлорид в концетрации, които отговарят на плазмената концентрация след орално приложение на терапевтичната доза при хора, не се метаболизира.

5.3 Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хората на база на конвенционалните фармакологични изпитвания за безопасност, токсичност при многократно приложение, генотоксичност, канцерогенен потенциал, репродуктивна токсичност.

При плъхове Троспиум хлорид преминава през плацентарната бариера и се екскретира в кърмата.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ СВОЙСТВА

6.1 Списък на помощните вещества:

Титанов диоксид, микрокристална целулоза, метилхидроксипропилцелулоза, лактоза, царевично нишесте, натриево-нишестен гликолат, поливидон K25, високодисперсен силициев диоксид, стеаринова киселина

6.2 Несъвместимости

Не са известни досега.

6.3 Срок на годност

5 години

Не използвайте продукта след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.



6.4 Специални условия за съхранение

Да не се съхранява под 30°C.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Да се спазват указанията за употреба.

6.5 Дани за опаковката

Блистер

Опаковка с 20 филмирани таблетки

Опаковка с 50 филмирани таблетки

6.6 Указания за употреба

Няма.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H
Salzbergstrasse 96, 6060 Absam/Tyrol, Austria

8. НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ / ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

10. ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

12/2006

Отпуска се по лекарско предписание.

