

УКАЗАНИЕ ЗА УПОТРЕБА

Inkontan 30 mg Инконтан 30 mg

Филмирани таблетки

Активно вещество: Trospium chloride

Какво съдържа Инконтан 30 mg?

1 филмирана таблетка съдържа 30 mg Trospium chloride и помощни съставки: титанов диоксид, микрокристална целулоза, метилхидроксипропилцелулоза, лактоза, царевично нишесте, натриево-нишестен гликолат, поливидон K25, високодисперсен силициев диоксид, стеаринова киселина.

Лекарствена форма:

Филмирани таблетки

Големина на опаковките:
по 20 и по 50 броя

Как действа Инконтан 30 mg?

Инконтан 30 mg действа отпускащо на мускулатурата на пикочния мехур и чрез това намалява увеличения натиск на урината и неволното изпускане на урина.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H, 6060 Absam/Tirol,Austria

Кога трябва да използвате Инконтан 30 mg?

Лечение на функционални смущения на пикочния мехур (нестабилност на детрузора или хиперрефлексия на детрузора) със симптоми:

- често уриниране
- чести позиви за уриниране
- неволно изпускане на урина с или без позиви

Кога не трябва да се употребява
Инконтан 30 mg?

При следните оплаквания или състояния не трябва да приемате Инконтан 30 mg:

- свръхчувствителност към някоя от съставките на таблетките
- задръжка на урина
- тесноъгълна глаукома
- смущения на сърдечния ритъм с ускорен пулс
- болезнена мускулна слабост (Myastenia gravis)
- тежки възпалителни заболявания на дебелото черво (Colitis ulcerosa, токсичен мегаколон)

- бъбречна недостатъчност със задължителна дуализма (креатининов клирънс под 10 ml/min/1,73 m²)

Инконтан не трябва да се прилага при деца под 12 години.

Моля, попитайте Вашия лекар, ако мислите, че това се отнася за Вас.

Какво трябва да имате предвид по време на бременност и кърмене?

По време на бременност и кърмене Инконтан може да се приема само в случай на безусловна необходимост. Трябва да попитате Вашия лекар.

За какво трябва да внимавате особено?



Внимание: този лекарствен продукт може да повлияе върху способността за шофиране и работа с машини! Когато приемате Инконтан 30 mg може да се получи евентуално смущение на зрителната острота. В такъв случай не трябва да шофирайте и да работите с машини.

Моля, уведомете Вашия лекар:

- ако сте бременна или планирате забременяване
- ако страдате от други заболявания или от алергия
- ако приемате други лекарствени продукти (също и такива, които се отпускат без рецепт)
- В следните случаи Инконтан може да се използва само с внимание. Попитайте Вашия лекар ако мислите, че това се отнася за Вас.
- стеснение в stomashno-chrevnia trakt (напр.. стеноза на пилора)
- стеснения на пикочните пътища, ако има риск от задръжка на урина
- определени нервни заболявания (автономна невропатия)
- херния на diafragmata с връщане на киселини в хранопровода (хиатусна херния с рефлукс - езофагит)
- заболявания, при които пулсът не трябва да се ускорява, напр. хипертиреоидизъм, коронарна болест, сърдечна слабост (в тези случаи се препоръчва често измерване на пулса)
- бъбречна и чернодробна недостатъчност

Преди да започнете лечението с Инконтан трябва да е сигурно, че оплакванията не са причинени от други заболявания.

ИАЛ
ОД ОБРЕНОИ
ДАТА 05.12.06г.



Една филмирана таблетка Инконтан 30 mg съдържа 100 mg лактоза.

Както всички лекарствени продукти и Инконтан трябва да се съхраняват на недостъпно за деца място.

Какво трябва да имате в предвид ако заедно с Инконтан 30 mg, използвате и други лекарства?

Моля, уведомете Вашия лекар какви други лекарствени средства приемате редовно.

Действието на някои лекарствени продукти може да се засили от Инконтан:

- някои средства срещу Паркинсонова болест (Амантидин)
- някои средства срещу сърдечни ритъмни смущения (хинидин и дизопирамид)
- някои средства срещу депресии (трициклични антидепресанти)
- някои средства срещу алергии (антихистамини).

Когато приемате определени лекарства срещу сърдечни оплаквания или астма (бета-симпатикомиметици) приемът на Инконтан може да ускори пулса.

Действието на различни лекарствени средства, които засилват движението на червата може да се намали от Инконтан (метоклопрамид, цизаприд).

Понякога е възможно някои лекарства да се елиминират по-бързо или по-бавно от тялото, когато се приемат едновременно с Инконтан.

Едновременният прием на някои лекарствени продукти срещу смущения на мастната обмяна (Гуар, Холестирамин, Холестинол) може понякога да повлияят върху действието на Инконтан. Затова те не трябва да се прилагат едновременно.

Винаги питайте Вашия лекар, когато се съмнявате дали да приемате Инконтан заедно с други лекарствени продукти.

Колко често и колко продължително трябва да приемате Инконтан 30 mg?

Моля, приемайте Инконтан така както Ви е предписан лекарят.

Препоръчителната доза е 3 пъти дневно по 1/2 табл.(=15 mg) или сутрин 1 табл.(30 mg) и вечер 1/2 табл.(=15 mg)/отговаря на дневна доза 45mg. Ако страдате от тежка бъбречна недостатъчност, Вашият лекар ще Ви предпише по-ниска доза (1/4 до 1/2 от обичайната доза).

Вашият лекар може да реши, че трябва да приемате Инконтан по-продължително време. В такъв случай той редовно (на всеки 3 до 6 месеца) трябва да Ви преглежда, за да разбере дали лечението е още необходимо.

Как е най-добре да приемате Инконтан 30 mg?

Таблетките трябва да се гълтат с чаша вода без да се дъвчат. Приемайте ги на празен stomах, преди хранене.

Какво трябва да направите ако сте приемали по-голямо количество таблетки Инконтан 30 mg?

Ако по погрешка сте приемали повече таблетки, може да се стигне до различни нежелани ефекти - зрителни смущения, ускорен пулс, сухота в устата и зачервяване на кожата. Моля, винаги уведомявайте веднага Вашия лекар, ако сте приемали повече таблетки Инконтан.

Какви нежелани лекарствени реакции може да се появят при употреба на Инконтан 30 mg?

Както всеки лекарствен продукт Инконтан 30 mg също има нежелани ефекти. Моля, уведомете Вашия лекар, ако имате оплаквания.

Често (при повече от 1 на 100 пациенти) може да се появят сухота в устата, симпателни разстройства, болки в корема, гадене и запек.

В редки случаи (по-малко от 1 на 100 пациенти) може да се наблюдават нарушения в уринирането, ускорен пулс, смущения в зрителната острота (преди всичко при далекогледи пациенти, чието далекогледство не е коригирано с очила), диария, газообразуване, слабост или болка в гръдените, недостиг на въздух, кожни обриви.

В отделни случаи (по-малко от 1 на 1000 пациенти) може да се стигне до задръжка на урина, сърдечни ритъмни смущения с ускорен пулс, отоци или общи алергични реакции, както и леко повишение на чернодробните проби в кръвта.

Ако смятате, че имате други оплаквания, причинени от този лекарствен продукт, моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Срок на годност и съхранение.

5 години

Спазвайте срока на годност и не използвайте Инконтан 30 mg след изтичането му.

Съхранявайте под 30°C.

Последна редакция:

Декември 2006

Ако имате още въпроси или неясноти относно този лекарствен продукт и употребата му, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

