


Pentasa® /Пентаза
супозитории по 1 g



Прочетете внимателно тази информация преди да започнете да вземате това лекарство.

- Пазете тази информация. Може да се нуждаете да я прочетете отново.
- Ако имате някакви въпроси обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.
- Вашият лекар Ви предписва Pentasa® супозитории за лично Вас, така че не трябва да давате лекарство на други, То може да им навреди, дори ако имат същите симптоми като Вашите.

Тази листовка съдържа информация относно:

1. Действие и употреба.
2. Важна информация, която трябва да прочетете преди да използвате Pentasa® супозитории.
3. Как да използвате Pentasa® супозитории.
4. Нежелани реакции.
5. Съхранение.
6. Друга информация.

1. ДЕЙСТВИЕ И УПОТРЕБА

Pentasa® супозитории потиска хроничното възпаление и кървенето при улцерозен проктит.

Вашият лекар може да предпише лекарството Ви за друга употреба. Винаги следвайте указанията на Вашия лекар.

2. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ PENTASA® СУПОЗИТОРИИ

Да не се използват Pentasa® супозитории, ако:

- имате сериозно заболяване на черния дроб или бъбреците.
- имате язва на стомаха или дуоденума.
- имате склонност към кървене от кожата или лигавиците в
- допълнение към кървенето от червата.
- сте свръхчувствителни към месалазин, салицилати, към една или
- повече от другите съставки в Pentasa® супозитории.

Специални предпазни мерки:

Информирайте Вашия лекар, ако:

- сте свръхчувствителни към сулфасалазин
- черният Ви дроб не функционира нормално
- бъбреците Ви не функционират нормално
- вземате лекарства за артрит или болка (нестероидни противовъзпалителни средства)



- вземате лекарства за автоимунни заболявания (азатиоприн)
- имате влошена белодробна функция (астма)
- внезапно развиете гърчове, болка в стомаха, повишена телесна температура, изразено главоболие и обрив. В такива случаи Вие трябва да спрете веднага използването на Pentasa®

Важно е Вашият лекар да Ви мониторира, докато използвате Pentasa® супозитории.

Важна информация относно предпазителя за пръста, съдържащ се в опаковката на Pentasa® супозитории.

Предпазителят за пръста, приложени в опаковката на Pentasa® супозитории съдържат естествена гума/латекс и могат да предизвикат сериозни алергични реакции.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете някакво лекарство.

Бременност

Вие трябва да използвате Pentasa® само по назначение на Вашия лекар. Опитът с Pentasa® е ограничен.

Кърмене

Да не се използва Pentasa®, ако кърмите. Опитът с Pentasa® е ограничен. Посъветвайте се с Вашия лекар.

Шофиране и работа с машини

Pentasa® не повлиява безопасността при работа и способността за шофиране.

Използване на други лекарства

Съществува повишен риск от нарушения на кръвта, ако използвате по същото време заедно с Pentasa® лекарства за автоимунни заболявания (азатиоприн). Посъветвайте се с Вашия лекар.

Винаги информирайте Вашия лекар, ако вземате или сте вземали напоследък някакви други лекарства получени без рецепта, лекарства закупени в чужбина, природни продукти, силно активни витамини и минерали.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ PENTASA® СУПОЗИТОРИИ

Дозировка

Възрастни:

1 супозитория (1 g) 1-2 пъти дневно.

Деца:

Pentasa® трябва да се прилага на деца само при специални случаи. Pentasa® не трябва да се дава на деца под 2 годишна възраст. Посъветвайте се с Вашия лекар.



Може да използвате супозиториите заедно с Pentasa® таблетки, в случаи при които заболяването е по-широко разпространено в червата и ако имате забавен отговор към самостоятелното лечение с таблетки.

Указания за употреба:

1. Препоръчва се да отидете до тоалетната непосредствено преди да използвате супозиторията.
2. Поставете един от гугените предпазители върху пръста.
3. Поставете супозиторията колкото е възможно по-навътре в правото черво.
4. Поставянето може да бъде по-лесно, ако първо навлажните супозиторията с вода или овлажняващ крем.
5. Ако супозиторията се изхвърли в първите 10 минути може да се постави друга.
6. Изхвърлете използвания предпазител на пръста.

Винаги следвайте указанията на Вашия лекар. Има различия в индивидуалните изисквания. Лечение може да бъде променено или спряно само след консултиране с Вашия лекар.

Употреба на повече Pentasa® супозитории, отколкото трябва!

Опитът от предозиране е ограничен. Потърсете Вашия лекар, фармацевт или отделението за спешна помощ, ако сте използвали повече Pentasa® супозитории, отколкото е посочено в тази информация или отколкото Вашият лекар Ви е предписал и Ви се почувствате недобре.

Ако забравите да вземете Pentasa® супозитории

Не използвайте двойна доза, ако забравите да вземете дозата на Pentasa® супозитории. Продължете с нормалната дозировка.

4. НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарства Pentasa® супозитории може да предизвика нежелани реакции.

Сериозни нежелани реакции

Редки нежелани реакции (наблюдаващи се между 1 и 10 на 10,000 пациенти):

Възпаление на перикарда, болка в гръдния кош, повишение на телесната температура, скъсено дишане. Потърсете лекар или отделението за спешна помощ.

Възпаление на панкреаса: изразена болка в стомаха, повишена телесна температура. Потърсете лекар или отделението за спешна помощ.

Много редки нежелани реакции (наблюдаващи се при по-малко от 1 на 10,000 пациенти):

Сериозни ефекти върху кръвта: кървене, натъртване при удар, малки кожни кръвоизливи, умора, повишена телесна температура, постоянен ларингит или



други форми на възпаление. Потърсете лекар или отделението за спешна помощ.

Ефекти върху черния дроб: жълтеница, умора, увеличени чернодробни показатели. Потърсете Вашия лекар.

Пневмония. Потърсете Вашия лекар.

Ефекти върху бъбреците: повишена телесна температура, подуване на краката, ръцете и лицето, болка в кръста.

Потъмняване на урината. Бъбречна недостатъчност. Потърсете Вашия лекар.

Сериозни реакции на свръхчувствителност със затруднено дишане и подуване на езика, устните и лицето. Потърсете веднага лекар или отделението за спешна помощ.

Повишено вътречерепно налягане: изразено главоболие, гадене, повръщане, забавен пулс. Потърсете веднага лекар или отделението за спешна помощ.

Повишена телесна температура, умора, болка и подуване на ставите, болка в мускулите и обрив поради заболяване на съединителната тъкан.

Потърсете Вашия лекар.

Влошаване на чревното заболяване. Потърсете Вашия лекар.

Несериозни нежелани реакции

Чести нежелани реакции (наблюдаващи се между 1 и 10 на 100 пациенти):

Диария, болка в стомаха, гадене, повръщане, подпухване, уртикария, обрив, главоболие, повишена телесна температура.

Нечести нежелани реакции (наблюдаващи се между 1 и 10 на 1,000 пациенти):

Повишена чувствителност на кожата към слънчева светлина.

Редки нежелани реакции (наблюдаващи се между 1 и 10 на 10,000 пациенти):

Виене на свят.

Много редки нежелани реакции (наблюдаващи се при по-малко от 1 на 10,000 пациенти):

Реакции на свръхчувствителност, повишена телесна температура, нарушена чувствителност на ръцете и краката, преходна загуба на коса.

Болка в ставите и мускулите.

Ако забележите някакви нежелани реакции, които не са посочени в тази информация моля да уведомите Вашия лекар или фармацевт за да могат тези нежелани реакции да бъдат съобщени в Изпълнителна Агенцията по лекарствата и така да бъдат подобро познаването на страничните ефекти.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако имате нежелани реакции, които са постоянни и обезпокояващи. Някои нежелани реакции могат да изискват лечение.

5. СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на недостъпно за деца място.

Да не се използва след изтичане срока на годност посочен върху опаковката.



6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Съставки на Pentasa® супозитории в 1 g:

Лекарственото вещество е месалазин (mesalazine).

Помощните вещества са: повидон, макрогол 6000, магнезиев стеарат и талк.

Притежател на разрешението за употреба

Борола ЕООД, ул. Цар Самуил 125, София 1202, България

Производител

Ferring A/S, Indertofte 10, DK-2720 Vanlose, Denmark

Ferring International Center SA, Chemin de la Vergodnausaz 50,
1162 St – Prex, Switzerland

Тази листовка за опаковката бе последно редактирана през м. ноември 2006.

