

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

PENTASA®/ПЕНТАЗА

1. Търговско име на лекарствения продукт
Pentasa®

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 15505 29. 02. 06	
709/19-12-2006	Министър

2. Качествен и количествен състав
Mesalazine 500 mg в 1 таблетка с удължено освобождаване

За помощните вещества вж. точка 6.1.

3. Лекарствена форма

Таблетки с удължено освобождаване
Бяло сиви до бледо кафяви, на петна кръгли таблетки.

4. Клинични данни

4.1. Терапевтични показания:

Улцерозен колит.
Болест на Крон.

4.2. Дозировка и начин на приложение

Общо:

Деца: Не трябва да се използва при деца под 2-годишна възраст. Има ограничени клинични данни за лечение на деца. Mesalazine трябва да се използва при деца само в случаи, при които е преценено, че потенциалната полза от лечението надвишава възможните рискове.

По-възрастни пациенти: Не се налага намаляване на дозата.

Нарушена бъбречна функция: вж. точка 4.4.

Улцерозен колит, активна форма

Възрастни: Индивидуална дозировка до 4,5 g mesalazine дневно, разделени в няколко отделни приема.

Деца над 2-годишна възраст: Дозировката е индивидуална, обикновено 20-30 mg/kg телесно тегло mesalazine дневно, разделени в няколко отделни приема.

Улцерозен колит, Поддържащо лечение:

Възрастни: Дозировката е индивидуална, като се препоръчва до 2 g mesalazine дневно, разделени в няколко отделни приема.

Деца над 2-годишна възраст: Дозировката е индивидуална, обикновено 20-30 mg/kg телесно тегло mesalazine дневно, разпределени в няколко отделни приема.

Болест на Крон, активна форма и поддържащо лечение

Възрастни: Дозировката е индивидуална, до 4,5 g mesalazine дневно разделени в няколко отделни приема.

Деца над 2-годишна възраст: Индивидуално дозиране, като нормалната дозировка е 20-30 mg/kg телесно тегло mesalazine дневно, разпределени в няколко отделни приема.

Трябва да се назначи друго лечение при пациенти с остра форма на болестта на Крон, които не се повлияват от 4 g mesalazine дневно в продължение на 6 седмици и при пациенти с болестта на Крон в случаите на обостряне на болестта, въпреки поддържащото лечение с 4 g mesalazine дневно.

Таблетките с удължено освобождаване не трябва да се сдългват. За по-лесно приемане таблетките могат да се разделят или разтворят във вода или плодов сок непосредствено преди приемане. Важно е дозите да се вземат редовно и последователно за да се получи желания ефект.

4.3. Противопоказания

Тежко нарушение на чернодробната и/или бъбречната функция.

Стомашна или дуоденална язва.

Хеморагична диатеза.

Свръхчувствителност към активното вещество или към някои от помощните вещества на продукта или към салицилати.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Препоръчва се повищено внимание при пациенти, алергични към sulfasalazine поради рисък от алергия към салицилати. В случай на остри прояви на непоносимост т.е. крампи, болки в корема, втрисане, тежко главоболие и обрив лечението трябва веднага да се спре.

Препоръчва се повищено внимание при пациенти с увредена чернодробна функция. Mesalazine не се препоръчва за употреба при пациенти с бъбречно увреждане. Предизвиканата от mesalaizne нефротоксичност може да се очаква при пациенти, които развиват бъбречна дисфункция по време на лечението. Едновременното приложение на други известни нефротоксични средства напр. НПВС и азатиоприн може да повиши риска от бъбречни реакции (виж раздел 4.5.).

По време на лечението трябва да се изследват кръвта и урината. Изследване се препоръчва преди започване на лечението, след 2 седмици и след това 2-3 пъти през интервал от 4 седмици. При нормални резултати изследването трябва да се прави на всеки три месеца или веднага, ако са налице други прояви на болестта. Препоръчва се контрол на серумния карбамид и креатинин, на седимента на урината и на метхемоглобина.

Пациенти с увредена функция на белите дробове и по-специално с астма трябва да се мониторират по време на лечението.



4.5. Лекарствени и други форми на взаимодействие

Едновременното лечение с азатиоприн или 6-меркаптопурин може да повиши риска от потискане на костния мозък (левкопения, тромбоцитопения, еритроцитопения/анемия или панцитопения). Комбинирането на mesalazine и азатиоприн при няколко проучвания показва тенденция към по-висока честота на левкопения, отколкото при самостоятелното лечение с азатиоприн. Причината за това все още не е изяснена.

4.6. Бременност и кърмене

Бременност:

Mesalazine трябва да се използва по време на бременност само, ако потенциалните ползи от лечението за майката надвишават възможните рискове за плода.

Установено е, че mesalazine преминава плацентарната бариера. Ограниченията данни за използването на това съединение при бременни жени не позволяват оценка на възможните нежелани ефекти. Не са наблюдавани тератогенни ефекти при проучвания на експериментални животни или при контролирани проучвания на хора.

Нарушения от страна на кръвта (левкопения, тромбоцитопения, анемия) са наблюдавани при новородените на майки, които са били лекувани с mesalazine.

Кърмене:

Mesalazine трябва да се използва по време на кърмене само, ако потенциалните ползи за майката от лечението надвишават възможните рискове за плода.

Mesalazine се излъчва с кърмата. Концентрацията на mesalazine в кърмата е пониска, отколкото в кръвта на майката, докато неговият метаболит — ацетил-месалазин е в сходни или увеличени концентрации.

Не са провеждани контролирани проучвания с mesalazine по време на кърмене. Има ограничен опит от използването на перорален mesalazine при кърмещи жени.

Реакции на свръхчувствителност като диария не могат да бъдат изключени.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Mesalazine не повлиява или само незначително повлиява способността за шофиране или работа с машини.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

Най-често наблюдаваните при клиничните проучвания нежелани реакции са диария (3%), гадене (3%), коремни болки (3%), главоболие (3%), повръщане (1%) и кожни обриви (1%).



Заболявания на кръвта и лимфата Много редки (< 1/10 000, включително единични случаи)	еозинофилия (като част от алергична реакция), анемия, апластична анемия, левкопения (вкл. гранулоцитопения), тромбоцитопения, агранулоцитоза, панцитопения
Заболявания на имунната система Много редки (< 1/10 000, включително единични случаи)	Реакции на свръхчувствителност, Втрисане
Заболявания на централната и периферната нервна система Редки (>1/10 000 и <1/1 000) Много редки (< 1/10 000, включително единични случаи)	Световъртеж, замаяност Периферна невропатия, доброкачествена хипертония (при млади хора в пубертета)
Заболявания на миокарда, ендокарда, перикарда и клапите Редки (>1/10 000 и <1/1 000)	Миокардит*, перикардит*
Заболявания на дихателните пътища, гръденния кош и медиастинума Много редки (< 1/10 000, включително единични случаи)	Алергични белодробни реакции (вкл. диспнея, кашлица, алергичен алвеолит, белодробна езинофилия, белодробна инфильтрация, пневмонит, бронхоспазъм)
Заболявания на стомашно-чревния тракт Чести (> 100 и < 1/10) Редки (>1/10 000 и <1/1 000) Много редки (< 1/10 000, включително единични случаи)	Диария, коремни болки, гадене, повръщане, метеоризъм Увеличена амилаза, панкреатит* Остро обостряне на симптомите на колит
Заболявания на черния дроб и жлъчните пътища Много редки (< 1/10 000, включително единични случаи)	Повишени чернодробни ензими и билирубин, хепатотоксичност (вкл. хепатит*, цироза, чернодробна недостатъчност)



Дерматологични заболявания	
Чести (> 100 и $< 1/10$)	Уртикария, екзантем
Нечести ($> 1\ 000$ и $< 1/100$)	Реакции на фоточувствителност
Много редки ($< 1/10\ 000$, включително единични случаи)	Обратима алопеция, едем на Квинке
Заболявания на скелетната мускулатура, сухожилията и костите	
Много редки ($< 1/10\ 000$, включително единични случаи)	Миалгия, артракгия, лупус еритематодес — подобни реакции
Заболявания на бъбреците и никочните пътища	
Много редки ($< 1/10\ 000$, включително единични случаи)	Нарушена бъбречна функция (вкл. интерстициален нефрит*, нефротичен синдром), безцветна урина, бъбречна недостатъчност, която може да бъде обратима
Общи симптоми и нарушения в мястото на прилагане	
Чести (> 100 и $< 1/10$)	Главоболие, втрисане

(*) Механизмът на предизвиканите от mesalazine миокардит и перикардит, панкреатит, нефрит и хепатит е неизвестен, но вероятно е от алергичен произход.

4.9. Предозиране

Има ограничен опит от предозиране на mesalazine.

Поради лекарствената форма на таблетките и специфичните фармакокинетични свойства не се очаква отравяне с mesalazine дори в големи дози.

Лечение на предозирането:

Ацидоза или алкалоза: възстановяване на алкално-киселинното равновесие и заместване на електролитите.

Дехидратация: приемане на течности.

Хипогликемия: приемане на глюкоза.

Допълнително промивка на стомаха и венозна инфузия на електролити за усилване на диурезата.

Не са известни антидоти.

4.10. Начин на отпускане

Само по лекарско предписание.



5. Фармакологични данни

5.0. Фармакотерапевтична група

АТС код: A07 EC02 — Аминосалицилова киселина и аналоги

5.1. Фармакодинамични свойства

Mesalazine е активната съставка на сулфасалазина, която се използва от много години при лечението на улцерозен колит и болестта на Крон.

Въз основа на клиничните резултати терапевтичното ниво на mesalazine след перорално, както и след ректално приложение се дължи по-скоро на локалния му ефект върху възпалената чревна тъкан, отколкото на системния му ефект.

Увеличена миграция на левкоцити, аномална продукция на цитокини, увеличена продукция на метаболити на арахидоновата киселина (по-специално на левкотриен B₄) и повишеното образуване на свободни радикали във възпалената чревна тъкан са налице при пациенти с възпалително заболяване на червата. Mesalazine има *in vitro* и *in vivo* фармакологични ефекти като инхибира хемотаксиса на левкоцити, намалява продукцията на цитокини и левкотриени и улавя свободните радикали. Механизмът на действие на mesalazine не е изяснен.

5.2. Фармакокинетични свойства

а) Общи характеристики на активното вещество:

Терапевтичният ефект на mesalazine най-вече зависи от локалния контакт на лекарството с възпалената чревна лигавица.

Pentasa® таблетки с удължено освобождаване се състои от покрити с етилцелулоза микрогранули на mesalazine. След приложение и разтваряне на таблетката, mesalazine се освобождава непрекъснато от отделните микрогранули от дванадесетопръстника до ректума при всякакви състояния на pH на червата. Един час след перорално приложение микрогранулите се намират в дванадесетопръстника, независимо от едновременното приемане на храна. Средното време на преминаване през тънкото черво е около 3 - 4 часа при здрави доброволци.

Биотрансформация: Mesalazine се метаболизира пресистемно в лигавицата на тънките черва и системно в черния дроб до N-ацетил-месалазин (ацетил-месалазин). Част от ацетилирането се осъществява още и чрез действието на бактериите в дебелото черво. Ацетилирането е независимо от ацетилаторния фенотип на пациента.

Смята се, че ацетил-месалазинът е клинично и токсикологично неактивен.

Резорбция: На основата на данните от урината на здрави доброволци 30-50% от приетата доза се резорбира след орално приложение предимно от тънките черва. Mesalazine може да се определи в кръвната плазма 15 минути след приложението му. Максимални плазмени концентрации са наблюдавани 1-4



чата след приемане на дозата.. Плазмената концентрация на mesalazine намалява постепенно и няма да може да бъде определяна 12 часа след приемане на дозата. Кривата на плазмената концентрация за ацетил-месалазина следва същия модел, но концентрацията е обикновено по-висока и елиминирането е по-бавно.

Метаболитното съотношение на ацетил-месалазина спрямо месалазина в плазмата след орално приложение е от порядъка на 3,5 до 1,3 след приемане на дози от 500 mg по 3 и 2 g 3 пъти дневно респ., говорейки за дозо-зависимо и насищащо ацетилиране.

Средните равновесни плазмени концентрации на mesalazine са приблизително 2 $\mu\text{mol/L}$, 8 $\mu\text{mol/L}$ и 12 $\mu\text{mol/L}$ след 1,5 g, 4 g и 6 g дневни дози респ. За ацетил-месалазина съответстващите концентрации са 6 $\mu\text{mol/L}$, 13 $\mu\text{mol/L}$ и 16 $\mu\text{mol/L}$.

Преминаването и освобождаването на mesalazine след орално приложение са независими от едновременния прием на храна, докато системната резорбция ще бъде намалена.

Разпределение: Mesalazine се свързва в около 50% с плазмените протеини, а ацетил-месалазина — в около 80%.

Елиминиране: Елиминационен полуживот на месалазина е около 40 мин, а за ацетил-месалазина — около 70 мин. Поради продължителното освобождаване на mesalazine в целия стомашно-чревен тракт елиминационният полуживот не може да бъде определен след орално приложение. Изследванията показват, че състояние на равновесие се достига след период на лечение от 5 дни след орално приложение.

Двете вещества месалазин и ацетил-месалазин се излъзват с урината и фекалиите.

Уринната екскреция се състои главно от ацетил-месалазин.

б) Характеристики при пациенти

Достигането на mesalazine в лигавицата на тънките черва след орално приложение се повлиява слабо от патофизиологични промени като диария и повишена чревна киселинност, наблюдавани по време на острото възпалително заболяване на червата. Намаление на системната резорбция до 20-25% от дневната доза е наблюдавано при пациенти с ускорен пасаж в тънките черва. Също така е наблюдавано и съответно увеличение на фекалната екскреция.

При пациенти с увредена чернодробна и бъбречна функция намалението на степента на елиминиране и повишената системна концентрация на mesalazine може да доведе до повишен риск от увреждане на бъбреците.

5.3. Предклинични данни за безопасност

При всички експериментални животни бе наблюдавана дефинитивна нефротоксичност. Обикновено токсичните дози надвишават терапевтичните дози при хора 5 — 10 пъти.

При експериментални животни не е наблюдавана значима токсичност, свързана с гастроинтестиналния тракт, черния дроб или кръвотворната система.

При *in vitro* тестове и *in vivo* проучвания не са получени доказателства за мутагенен ефект. Проучвания на плъхове не показваха данни за повишение на случаите с тумори, свързани с активното вещество.

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества:

Magnesium stearate, talc, ethylcellulose, povidone , microcrystalline cellulose.

6.2. Несъвместимости

Не са известни.

6.3. Срок на годност

3 години.

6.4. Специални предпазни мерки за съхранение

Няма

6.5. Опаковка

Блистери (двойно алуминиево фолио).

100 таблетки в опаковка

6.6. Указания за употреба/манипулиране

Няма специални изисквания.

7. Притежател на разрешението за употреба

Борола ЕООД, ул. Цар Самуил 125, София 1202, България

8. Регистрационен номер

9900187

9. Дата на първо разрешение за употреба

01.07.1999

10. Дата на редакция на текста

BG 11/2006

