

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

GASTROCYNESINE
ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки

Активни вещества:

За 1 таблетка от 300 mg:

ABIES NIGRA.....	4 CH
CARBO VEGETABILIS.....	4 CH
NUX VOMICA	4 CH
ROBINIA PSEUDO ACACIA	4 CH
в равни части	



Помощни вещества:

Захароза, лактоза, магнезиев стеарат

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, потърсете повече информация от вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако желаете допълнителна информация или съвет, обърнете се към вашия фармацевт.
- Ако след употреба на продукта оплакванията продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка или отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, и за какво се използва
2. Каква информация трябва да имате преди да приемете ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки
3. Как да приемате ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки
4. Възможните нежелани реакции
5. Съхранение на ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Таблетка от 300 mg.

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за симптоматично лечение на храносмилателни оплаквания: стомашни болки, тежест, парене, неразположение след хранене, гастро-езофагиален рефлукс.



2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки

Не приемайте ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки.

Обърнете специално внимание при лечението с ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Поради наличието на лактоза този медикамент е противопоказан при вродена галактоземия, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или лактазна недостатъчност (рядко срещани метаболитни заболявания).

Поради наличието на захароза този медикамент е противопоказан при непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно-изомалтазен дефицит (рядко срещани метаболитни заболявания).

Прием на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или насърко сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки

Перорално приложение.

Възрастни и деца :

по 1–2 таблетки четвърт час преди хранене, да се държат в устата до пълното им разтваряне. В случай на нужда, приемът се повтаря след нахранване.

Деца под 1 година: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Ако сте приели повече от необходимата доза ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛANI REAKCII

Както всички лекарства, ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите неописани в тази листовка нежелани реакции или някой от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.



5. СЪХРАНЕНИЕ НА ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки

Съхранявайте на място далеч от достъпа и погледа на деца.

Не използвайте ГАСТРОЦИНЕЗИН, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Производител

Laboratoires BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Дата на последно одобрение на листовката: Юни 2006

Reg. №9600047

