

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

COCCULINE
КОКУЛИН, таблетки

Активни вещества:

За 1 таблетка от 150 mg:

Coccus indicus	4 CH	0,375 mg
Nux vomica	4 CH	0,375 mg
Tabacum	4 CH	0,375 mg
Petroleum	4 CH	0,375 mg

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 27.11.2006

Помощи вещества:

Захароза, лактоза, магнезиев стеарат

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Ако имате допълнителни въпроси или съмнения, потърсете повече информация от вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако желаете допълнителна информация или съвет, обърнете се към вашия фармацевт.
- Ако след употреба на продукта симптомите продължават или състоянието се влоши, обърнете се за съвет към лекар.
- Ако забележите нежелани лекарствени реакции, неописани в тази листовка, и отбелязаните нежелани лекарствени реакции станат сериозни, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява КОКУЛИН, таблетки, и за какво се използва
2. Каква информация трябва да имате преди да приемете КОКУЛИН, таблетки
3. Как да приемате КОКУЛИН, таблетки
4. Възможните нежелани реакции
5. Съхранение на КОКУЛИН, таблетки
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОКУЛИН, таблетки, И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Таблетка от 150 mg.

Хомеопатичен лекарствен продукт, традиционно използван за профилактика и лечение на прилошаване при пътуване: морска болест, въздушна болест, прилошаване в кола.

2. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ИМАТЕ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОКУЛИН, таблетки



Не приемайте никога КОКУЛИН, таблетки:

Ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на КОКУЛИН, таблетки.

Обърнете специално внимание при лечението с КОКУЛИН, таблетки:

Поради наличието на лактоза този медикамент е противопоказан при вродена галактоземия, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или лактазна недостатъчност.

Поради наличието на захароза този медикамент е противопоказан при непоносимост към фруктоза, глюкозен/галактозен синдром на малабсорбция или захаразно-изомалтазен дефицит (рядко срещани метаболитни болести).

Прием на други лекарства

Моля, информирайте вашия лекар или фармацевт, ако приемате или накърно сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускати без рецепт.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КОКУЛИН, таблетки

Перорално приложение.

Възрастни и деца:

- Профилактично: по 2 таблетки 3 пъти дневно в деня преди пътуването и в деня на пътуването.
- С лечебна цел: по 2 таблетки на всеки час при появяване на симптомите. Приемът се повтаря при нужда.

Таблетките се държат в устата до бавното им разтваряне.

Деца под 6 години: таблетките се стриват и разтварят във вода преди прием.

Ако сте приемли повече от необходимата доза КОКУЛИН, таблетки:

Посъветвайте се с вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да приемете КОКУЛИН, таблетки:

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля, попитайте вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, КОКУЛИН, таблетки, може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако забележите неописани в тази листовка нежелани реакции и някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, моля, уведомете вашия лекар или фармацевт.



5. СЪХРАНЕНИЕ НА КОКУЛИН, таблетки

Съхранявайте на място далеч от досягна до погледа на деца.

Не използвайте КОКУЛИН, таблетки, след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Притежател на разрешението за употреба

Laboratoires BOIRON
20, rue de la Libération
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
France

Производител

Laboratoires BOIRON
2, avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
France

Дата на последно одобрение на листовката: Юни 2006 г.

Reg. №9600051

