

## ЛИСТОВКА С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате Minirin.**

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите

### **В тази листовка:**

1. Какво представлява Minirin и за какво се използва
2. Преди да приемете Minirin
3. Как да използвате Minirin
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Minirin

**Minirin 0,1 mg/Минирин 0,1 mg**  
**Minirin 0,2 mg/Минирин 0,2 mg**  
таблетки

- Активно вещество: десмопресин.
- Помощни вещества: лактоза монохидрат, картофено нишесте, повидон и магнезиев стеарат.

### Притежател на разрешението за употреба

Борола ЕООД, ул Цар Самуил 125, 1202 София, България

### Производител:

FERRING AB, Soldatorpsvagen 5, Box 30047 S-200 61 Limhamn Sweden  
FERRING GmbH, Wittland 11, 24109 Kiel, Germany

## **1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА MINIRIN И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Активното вещество на Minirin действа както естествения хормон вазопресин и регулира способността на бъбреците да концентрират урината.

Minirin се използва за лечение на:

- Безвкусен диабет от централен произход (нарушение на хипофизната жлеза, което води до изразена жажда и продължителна продукция на голям обем разредена урина).
- Нощно напикаване при деца над 5 годишна възраст с нормална способност за концентриране на урината.
- Нощна полиурия при възрастни.

## **2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ MINIRIN**

Когато го използвате при първично нощно напикаване и нощна полиурия приемът на течности с цел премахване на жандата трябва да се ограничи в периода 1 час преди до 8 часа след приема на Minirin.



Minirin трябва да се използва внимателно, когато е нарушен балансът на течности.

**Да не се използва Minirin:**

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към активното вещество или към някоя от другите съставки на Minirin.
- ако страдате от полидипсия (ненормално голям прием на течности), слабо сърце и други заболявания, нуждаещи се от лечение с диуретици, увредена бъбречна функция или ниски серумни нива на натрий.

**Специално внимание е необходимо с Minirin:**

- ако вземате Minirin заедно с някакви други лекарства. Моля вижте раздела "Използване с други лекарства".
- ако Вашият баланс на течности и/или електролити е нарушен в резултат на остро заболяване.
- ако сте над 65 години, имате ниски серумни нива на натрий или висока 24-часова продукция на урина.

**Използване на Minirin с храна и течности:**

Приемът на храна може да намали ефекта на Minirin.

**Бременност**

Опитът от използването му по време на бременност е ограничен.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете някакво лекарство.

**Кърмене**

Minirin преминава в майчиното мляко на кърмачката, но е малко вероятен някакъв риск за детето.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземете някакво лекарство.

**Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини:**

Minirin не повлиява способността за шофиране на моторни превозни средства и работа с машини.

**Важна информация относно едно от помощните вещества на Minirin**

Minirin таблетки съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари потърсете Вашия лекар преди да вземете този лекарствен продукт.

**Използване с други лекарства:**

Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако вземате или сте вземали напоследък някакви други лекарства, дори такива без лекарско предписание.

Едновременно лечение с някои лекарства срещу депресия (трициклични антидепресанти, селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина), хлорпромазин (срещу психоза), карбамазепин (срещу епилепсия), лоперамид (срещу диария), лекарства които забавят чревния пасаж, някои които премахват болката и възпалението (нестероидни противовъзпалителни средства) могат да усилят ефекта на Minirin с повишен риск от ненормално натрупване на течност в организма.

Едновременно лечение с диметикон (срещу метеоризъм) може да доведе до намалена резорбция на Minirin.

**3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ MINIRIN**



Ако почувствате, че ефектът на Minirin е твърде силен или твърде слаб, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Дозировката е индивидуална и лекарят ще Ви предпише най-подходяща за Вас доза.

Minirin трябва да се взема винаги по едно и също време по отношение приема на храна.

~~Безвкусен диабет: Обичайната доза за възрастни и деца е 1-2 таблетки (таблетки по 0,1 mg) три пъти дневно.~~

*Нощно напикаване:* Обичайната доза е 1-2 таблетки (таблетки по 0,2 mg) вечер. Приемът на течности трябва да се ограничи.

*Нощно напикаване при възрастни:* Обичайната доза е 1 таблетка (таблетки по 0,1 mg) вечер. Приемът на течности трябва да се ограничи.

**Ако приемете случайно повече Minirin, отколкото трябва:**  
Веднага потърсете Вашия лекар, болница или център по токсикология

**Ако забравите да вземете Minirin:**  
Не вземате двойна доза за да компенсирате пропуската.

#### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарства Minirin може да има странични ефекти.

Ако приемът на течности не е ограничен съобразно указанията по-горе, може да се натрупа ненормално количество течност в организма, което да доведе до главоболие, гадене/повръщане, увеличение на телесното тегло и при по-сериозни случаи до гърчове.

При лечение на безвкусен диабет от централен произход и нощно напикаване при деца:

*Чести:*

Главоболие, гадене, болка в стомаха.

*Много редки:*

Наблюдавани са алергични кожни реакции и по-сериозни общи алергични реакции. Ако имате тези реакции трябва да потърсите Вашия лекар.

Хипонатриемия (ниски серумни нива на натрий)

Реакции като раздразнителност, агресивност и кошмари.

При лечение на неотложно уриниране при възрастни:

*Чести:*

Хипонатриемия (ниски серумни нива на натрий), главоболие, замаяност, периферен оток, честа нужда от уриниране, болка в стомаха, гадене, сухота в устата и увеличение на телесното тегло.

Ако установите нежелани реакции, които не са посочени в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 6. СЪХРАНЕНИЕ НА MINIRIN

Да се пази на недостъпно за деца място.

Да се съхранява при температура под 25 °C, в оригиналната опаковка.



Чувствителен на влага. Изсушаващата капсула не трябва да се маха от капачката.

Да не се използва това лекарство след изтичане срока на годност означен върху етикета.

Тази листовка бе последно редактирана  
10/2006

