



Листовка за пациента
Фенистил гел 0,1% 30 g
Fenistil® 0.1 % Gel

Моля прочетете внимателно тази листовка преди да започнете да използвате Фенистил гел. Запазете я, може да ви се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни, попитайте вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка :

1. Какво е Фенистил гел?
2. За какво се използва Фенистил гел?
3. Проверете преди да използвате Фенистил гел
4. Как да използвате Фенистил гел?
5. Възможни нежелани реакции
6. Съхранение на Фенистил гел

1. Какво е Фенистил гел?

Фенистил гел съдържа една активна съставка, която принадлежи към групата лекарства наречени антихистамини, които се използват за облекчаване на кожни алергии и различни видове сърбеж. Фенистил гел е охлаждащ, безцветен, не мазен гел без мирис. Той не зацапва дрехите.

Фенистил гел съдържа като активна съставка 0.1% dimethindene maleate. Останалите съставки са: бензалкониев хлорид, натриев едетат, карбомер, пропилен гликол, натриев хидроксид, пречистена вода.

Фенистил гел е наличен в опаковки по 30 g.

Притежател на разрешението за употреба е
Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, 81379 München, Germany

Производител е Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz,
1260 Nyon, Switzerland.

2. За какво се използва Фенистил гел?

Фенистил гел облекчава сърбежа като блокира действието на хистамина – вещество, което се освобождава в организма по време на алергична реакция. Приложен върху кожата, той облекчава сърбежа и дразненето. Фенистил гел има и анестетичен ефект.

Фенистил гел прониква добре през кожата. Сърбежът и дразненето се облекчават бързо, в рамките на няколко минути.

Фенистил гел се използва за облекчаване на сърбеж свързан с кожни обриви, уртикария, ухапвания от насекоми, слънчеви и повърхностни изгаряния.



3. Проверете преди да използвате Фенистил гел:

Не използвайте Фенистил гел ако:

- Сте алергични към някоя от съставките.

Информирайте вашия лекар, ако горното е приложимо, тъй като при тези обстоятелства Фенистил не е подходящ за вас.

Обърнете специално внимание при употреба на Фенистил гел:

- Избягвайте продължителното излагане на слънце на големи повърхности, върху които е приложен гела.
- Информирайте вашия лекар, ако се касае за много силен сърбеж или обширно засягане на кожата.

Ако сте бременна или кърмите :

По време на бременност и кърмене не използвайте Фенистил гел върху големи кожни повърхности, особено ако са наранени или възпалени. Не слагайте гел върху зърната, ако кърмите.

Фенистил гел и децата :

При кърмачета и малки деца не използвайте върху големи кожни повърхности, особено ако са наранени или възпалени.

4. Как да използвате Фенистил гел?

Нанасяйте 2 до 4 пъти дневно върху засегнатите места.

Консултирайте се с Вашия лекар, ако симптомите не се подобрят в рамките на една седмица.

Ако случайно погълнете Фенистил гел, информирайте незабавно вашия лекар.

5. Какви нежелани реакции може да има Фенистил гел?

Всички лекарства могат да предизвикат проблеми у някои хора.

Фенистил гел може да предизвика усещане на лека сухота или парене на кожата.

В много редки случаи може да възникнат кожни обриви или сърбеж: ако почувствате тези симптоми, спрете употребата на Фенистил гел и информирайте вашия лекар или фармацевта.

Информирайте вашия лекар, ако забележите някой друг ефект, който може да се дължи на употребата на Фенистил гел.



6. Съхранение на Фенистил гел:

- Да се съхранява под 25°C.
- Не го използвайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.
- **Пазете Фенистил гел далеч от достъпа на деца.**

Дата на актуализация на текста

Ноември 2006

