

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

TANAKAN 40 mg, coated tablets
ТАНАКАН 40 mg обвити таблетки

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 30-10-06

1. ОПИСАНИЕ НА ЛЕКАРСТВОТО

Търговско име

TANAKAN 40 mg обвити таблетки

Качествен състав:

Активно вещество:

Ginkgo bilobaе folium extractum siccum containing 24% flavone glycoside and 6% of ginkgolides-bilobalide (EGb 761) 40.00 mg за една таблетка.

Помощи вещества:

Лактозаmonoхидрат, микрокристална целулоза, царевично нишесте, безводен колоидален силициев диоксид, талк, магнезиев стеарат, МакроГол 400, МакроГол 6000, метилцелулоза, титаниев диоксид. Оцветител - червен железен оксид.

Лекарствена Форма

Обвити таблетки

Опаковка от 30 таблетки

Фармакологичен клас

ПЕРИФЕРЕН ВАЗОДИЛАТАТОР
(Сърдечно-съдова система)

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

BEAUFOUR IPSEN INTERNATIONAL
37, rue SPONTINI
75116 PARIS CEDEX
ФРАНЦИЯ

Производител:

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
28100 DREUX
ФРАНЦИЯ



2. В КОИ СЛУЧАИ СЕ ИЗПОЛЗВА ТОВА ЛЕКАРСТВО (ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ)

Това лекарство се предписва за:::

- Симптоматично лечение на болестно нарушение в концентрацията и паметта при възрастни пациенти с изключение на такива с болест на Алцхаймер и други деменции.
- Симптоматично лечение на артрити на долните крайници(болест на артериите на краката предизвикващи болезнени крампи по време на ходене)
- При симптоми свързни с нарушения на зрението и слухово-вестибуларни смущения с предполагаем исхемичен произход.
- При синдрома на Рейно.

ВНИМАНИЕ!

В кои случаи това лекарство не трябва да се използва

Това лекарство НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА при:

Предшестваща свръхчувствителност към една от съставките на таблетката.

**АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ НЕПРЕМЕННО ИСКАЙТЕ СЪВЕТ ОТ ВАШИЯ
ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ!**

Специални предупреждения

Поради наличието на лактоза , това лекарство не трябва да бъде използвано при наличие на галактоземия, на синдром на лоша абсорбция на глукоза и галактоза или при дефицит на лактаза (рядко срещани болести на обмяната на веществата).

Предпазни мерки при употреба

**АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ НЕПРЕМЕННО ПОПИТАЙТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР
ИЛИ ФАРМАЦЕВТ ЗА СЪВЕТ!**

Лекарствени взаимодействия и други взаимодействия

**ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА
ТРЯБВА РЕДОВНО ДА ИНФОРМИРАТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ИЛИ
ФАРМАЦЕВТ ЗА ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА КОИТО ПРИЕМАТЕ.**



Бременност и кърмене

АКО СТЕ БРЕМЕННА ИЛИ КЪРМИТЕ ВИНАГИ СЕ СЪВЕТВАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ПРЕДИ ДА ВЗЕМЕТЕ КАКВОТО И ДА Е ЛЕКАРСТВО.

Помощни вещества за които тряба да знаете в предвид безопасната употреба при някои пациенти:

Лактоза моногидрат

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО?

Доза

3 таблетки дневно.

ТОВА ЛЕКАРСТВО ВИ Е ПРЕДПИСАНО И ОТПУСНАТО ЛИЧНО В ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕН СЛУЧАЙ.

- ТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИСПОСОБЕНО ЗА ДРУГ СЛУЧАЙ.
- НЕ ГО ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ НА ДРУГ!

Начин и път на приложение

През устата.

Таблетките се приемат с половин чаша вода по време на хранене

Продължителност на лечението

Допитайте се до мнението на вашия лекар.

4. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

РЯДКО ПРИ НЯКОИ ПАЦИЕНТИ МОГАТ ДА БЪДАТ НАБЛЮДАВАНИ: храносмилателни смущения, свръхчувствителност на кожата и главоболие. УВЕДОМЕТЕ ВАШИЯ ЛЕКАР ЗА ВСЯКА НЕЖЕЛАНА РЕАКЦИЯ НЕ ПОСОЧЕНА В ТАЗИ ЛИСТОВКА!

5. СЪХРАНЕНИЕ

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЛЕКАРСТВОТО СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ ОТБЕЛЯЗАН НА ВЪНШНАТА ОПАКОВКА!

ВНИМАНИЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВИДИМИ ПРИЗНАЦИ НА НАРУШАВАНЕ НА ОПАКОВКАТА

6. ДАТА НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА

Април 2006

