


LOZAP® Н
ЛОЗАП Н



Прочетете тази листовка внимателно преди да започнете да използвате този лекарствен продукт.

- Запазете тази листовка. Тя може да Ви е необходима отново.
- Ако Ви е необходима допълнителна информация или съвет, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт
- Това лекарство е предписано специално на Вас. Не го давайте на други. То може да им навреди, въпреки че симптомите им са същите като Вашите.
- Ако някой от страничните ефекти се задълбочи или ако забележите страничен ефект неописан в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво е Лозап Н и за какво се използва
2. Преди да използвате Лозап Н
3. Как да използвате Лозап Н
4. Възможни странични ефекти
5. Как се съхранява Лозап Н
6. Допълнителна информация

1. Какво е Лозап Н и за какво се използва

Фармакотерапевтична група: ангиотензин II антагонист и диуретик

Лекуващият лекар Ви е предписал Лозап Н защото страдате от заболяване, известно като хипертония, т.е. повишено кръвно налягане.

Лозап Н е комбинация от ангиотензин II рецепторен антагонист (лозартан) и диуретик, тоест средство, което увеличава количеството на отделяната урина (хидрохлортиазид). Лозартан и хидрохлортиазид в комбинация предизвикват понижаване на високото кръвно налягане. Фиксираната комбинация не е подходяща за начало на лечението.

2. Преди да използвате Лозап Н

Не използвайте Лозап Н ако

- сте алергични към някое от лекарствените или помощните вещества (виж Състав);
- сте алергични към лекарствени продукти, производни на сулфонамиди (консултирайте се с Вашият лекар, ако не сте сигурни, кои лекарствени продукти са производни на сулфонамиди).



Лозап Н не трябва да се използва от пациенти с анурия (липса на секреция на урина от бъбреците), при бременност и кърмене.

Ако не сте сигурни дали трябва да започнете да използвате Лозап Н консултирайте се с Вашия лекар.

Използвайте Лозап Н с повишено внимание

Информирайте Вашия лекар за всички Ваши заболявания в миналото и тези от които страдате в момента, включително и всички алергични реакции. Уведомете го, ако наскоро сте боледували с обилно повръщане и диария. Особено важно е да съобщите за доказани заболявания на черния дроб и/или бъбреците, подагра, диабет, лупус еритематозус (възпалително заболяване на ставите, кожата и други тъкани с неизвестна етиология) или ако Вие сте лекувани с други диуретици (средства, които увеличават количеството на отделяната урина). В тези случаи може да е необходимо да се адаптира дозировката.

Ако Ви предстои операция или прием на анестетици (включително и обезболяване, прилагано от зъболекар) уведомете Вашия лекар или зъболекар, че употребявате Лозап Н, тъй като анестезията комбинирана с лечението с Лозап Н може да предизвика рязко понижаване на кръвното налягане.

Необходимо е специално внимание, когато Лозап Н се предписва на пациенти с намален бъбречен кръвоток.

Употреба с други лекарствени продукти

Моля, информирайте Вашия лекар за всички лекарствени продукти, които употребявате в момента или възнамеряване да употребявате, включително и такива, които се продават свободно. Особено важно е Вашия лекар да знае дали Вие приемате калиеви добавки, калий съхраняващи диуретици или съдържащи калий заместители на сол, лекарствени продукти понижавачи кръвното налягане, други диуретици, смоли понижавачи високите нива на холестерол, лекарствени продукти за лечение на диабет, включително инсулин, кортикостероиди, някои болкоуспокояващи и противовъзпалителни средства, използвани при ставни възпаления (напр. индометацин), литий (използван за лечение на депресии). Лозап Н може да отслаби ефекта на така наречените (pressor) пресор амини (лекарствени продукти, използвани при колапс на кръвообращението и тежки алергични реакции), такива като адреналин и да усилва ефекта на мускулните релаксанти. Седативи и транквиланти (лекарствени продукти, прилагани за успокояване на пациентите), алкохол и аналгетици (продукти, които облекчават болка) могат да усилят влиянието на Лозап Н върху високото кръвно налягане. По тази причина трябва да информирате Вашия лекар, ако в момента използвате някой от тези продукти.

Употреба на Лозап Н с храна и напитки

Лозап Н може да се взема преди и след хранене.



Употреба при бременност и кърмене

Бременни и жени, които кърмят не могат да използват Лозап Н. Ако забременеете докато приемате Лозап Н, прекратете употребата му и информирайте Вашия лекар незабавно.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да вземате каквито и да било лекарствени продукти.

Шофиране и работа с машини

Тези дейности трябва да се извършват само с изричното съгласие на лекаря.

Важна информация за някои от съставките на Лозап Н

Не са необходими специални предпазни мерки по отношение на неактивните съставки на този продукт.

3. Как да използвате Лозап Н

Винаги вземайте Лозап Н точно следвайки предписанието на Вашия лекар. Ако не сте сигурни, уточнете с Вашия лекар или фармацевт. Обичайната доза Лозап Н е 1 таблетка дневно, за да се регулира Вашето кръвно налягане за 24 часа.

За Ваше удобство и за да не пропускате прием, опитайте да вземате Лозап Н по едно и също време на деня.

Употреба при деца

Няма опит с използването на Лозап Н при деца. Поради това Лозап Н не трябва да се прилага при деца.

Употреба при пациенти в напреднала възраст

Лозап Н обикновено има добър терепевтичен ефект и се понася добре от мнозинството от пациентите, както по-млади, така и в напреднала възраст. Повечето пациенти в напреднала възраст се нуждаят от същата доза както и по-младите пациенти.

Какво се прави в случай на предозиране?

Най-вероятните симптоми при предозиране на Лозап Н са: симптоматична хипотония, т.е. ниско кръвно налягане, което най-често се проявява като замаяност; ускорен или забавен пулс; прекомерно уриниране, водещо до дехидратация.

В случай, че сте взели повече таблетки потърсете Вашия лекар незабавно, за да Ви бъде оказана бързо медицинска помощ.

Ако пропуснете една доза Лозап Н?

Опитайте се да вземате Лозап Н както Ви е предписан. Ако пропуснете доза, не вземайте двойна доза. Продължете по нормалната схема, която Ви е предписана.

Ако спрете да използвате Лозап Н

Важно е да не прекъсвате лечението, което Ви е предписал лекарят, за да контролирате непрекъснато кръвното си налягане.

Ако имате още въпроси за употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



4. Възможни странични ефекти

Както всеки лекарствен продукт, Лозап Н може да предизвика странични ефекти. Нежеланите лекарствени реакции могат да включват замаяност, обрив, главоболие, коремна болка, гадене, загуба на апетит, диария или запек, болка в гърба, кашлица. Ако при Вас се развие алергична реакция, която включва оток на лицето, устните, ларинкса и/или езика, който може да предизвика затруднения при дишане и гълтане, прекратете употребата на Лозап Н и незабавно се консултирайте с лекар.

Ако някой от страничните ефекти се задълбочи или ако забележите страничен ефект, неотбелязан в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как се съхранява Лозап Н?

Съхранявайте на място недостъпно за деца!

Не използвайте лекарственият продукт след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката след надписа „Годен до:” Дата на изтичане на срока на годност се отнася за последния ден на посочения месец.

Лекарственият продукт трябва да се съхранява при температура под 30°C.

Лекарствата не трябва да бъдат изхвърляни в отпадъчните води и с битовите отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да се освободите от лекарствените продукти, които вече не са Ви нужни. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Лозап Н

Лекарствените вещества са лозартан 50 mg и хидрохлоротиазид 12.5 mg в една таблетка.

Помощните вещества са микрокристална целулоза, манитол, кроскармелоза натриева сол, повидон, магнезиев стеарат, хипромелоза 2910/5, макрогол 6000, талк, симетикон емулсия, Опаспрей М-1-22801 жълт.

Как изглежда Лозап Н и какво съдържа опаковката

Лозап Н са жълти, продълговати, двойноизпъкнали обвити таблетки с делителна черта от двете страни,

Лозап Н се произвежда в опаковки, съдържащи 10, 30 или 90 обвити таблетки.

Възможно е не всички видове опаковки да са на пазара.

Производител и притежател на разрешението за употреба

ЗЕНТИВА АД

Прага, Чешка Република

Дата на последна редакция на текста: 060215



Адрес за контакти:

ТП Зентива Интернешънъл АД

Бул. Н. Вапцаров № 25

1407 гр. София

Тел.: 02/9624140; 02/9624191

