

RGD: 66340/EN/2
19.01.2007

Информация за пациента



КАВИНТОН ФОРТЕ (CAVINTON FORTE)
таблетки

Моля, прочетете внимателно листовката, преди да започнете да приемате лекарството.

- Моля, пазете листовката. Възможно е да поискате да я прочетете отново.
- Ако искате да знаете повече за Вашето лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Лекарят е предписал лекарството лично на Вас и не трябва да го давате на друг. Възможно е да му навреди, дори симптомите му да са същите като Вашите.

В тази листовка:

1. Какво представлява Кавинтон Форте и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да започнете приема на Кавинтон Форте
3. Как да се приема Кавинтон Форте
4. Възможни нежелани лекарствени реакции
5. Как да съхранявате Кавинтон Форте

КАВИНТОН ФОРТЕ (CAVINTON FORTE)
таблетки

Активната съставка е
10 mg vinpocetine във всяка таблетка.

Помощните вещества са колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, талк, царевично нишесте, лактоза монохидрат.

Външен вид:

Кавинтон Форте таблетки: бели или почти бели, дисковидни, плоски, с отрязани ръбове с надпис "10 mg" от едната страна и делителна черта от другата страна.

Опаковка:

Кавинтон Форте таблетки: 30 или 90 таблетки.

Таблетките са опаковани в PVC//алуминиеви блистери и в картонена сгъваема кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:
Gedeon Richter Ltd.



1103 Budapest X.,
Gyömrői út 19-21.
Hungary

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАВИНТОН ФОРТЕ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ?

Кавинтон Форте е лекарство за лечение на определени заболявания свързани с нарушения на циркулацията на кръвта в мозъка. Кавинтон Форте също се прилага за намаляване на психичните и неврологични симптоми при мозъчни съдови нарушения, за лечение на определени офталмологични и отологични заболявания, които настъпват на базата на съдови нарушения или за намаляване на техните симптоми.

2. ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПРИЕМА НА КАВИНТОН ФОРТЕ

Не приемайте Кавинтон Форте:

- ако сте свръхчувствителни (алергични) към винпоцетин или към някоя от останалите съставки на лекарството;
- по време на бременност или кърмене;
- в детска възраст.

Кавинтон Форте трябва да бъде прилаган на базата на индивидуална медицинска преценка:

- при някои сърдечни заболявания.

Бременност, кърмене

Това лекарство е противопоказано по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини:

Няма налични данни за какъвто и да било ефект на винпоцетин върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на лекарството:

При пациенти с лактозна (млечна захар) непоносимост трябва да се има предвид, че всяка Кавинтон Форте таблетка (10 mg) съдържа 83 mg лактоза.

Прием на други лекарства:

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или сте приемали наскоро някакви други лекарства, дори такива, които са без лекарско предписание.

Трябва да информирате Вашия лекар, ако приемате лекарство съдържащо алфа метил допа (лекарство за понижаване на високо кръвно налягане), лекарства влияещи на централната нервна система, антикоагуланти (лекарства предпазващи от образуване на кръвни тромби) или антиаритмик (лекарство за нарушения на сърдечния ритъм).



3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КАВИНТОН ФОРТЕ

Винаги приемайте Кавинтон Форте точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Ако лекарят не е предписал друго, обичайната доза е 3 пъти по 1 таблетка Кавинтон Форте. Не се налага промяна на дозата при пациенти с бъбречни и чернодробни заболявания.

Таблетките трябва да се премат след хранене.

Ако смятате, че ефектът на лекарството е прекалено силен или прекалено слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Кавинтон Форте:

Обърнете се към Вашия лекар или посетете спешното отделение на най-близката болница.

Ако сте пропуснали да приемете Кавинтон Форте:

Не приемайте двойна доза, защото не може да заместите пропуснатата доза, но може да настъпи предозиране. Приемете следващата доза в обичайното време.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Кавинтон Форте може да има нежелани лекарствени реакции.

Понякога (2,6%) могат да настъпят зачервяване, алергични кожни реакции, аритмия (бърз или неправилен сърдечен ритъм), понижаване на артериалното кръвно налягане, нарушения на съня, замаяност, главоболие, слабост, гадене, парене зад гръдната кост, сухота в устата. Ако се изявят подобни симптоми, консултирайте се с Вашия лекар.

Ако почувствате някакви нежелани ефекти, които не са отбелязани в тази листовка, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КАВИНТОН ФОРТЕ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Съхранявайте блистера в картонената опаковка, за да бъде предпазен от светлина.

Не използвайте лекарството след изтичане на срока на годност, отбелязан на опаковката.

Дата на последна редакция:

