

## Листовка за пациента

**FLEXODON sachet**  
**ФЛЕКСОДОН саше**

ИАЛ  
ОДОБРЕНО  
ДАТА: 21.11.06г.

**Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да взимате лекарството, защото тя съдържа важна информация за неговата правилна и безопасна употреба.**

- Запазете листовката. Може отново да я прочетете.
- Ако имате допълнителни въпроси, моля, обърнете се към своя лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано за Вас и не бива да се дава на друг. Може да е вредно, дори симптомите да са същите като Вашите.

### 1. Наименование и лекарствена форма

Флексодон саше

Прах за перорален разтвор

### 2. Какво съдържа?

**Лекарствено вещество:** Всяко саше съдържа glucosamine sulfate sodium chloride complex, равняващ се на 1200 mg glucosamine или 1500 mg glucosamine sulfate.

**Помощни вещества:** сорбитол, аспартам, безводна лимонена киселина, макрогол 6000

Флексодон саше може да се намери в пет различни опаковки: по 6; 10; 20, 30, и 60 сашета.

### 3. Как действа Флексодон саше?

Глюкозамин е ендегенна субстанция, синтезирана от глюкоза (вид захар). Глюкозамин е необходим за тялото, за изграждане на по-големи молекули, някои, от които се намират, например в хрущяла и синовиалната течност (течност, обграждаща ставите).

### 4. Притежател на разрешението за употреба:

ЦСЦ Фармасютикъл Лтд - България ЕООД, ул. Асен Йорданов 10, София 1592

### 5. Производител

LABIANA Pharmaceuticals S.L., Poligono Industrial Can Salvatella, Gorgs I Llado, 188, 08210 Barbera del Valles (Barcelona), Spain

### 6. За какво е предназначен Флексодон саше?

Флексодон саше се препоръчва за облекчаване симптомите при остеоартрити, например болка и функционални ограничения.

### 7. Кога не бива да се приема Флексодон саше?

Не приемайте Флексодон саше, ако:

- Сте с изразена свръхчувствителност към глюкозамин или към което и да било от помощните вещества;
- Ви е поставена диагноза фенилкетонурия, защото Флексодон саше съдържа аспартам;
- Ви е поставена диагноза за вродена непоносимост към фруктозата, много рядка метаболитна болест, защото Флексодон саше съдържа сорбитол.



### **Предупреждения и предпазни мерки за употреба на Флексодон саше:**

- Флексодон саше не се препоръчва за приложение при деца и младежи до 18 години;
- Пациенти със захарен диабет трябва да се консултират със своя лекар преди да се лекуват с Флексодон саше. Преди започване на терапията може да се наложи повторно изследване нивото на глюкозата в кръвта;
- Едновременното лечение с тетрациклин (вид антибиотик) може да доведе до повишени кръвни концентрации на тетрациклин;
- Действието на пеницилин и хлорамфеникол (видове антибиотици) може да се намали.

### **Бременност и кърмене**

Проучванията не са дали доказателство за нежелани ефекти върху плода и при кърмене. Въпреки това, употребата на Флексодон саше по време на бременност и кърмене следва да бъде ограничена в случаите на установена необходимост и да се прилага под медицински контрол.

### **Шофиране и работа с машини**

Флексодон саше няма негативно влияние върху способността за шофиране и работата с машини.

### **8. Как трябва да са прилага Флексодон саше?**

Нормалната доза е едно саше дневно. Разтворете съдържанието му в чаша вода (около 250 ml) и го изпийте по време на хранене.

Продължителността на лечението е 6 седмици или по-дълго, ако е необходимо и ако лекарят не е препоръчал друга схема на лечение.

### **Какво ще стане, ако вземете по-голяма доза?**

Ако вземете по-висока от предписаната доза, непременно трябва да се консултирате със своя лекар или фармацевт.

### **Какво трябва да правите, ако забравите да вземете лекарството?**

Ако забравите да вземете едно саше, продължете със следващата доза, както обикновено.

### **9. Какви нежелани лекарствени реакции има Флексодон саше?**

Има данни за следните нежелани лекарствени реакции:

*Често (при >1/100, но <1/10 пациенти):* гадене, запек, киселини, диария, лошо храносмилане, болка в епигастриума (подлъжичната област);

*Нечесто (при >1/1 000, но <1/100 пациенти):* сърбеж, зачервяване; бронхиална астма

*Рядко (при >1/10 000, но <1/1 000 пациенти):* главоболие, световъртеж, умора.

### **10. Как трябва да се съхранява Флексодон саше?**

- Не използвайте лекарството след изтичане срока на годност, обозначен на опаковката.
- Да се съхранява при температура под 25° C, на защитено от влага място.
- Съхранявайте Флексодон саше, както и всички други лекарствени продукти на място, недостъпно за деца.

### **11. Дата на последна редакция на листовката**

Юни 2006 г.

