

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Уважаеми пациенти, моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси, обърнете се към лекуващия лекар.

Enterokind - Ентерокинд



### Състав:

100 ml разтвор съдържат:

#### Лекарствени вещества:

Chamomilla dil. D6 10 g, Cina dil. D6 10 g, Colocynthis dil. D6 10 g,

Lac defloratum dil. D6 10 g, Magnesium chloratum dil. D6 10 g.

Съдържа 2.69 обемни % (v/v) етанол.

#### Помощи вещества:

Глицерол 85 %, ксилитол, пречистена вода

### Какво представлява Ентерокинд?

Ентерокинд е хомеопатичен лекарствен продукт, под формата на капки перорални, разтвор, в стъклена бутилка от 20 ml.

### За какво се използва Ентерокинд?

Ентерокинд се използва за лечение на колики и метеоризъм при кърмачета и малки деца.

### Кога не трябва да се приема Ентерокинд?

Да не се приема от пациенти, които са свръхчувствителни към някоя от съставките на продукта.

### Какви предпазни мерки трябва да имате предвид при приемането на Ентерокинд?

Ако симптомите продължават или се повтарят често, моля, посъветвайте се с лекуващия лекар.

### Кои други лекарства могат да повлияят ефекта на Ентерокинд или могат да бъдат повлиянни?

Няма данни за взаимодействия с други лекарства или с хани. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако вашето дете приема или доскоро е приемало друг лекарствен продукт, дори и ако той не е по лекарско предписание.

### Как можете да използвате Ентерокинд?

Следвайте посочената дозировка или както е изписано от Вашия лекар:

Деца до 6 години: При остри оплаквания се приемат по 3 капки на всеки час, до максимум 6 пъти дневно. След отшумяване на оплакванията се приемат по 3 капки 3 пъти дневно.



Капките се приемат половин час преди или след хранене. Препоръчително е детето да задържи течността в устата си за малко, преди да я гълтне. При кърмачета капките могат да се разтворят в малко вода.

**Какви нежелани лекарствени реакции могат да бъдат причинени от Ентерокинд?**  
Възможни са прояви на свръхчувствителност към Ентерокинд. Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт ако подозирате, че вашето дете проявява нежелана лекарствена реакция, след прием на Ентерокинд.

**Какво трябва да предприемете, ако Вашето дете приеме по-голямо количество от Ентерокинд?**

Не се очакват никакви нежелани лекарствени реакции при прием на по-голямо количество от Ентерокинд

**Инструкции за съхранение на Ентерокинд:**

Да се съхранява на място недостъпно за деца!

**Срок на годност:**

5 години

Да не се използва след изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

**Производител и притежател на разрешителното за употреба:**

Deutsche Homöopathie-Union,  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostrasse 24  
76227 Karlsruhe  
Germany

**Медицинско представителство за България:**

Либра АД

**Дата на последна поправка на текста:**

Ноември 2006

