




NOBEL İLAÇ
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

*Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете Вашето лечение.
За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.
Това лечение е предписано от лекар специално за Вас и не трябва да давате
лекарството на други хора. Лекарството може да им навреди, дори и ако имат същите
оплаквания като Вас.*

Pulcet / Пулсет

Pantoprazole sodium sesquihydrate
Стомашно-устойчиви таблетки

Какво съдържа Pulcet?

Всяка стомашно-устойчива таблетка **Pulcet** съдържа 45.10 mg Pantoprazole Sodium Sesquihydrate като активно вещество, което е еквивалентно на 40 mg Pantoprazole (пантопразол).
Помощни вещества: кросповидон, натриев карбонат обезводнен, манитол, манитол DC 200 (Pearlitol 200 DC), PVK 90, калциев стеарат, фармакоут 603, PVP K 25, материал за филмовото покритие № 9 (Sepisperse AP3232 Jaune) (30%), пропилен гликол, еудрагит L 100-55, цитрофлекс, симетикон емулсия 30%.

Лекарствена форма и опаковка

Pulcet може да намерите в опаковка от 4, 14 и 28 стомашно-устойчиви таблетки.

Как действа Pulcet?

Pulcet принадлежи към групата лекарства, наречени инхибитори на протонната помпа. Активната съставка на **Pulcet** - pantoprazole, намалява количеството на секретиранията от стомашните клетки солна киселина в стомаха Ви.

Какво лекува Pulcet?

Pulcet е показан за лечение на:

- Стомашна и дуоденална язва
- Гастроезофагеален рефлукс, гастро-езофагеална рефлуксна болест и свързаните с нея симптоми (парене зад гръдната кост, киселинен рефлукс, болка при преглъщане и др.)
- В комбинация с подходящ антибиотик за унищожаване на *Helicobacter pylori* при пациенти с дуоденална язвена болест

Кога не трябва да взимате Pulcet?

Не взимайте **Pulcet** в случай, че:

- сте свръхчувствителни към pantoprazole или някое от помощните вещества на продукта;
- имате тежко чернодробно увреждане.

Какво трябва да знаете преди да започнете да приемате Pulcet?

Уведомете Вашия лекар, ако страдате от чернодробна недостатъчност, увредена бъбречна функция или сте на хемодиализа. Преди да започнете лечение с pantoprazole е необходимо да се изключи наличието на злокачествено заболяване на хранопровода или стомаха, тъй като терапията с pantoprazole може да облекчи симптомите, свързани



със злокачественото заболяване и по този начин да се забави неговото диагностициране.

Не са проучени безопасността и ефективността на pantoprazole при деца.

Приложение по време на бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство. Клиничният опит с pantoprazole при бременни жени е ограничен.

Няма информация дали pantoprazole се екскретира в човешката кърма.

По време на бременност и кърмене **Pulcet** трябва да се използва, само когато ползата за майката се преценява като по-голяма от потенциалния риск за плода (кърмачето).

Влияе ли Pulcet на способността за шофиране и работа с машини?

Няма данни **Pulcet** да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Може ли да приемате Pulcet заедно с други медикаменти?

Моля, информирайте Вашия лекар, ако взимате или доскоро сте взимали други лекарствени продукти, дори и такива, отпускани без лекарско предписание.

Pulcet може да се използва едновременно с други антиацидни медикаменти.

Въпреки, че pantoprazole се метаболизира в черния дроб чрез цитохром P-450 ензимната система, не са установени клинично значими взаимодействия с лекарства като warfarin, phenytoin, diazepam и theophylline, които се метаболизират от същата ензимна система.

Pantoprazole потиска стомашната киселинна секреция, поради което е възможно да повлияе абсорбцията на някои медикаменти, чиято бионаличност е pH – зависима като кетоконазол, естери на ампицилина, железни соли.

Как се приема Pulcet?

Pulcet се приема през устата. Приемайте таблетките преди хранене с чаша вода, без да ги дъвчете или натрошавате.

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекуващия Ви лекар.

Показания	Препоръчителна доза / Продължителност на лечението
Дуоденална язва и стомашна язва:	1 таблетка Pulcet един път дневно за срок от 4 седмици. Вашият лекар може да Ви предпише допълнителен 4-седмичен курс с Pulcet в зависимост от това, как отговаряте на лечението.
Гастроезофагеален рефлукс / Гастро-езофагеална рефлуксна болест / Ерозивен езофагит:	1 таблетка Pulcet един път дневно за срок от 4 седмици. Вашият лекар може да Ви предпише допълнителен 4-седмичен курс с Pulcet в зависимост от това, как отговаряте на лечението.
Унищожаване на <i>Helicobacter pylori</i> :	1 таблетка Pulcet 2 пъти дневно с подходящ антибиотик за 7 дни: -1000 mg amoxicillin 2 пъти дневно + 500 mg clarithromycin 2 пъти дневно; или -500 mg metronidazole 2 пъти дневно + 500 mg clarithromycin 2 пъти дневно; или - 1000 mg amoxicillin 2 пъти дневно + 500 mg metronidazole 2 пъти дневно.

Не се налага корекция на дозата при много възрастни пациенти.

Какво да направите, ако пропуснете една доза?



Трябва да приемате лекарството, както Ви е предписано. Ако пропуснете да приемете една доза, вземете следващата, веднага щом си спомните и се върнете към Вашето назначение. Ако е станало време за следващата доза, не взимайте пропуснатата доза, а вземете следващата навреме.

Какво да направите при предозиране?

В случай на предозиране, незабавно се свържете с лекуващия Ви лекар.

Какви нежелани лекарствени реакции може да причини Pulcet?

Всяко лекарство може да има нежелани и неблагоприятни ефекти. По принцип Pulcet се понася добре. В редки случаи могат да се наблюдават нежелани лекарствени реакции като преходна диария, коремна болка, флатуленция, гадене, замайване, главоболие, замъглено виждане, кожен обрив, сърбеж, температура и оток.

Макар и рядко, могат да се появят и други странични ефекти, някои от които сериозни - алергични реакции, тръпки, подуване на лицето, промени в електрокардиограмата, болки зад гръдната кост, анорексия, афтозен стоматит, кардиоспазм, колит, съхнене на устата, глюкозурия, жлъчни болки, хипербилирубинемия, повишена алкална фосфатаза, увеличена гама-глутамил транспептидаза, повишена СГОТ, анемия желязодефицитна анемия, хипохромна анемия, артрит, болки в гърба, ставни болки, миалгия, напрегнатост, астения, нервно напрежение, смущение в съня, емоционална лабилност, сънливост, неразположение, бронхит, ларингит, астма, епистаксис, хълцане, смущение в зрението, амблиопия, диплопия, болки в ушите, промана на вкуса, бучене в ушите, болки в гърдите, дисменорея, дизурия, болки в бъбреците, смущение в уринирането. Вашият лекар разполага с по-пълна информация по този въпрос.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ!

Как се съхранява Pulcet?

ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Продава се по лекарско предписание.

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употреба.

Притежател на разрешението за употреба

НОБЕЛ ФАРМА ООД

Бул. Симеоновско шосе № 24

София 1700, България

Производител

NOBELFARMA ILAC SANAYII ve TICARET A.S.

Sancaklar Koyu 81100 / Duzce, Turkey

Регистрационен №:

Дата на последна редакция на листовката: януари 2007г.

