



ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно цялата листовка преди да използвате това лекарство.

Запазете тази лекарствена информация - може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви въпроси, моля обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го препоръчвайте на никой друг. Можете да навредите на другия, дори симптомите му да изглеждат същите като Вашите.

COLOBUTINE

КОЛОБУТИН

Международно непатентно наименование: trimebutine

- Активната съставка е: trimebutine maleate.

- Помощните вещества са: лактоза монохидрат, захароза, манитол, желатин, макрогол 6000, магнезиев стеарат, пшенично нишесте.

Притежател на разрешението за употреба :

Laboratoires FOURNIER S.A.

9, rue Petitot

21000 DIJON

France

Производител :

Laboratoires SOPHARTEX

21, rue du Pressoir

28500 VERNOUILLET

France

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И ОПАКОВКА

Таблетки от 100 mg.

Кутии с по 2 блистера с по 10 бр. таблетки всеки от тях.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СОЛОВУТИНЕ И В КАКВИ СЛУЧАИ СЕ ИЗПОЛЗВА?

Това лекарство е мускулотропен спазмолитик.

Препоръчва се единствено на възрастни за лечението на болка, свързана със заболявания на храносмилателната система и жлъчните пътища. Той коригира свързаната с това нарушена чревна перисталтика.



2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА COLOBUTINE ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ ?

Не употребявайте COLOBUTINE в случай на алергия към някоя от неговите съставки.

Необходимо е специално внимание с COLOBUTINE

- Тъй като това лекарство съдържа пшенично нишесте, то не трябва да се употребява в случаите на свръхчувствителност или непоносимост към тази съставка.

- Тъй като това лекарство съдържа лактоза, то не трябва да се употребява в случаите на галактоземия (наследствено метаболитно заболяване), при малабсорбционен синдром по отношение на глюкоза и галактоза, както и при случаите на лактазна недостатъчност.

- Тъй като това лекарство съдържа захароза, то не трябва да се употребява в случаите на фруктозна непоносимост, при малабсорбционен синдром по отношение на глюкоза и галактоза, както и при случаите на захарозо-малтозен дефицит

Бременност :

Това лекарство може да се използва по време на бременност само по лекарско предписание. Ако установите, че сте бременна и вече сте започнали лечението, посъветвайте се с Вашия лекар, тъй като единствено той/тя може да реши дали лечението Ви трябва да продължава.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете приемането на какъвто и да било медикамент.

Кърмене :

Това лекарство може да се използва по време на кърмене.

Съветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете приемането на какъвто и да било медикамент.

Шофиране и работа с машини

Няма данни да оказва влияние върху шофирането и работа с машини.

Списък на помощните вещества, които предизвикват добре познати ефекти :

Пшенично нишесте, лактоза, захароза.

Лекарствени и други взаимодействия:

За да избегнете възможни взаимодействия с други лекарства, моля информирайте Вашия лекар или фармацевт за всички други лекарства и продукти, които приемате в момента.



3. КАК ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВА COLOBUTINE?

Перорална употреба.

Не дъвчете таблетките. Таблетките трябва да се поглъщат цели с чаша вода.

ЗА УПОТРЕБА САМО ОТ ВЪЗРАСТНИ.

1 таблетка три пъти дневно.

По изключение дозировката може да бъде увеличавана до 6 таблетки дневно.

Ако чувствате, че действието на COLOBUTINE е твърде силно или твърде слабо, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако погълнете повече таблетки COLOBUTINE, отколкото ви е предписано, тогава трябва :

Незабавно да се посъветвате с Вашия лекар или фармацевт.

Ако пропуснете приема на една таблетка COLOBUTINE 100 mg:

Не приемайте двойна доза при следващото вземане като компенсация за дозата, която сте пропуснали да приемете.

Ефекти при прекратяване на лечението с COLOBUTINE

Няма данни за такива ефекти.

4. КАКВИ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ МОГАТ ДА СЕ ОЧАКВАТ?

Както и с всяка друго лекарство, COLOBUTINE може да причини някои нежелани лекарствени реакции : рядко кожни реакции, умора, гадене, повръщане, топли и студени вълни.

В случай че забележите каквито и да било нежелани реакции, които не са споменати в приложения документ, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ТРЯБВА ДА СЕ СЪХРАНЯВА COLOBUTINE?

ДА СЕ СЪХРАНЯВА ПОД 25° С.

Да се съхранява на места, недостъпни за деца !

6. СРОК НА ГОДНОСТ

3 години

Никога не използвайте след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката.

7. ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ НА ЛИСТОВКАТА:

Март 2003 г.

