



NOBEL İLAÇ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Моля, прочетете внимателно тази листовка преди да започнете Вашето лечение.
За допълнителна информация се обръщайте към Вашия лекар или фармацевт.
Това лечение е предписано от лекар специално за Вас и не трябва да давате
лекарството на други хора. Лекарството може да им навреди, дори и ако имат същите
оплаквания като Вас.

Mycofin® 250 / Микофин® 250

Terbinafine HCl
Таблетки

Какво съдържа Mycofin® 250?

Всяка таблетка Mycofin® 250 съдържа 281.250 mg Terbinafine HCl (тербинафин хидрохлорид), еквивалентно на 250 mg Terbinafine (тербинафин) като активно вещество.

Помощни вещества: хидроксипропил метил целулоза 15 ср, кроскармелоза натрий, микрокристална целулоза РН 101, микрокристална целулоза РН 102, колоиден силициев диоксид, магнезиев стеарат.

Лекарствена форма и опаковка

Mycofin® 250 mg може да намерите в опаковка от 4, 14 и 28 таблетки за перорално приложение..

Как действа Mycofin® 250?

Mycofin® 250 спада към групата на противогъбичните средства и се използва при лечение на гъбични инфекции по кожата, ноктите и окосмената част на главата. Активен е спрямо щамове на следните микроорганизми: *Trichophyton* (*T. rubrum* и *T. mentagrophytes*, *T. verrucosum*, *T. violaceum*), *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*) и *Candida albicans*. След приема на таблетките, тербинафин достига концентрация, достатъчна, за да убие гъбичките или да спре тяхното развитие.

Какво лекува Mycofin® 250?

Mycofin® 250 е показан за лечение на:

- Онихомикоза (гъбична инфекция на ноктите) на пръстите на краката или на пръстите на ръцете, предизвикана от дерматофити (*tinea unguium*);
- *Tinea capitis* (гъбична инфекция по окосмената част на главата);
- Гъбични инфекции по кожата, за лечение на *tinea corporis*, *tinea cruris* и *tinea pedis* (ходило на атлет);
- Инфекции на кожата, причинени от дрожди от вида *Candida* (напр. *Candida albicans*)

Кога не трябва да взимате Mycofin® 250?

Не взимайте Mycofin® 250 ако:

- сте свръхчувствителни към тербинафин или някое от помощните вещества на продукта;
- страдате от хронично или активно чернодробно заболяване



Какво трябва да знаете преди да започнете да приемате Mycofin® 250?

Уведомете Вашия лекар, ако имате чернодробни или бъбречни проблеми

Приложение по време на бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на кърмите и да е лекарство. Поради ограниченият клиничен опит при бременност Mycofin® не трябва да се прилага по време на бременност, освен в случаите, когато потенциалните предимства за майката превишават възможните рискове за плода. Тербинафин се екскретира в кърмата, затова при кърмещи жени не се препоръчва перорално лечение с Mycofin®.

Влияе ли Mycofin® 250 на способността за шофиране и работа с машини?

Няма данни Mycofin® 250 да повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Може ли да приемате Mycofin® 250 заедно с други медикаменти?

Моля, информирайте Вашия лекар, ако взимате или доскоро сте взимали други лекарствени продукти, дори и такива, отпусканни без лекарско предписание. Някои лекарства като циметидин, рифампин, някои антидепресанти и други могат да взаимодействат с Mycofin® 250.

Как се приема Mycofin® 250?

Дозировката и продължителността на лечението се определят от лекуващия Ви лекар. Не превишавайте препоръчаната Ви доза.

Приложение при възрастни:

Обичайната доза е 1 таблетка Mycofin® 250 дневно

Показания	Препоръчителна доза / Продължителност на лечението
Онихомикоза:	6 – 12 седмици (1 път дневно)
Онихомикоза по ръцете:	6 седмици (1 път дневно)
Онихомикоза по краката:	12 седмици (1 път дневно)
Tinea capitis:	4 – 6 седмици (1 път дневно)
Tinea corporis, tinea cruris:	2 – 4 седмици (1 път дневно)
Tinea pedis (между пръстите, плантарна/тип „мокасини“).	2 – 6 седмици (1 път дневно)
Candidiasis /кожна кандидоза/	2 – 4 седмици (1 път дневно)

Приложение при деца на възраст от 3 до 16 години:

Деца с телесно тегло от 12 до 20 kg	62.5 mg дневно
Деца с телесно тегло от 20 до 40 kg	125 mg дневно
Деца с телесно тегло над 40 kg	250 mg дневно

Приложение при пациенти в напреднала възраст:

Не се налага корекция на дозата при много възрастни пациенти

Какво да направите, ако пропуснете една доза?

Приемайте лекарството, както Ви е предписано. Ако пропуснете приема на една доза, вземете следващата, веднага щом си спомните и се върнете към Вашето назначение. Ако е станало време за следващата доза, не взимайте пропуснатата, а вземете следващата навреме.

Какво да направите при предозиране?

В случай на предозиране, незабавно се свържете с лекуващия Ви лекар. Признаците на предозиране включват главоболие, гадене, стомашни болки и замаяност от лекарствата.



Какви нежелани лекарствени реакции може да причини Mycofin® 250?

Всяко лекарство може да има нежелани и неблагоприятни ефекти. Обикновено Mycofin® 250 се понася добре. Страниците реакции са леки до средно изразени и преходни. Най-често срещаните нежелани реакции са нарушен храносмилане, чувство на тежест в стомаха, загуба на апетит, гадене, лека коремна болка, диария, алергични реакции на кожата (обрив, уртикария) и главоболие. Други неразположение, лесна уморяемост, повръщане, артриталгия (болезнени стави), миалгия (болки в мускулите) и косолад. Макар и рядко, могат да се появят и други странични реакции, някои от които сериозни. Вашият лекар разполага с по-пълна информация по този въпрос.

Информирайте Вашия лекар незабавно ако:

- Имате симптоми като необяснимо продължително гадене, стомашни проблеми, загуба на апетит или необичайна умора или слабост;
- Ако забележите кожата или бялото на очите да пожълтяват, ако урината е необичайно тъмна или ако изпражненията са необичайно светли;
- Ако ѝмате сериозни кожни проблеми.

КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ЗАБЕЛЕЖИТЕ НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ!

Как се съхранява Mycofin® 250?

ДА НЕ СЕ УПОТРЕБЯВА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕН ВЪРХУ ОПАКОВКАТА

Да се съхранява в оригиналната опаковка

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Срок на годност 2 години.

Продава се по лекарско предписание.

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употреба.

Притежател на разрешението за употреба

НОБЕЛ ФАРМА ООД
Бул. Симеоновско шосе № 24
София 1700, България

Производител

NOBELFARMA İLAC SANAYİİ ve TİCARET A.S.
Sancaklar Koyu 81100 / Duzce, Turkey

Регистрационен №:

Дата на последна редакция на листовката: януари 2007г

