

Информация за пациента

Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Praeparate
Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin

DENTINOX® Gel N
ДЕНТИНОКС Гел Н
Зъбен гел за деца

Количествен и качествен състав

1 g съдържа лекарствени вещества :

Matricariae chamomillae tinctura	150.0 mg
Lidocaine Hydrochloride 1H ₂ O	3.4 mg
Polidocanol 600	3.2 mg

Помощни вещества:

Разтвор на сорбитол, ксилитол, пропиленгликол, карбомер 934 Р, полисорбат 20, натриев едетат, натриева основа, захарин натрий, ментол, пречистена вода

Лекарствена форма

Гел дентален.

Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба

Dentinox Gesellschaft
Für pharmazeutische Präparate
Lenk & Schuppan

Nunsdorfer Ring 19
D-12277 Berlin
Tel: +49 30 7200340 Fax: +49 30 72 11038



Начин на действие

Лидокаин хидрохлорид облекчава бързо болката, възникнала при пробива на зъбите.

Полидоканол притежава продължителен обезболяващ ефект.

Тинктурата от лайка има противовъзпалително действие.

Приложението на ДЕНТИНОКС Гел Н облекчава болката и предотвратява дразненето и възпалението на венците, предизвикани от поникване на млечните зъби и късните кътници.

Показания

ДЕНТИНОКС гел Н се прилага за облекчаване на болката и възпалението в периода на никнене на млечните зъби.

Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Взаимодействия с други лекарства

Не са известни.

Специални предупреждения при употреба

При наличие на инфекция, причинена от гъбички може да се наблюдава повишена резорбция на лидокаина, съдържащ се в ДЕНТИНОКС Гел Н.

Не е препоръчително ДЕНТИНОКС Гел Н да се прилага в близост до очите.

Етеричните масла, респективно ментол могат да причинят екзацербация на астма, бронхоспазъм, конвулсии, особено в по-високи дози.

Бременност и кърмене

ДЕНТИНОКС гел Н е локално прилаган продукт специално за малки деца.



Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма данни.

Предозиране

Поради ниската концентрация на активните съставки и малкото количество в опаковката, симптоми на предозиране не са наблюдавани. Няма съобщения за случаи на интоксикация.

Дозировка и начин на употреба

Ако не е предписано друго, когато се проявят първите белези на прорастване на зъбите, количество колкото грахово зърно ДЕНТИНОКС гел Н с чист пръст или памучен тампон се нанася и втрива с леки масажиращи движения върху засегнатото място на венеца.


Процедурата трябва да се повтаря 2-3 пъти дневно след хранене и преди сън.

Приложението (при нужда) може да продължи до поникването на всички млечни зъби вкл. късните кътници.

В периода на никнене на млечните зъби ДЕНТИНОКС Гел Н може да се прилага с прекъсвания в продължение на няколко седмици.

Нежелани реакции

Много рядко могат да бъдат наблюдавани алергични реакции напр. кожен обрив, локално дразнене и контактен дерматит, причинени от Лидокаина и Полидоканола, но и от други съставки на продукта. При локалното приложение на Лидокаин в устната и фарингеалната кухина може да се наблюдава затруднено гълтане. Много рядко може да бъде наблюдавана съниливост след употребата на ДЕНТИНОКС гел Н. При интравенозното приложение на много високи дози Полидоканол може да се наблюдава хемолиза и парасимпатикови симптоми.



Съхранение:

Да се съхранява на стайна температура (20-25°C).

Запушалката да се затваря пътно.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Срок на годност :

4 години

Трайност след отваряне на тубата: 1 година.

Да не се използва след изтичане срока на годност, означен върху опаковката.

Данни за опаковката

Алуминиева туба с 10 g гел.

Без лекарско предписание.

Дата на последна редакция на листовката

Юни 2001

