

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 11.06.02

doxiproct® plus

ДОКСИПРОКТ плюс

Супозитории за локално лечение на хеморонди

Състав:

1 супозитория съдържа: Calcium dobesilate: 250 mg, Lidocaine hydrochloride: 40 mg, dexamethasone acetate: 0.25 mg антиоксиданти (E 320, E310).

Помощни вещества: 1 супозитория съдържа: Лактоза - 20.00 mg; Пропил галат -0.09 mg; Бутилхидрокснанизол-0.30 mg; Дехидрирана лимонена киселина - 0.60 mg; Витепсол Е79 -488.76 mg; Витепсол W35 - q.s. 2000.00 mg

Лекарствена форма:

8 супозитории за ректално приложение.

ATC код: C05AA

Притежател на разрешението за употреба:

OM PHARMA,

22 Rue du Bois-du-Lan

1217 Meyrin 2, Geneva

Switzerland

Производител

OM PHARMA,

22 Rue du Bois-du-Lan

1217 Meyrin 2, Geneva

Switzerland

или

OM Portuguesa

Rua de Indústria no. 2

Quinta Grande P 2720-302, Amadora

Portugal

Свойства/ Действие

Calcium dobesilate въздейства върху капилярните стени, като регулира нарушените им физиологически функции – увеличен пермеабилитет и намалена устойчивост- и върху различните симптоми на възпалението. Освен това има и антитромботично действие. Lidocaine hydrochloride е местен анестетик, който допринася за намаляване на болката. Dexamethasone acetate е кортикостероид за външна употреба и има противовъзпалително и противопуритично въздействие.

Doxiproct Plus намалява възпалението, кървенето, отделянето а серини флуиди и осигурява бързо облекчаване на симптомите на възпаление в аналната област, като болка, сърбеж, усещане за парене или напрежение. Комбинацията на calcium dobesilate и кортикостероид трябва да се използва само в случаи на остри възпалителни процеси. Не се препоръчва продължително лечение.

Показания за употреба

Болестно променени вътрешни и външни хеморонди. Анален пруритус, анална екзема, анитис, пернанитис, криптитис, папилитис, тежка хемороидна тромбоза, анални фисури.

Пред- и пост- оперативно лечение, в случаи на оперативно отстраняване на хеморонди.

Дозировка и начин на приложение

Супозитории: 2 супозитории на ден.

Супозиторите се прилагат сутрин и вечер, ако е възможно след дефекация. В случай на вътрешни хеморонди, да се прилагат супозитории. Ако се предпочита маз, да се използва канюолата, която се завинта към тубата. При външни хеморонди или анален сърбеж, да се нанася тънък слой маз, няколко пъти дневно.

Възможно е да се комбинира употребата на супозитории и маз.

Продължителността на лечението обикновено е няколко дни. Трябва да се информира лекуващия лекар, ако след 1-2 седмично лечение, състоянието не се е подобрило или се е влошило. Лечението не бива да се повтаря без да е изрично предписано от лекар.

Ограничения при употреба

Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на Doxiproct Plus.

Деца под 14 годишна възраст.

Предпазни мерки

В случай на остра бъбречна недостатъчност, употребата на Doxiproct Plus трябва да се ограничи до няколко дни. В случай на появя или на съмнение за наличие на кръв в изпражненията, както и едновременно появление на болка и фебрилитет, е необходимо да се консултирате с лекар.

Лечението трябва да бъде спряно в случай на появя на реакции на свръхчувствителност.

Бутилхидрокснанизол, който влиза в състава на това лекарство може да предизвика раздразнение на кожата и лигавиците.

Бременност и кърмене

Бременност категория C: Няма проучвания при бременни жени или животни и не е известно дали Calcium dobesilate преминава плацентната бариера. От друга страна, при перорално приемане, Lidocaine hydrochloride и dexamethasone acetate се резорбират в различни количества и може да има системни ефекти. Освен това, те преминават плацентната бариера. Като се има предвид всичко това, Doxiproct Plus трябва да се прилага по време на бременност, само ако евентуалните положителни ефекти оправдават риска за плода.

След перорално приложение, Calcium dobesilate се екскретира в малки количества в майчиното мляко, но не е известно дали това се получава и при местна употреба. След външна употреба, Lidocaine hydrochloride и dexamethasone acetate се екскретират в майчиното мляко. Като предпазна мярка, трябва да се прекъсне или лечението или кърменето.

Нежелани реакции

Много редки случаи: промени в чревното преминаване, временно усещане за парене, местна болка.

Могат да се появят реакции на свръхчувствителност заедно с реакции на кожата и/или фебрилитет, които може да са с алергичен произход.(вж. "Предпазни мерки")

Взаимодействия

Не са известни до сега.

Предозиране

До сега не са известни случаи на предозиране.

Съхранение

Да се съхранява при температура под 30 °C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да не се употребява след посочената на опаковката дата на изтичане на срока на годност.

Опаковка

Супозитории: Картонена кутия от 8 супозитории.

Дата на последен преглед на текста:

Август 1998г.