

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 27.06.03

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА
Инструкция за употреба

DILZEM® 25 mg parenteral
Diltiazem hydrochloride

Моля, прочетете внимателно!

Тази листовка е за лекарството Dilzem 25 mg parenteral. Моля, прочетете преди да започнете приемането на Dilzem 25 mg parenteral. Тази информация ще Ви бъде полезна. Ако нещо не Ви е ясно или имате нужда от допълнителна информация, потърсете Вашия лекуващ лекар или фармацевт. Можете да пожелаете да прочетете отново тази информация, затова пазете тази листовка.

Името на това лекарство е Dilzem 25 mg parenteral. Активната съставка е дилтиазем хидрохлорид.

Какво съдържа Dilzem 25 mg parenteral

Dilzem 25 mg parenteral се предлага в опаковка, съдържаща 5 флакона и 5 ампули.

Всеки флакон със 175 mg прах за инжекционен разтвор съдържа 25 mg diltiazem hydrochloride и помощното вещество манитол.

Всяка ампула съдържа 5 ml разтворител (вода за инжекции).

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer HCP Corporation
235 East 42nd Str.
New York, NY 10017-5755
USA

Производител

Goedecke GmbH,
Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,
Germany

Какъв тип лекарство е Dilzem 25 mg parenteral

Dilzem 25 mg parenteral принадлежи към група лекарства, наречени калциеви антагонисти.

За какво се използва Dilzem 25 mg parenteral

Dilzem 25 mg parenteral се използва за:

- лечение на пароксизмална суправентрикуларна тахикардия (много висока честота на сърдечните удари);
- намаляване на камерната честота при предсърдно мъждене или трептене с бърза проводимост (освен при едновременно съществуващ WPW-синдром).

Преди да използвате Dilzem 25 mg parenteral

Трябва да уведомите Вашия лекар за всяко предшестващо или придружаващо заболяване, текущо друго лечение и за Вашия начин на живот и навици.

Ако отговорите с ДА на някои от следните въпроси, информирайте Вашия лекар преди да приемете Dilzem 25 mg parenteral

- Алергични ли сте към diltiazem?
- Имали ли сте или имате заболяване на сърцето?
- Прекарвали ли сте остър инфаркт на миокарда с усложнения (брадикардия – бавно биене на сърцето, изразена хипотония – ниско кръвно налягане, лявокамерна сърдечна недостатъчност)?
- Имате ли слабост на сърдечния мускул (сърдечна недостатъчност)?



- Имате ли брадикардия (пулс в покой под 55 удара в минута)?
- Имате ли ниско кръвно налягане (хипотония)?
- Имате ли чернодробно и/или бъбречно заболяване?
- Приемате ли бета-блокери (използват се за лечение на сърдечно-съдови заболявания)?

Едновременното венозно приложение на бета-рецепторни блокери и Dilzem 25 mg parenteral не се допуска.

- Бременна ли сте или планирате да забременеете? По време на лечението трябва да се вземат ефикасни мерки за предпазване от забременяване.

- Кърмите ли?

Как да приемате Dilzem 25 mg parenteral

Вашият лекар ще определи дозата и продължителността на лечение. Dilzem 25 mg parenteral се прилага като венозна инжекция или вливане.

Може ли да шофирате, докато сте на лечение с Dilzem 25 mg parenteral

Приложението на това лекарство изисква редовен лекарски контрол. Поради различни индивидуални реакции може да се ограничи способността за активно участие в движението по пътищата или за работа с машини. Това е валидно особено в началото на лечението, при смяна на лекарството или при взаимодействие с алкохол.

Причинява ли Dilzem 25 mg parenteral нежелани лекарствени реакции

В допълнение към желания основен ефект, всички лекарствата могат да имат нежелани ефекти, наречени нежелани лекарствени реакции. При лечение с Dilzem 25 mg parenteral понякога могат да се наблюдават нежелани лекарствени реакции като главоболие, уморемост, световъртеж и чувство за слабост. Понякога настъпват отоци по глезените или краката и кожни алергични реакции като зачервяване на кожата, сърбеж и обрив. В единични случаи са наблюдавани алергични реакции като мултиформена ексудативна еритема (тежко кожно заболяване), увеличаване на лимфните възли (лимфаденопатия) и увеличаване на броя на една част от белите кръвни клетки, наречени еозинофили (еозинофилия).

Рядко се появяват стомашно-чревни оплаквания (гадене, повръщане, киселини, диария, запек).

В редки случаи се наблюдава обратимо покачване на чернодробните ензими (СГОТ, СГПТ, гама-ГТ, ЛДХ) и на алкалната фосфатаза като проява на остро чернодробно увреждане. Препоръчва се чернодробните ензими да се контролират редовно.

В единични случаи, особено при по-големи дози и/или съответно предшестващо увреждане на сърцето се наблюдават забавяне на сърдечната дейност (брадикардия), нарушение във възбудимостта и проводимостта на сърцето (SA- или AV-блок), по-силно спадане на кръвното налягане, прескачане на сърцето (палпитации), синкопи и сърдечна недостатъчност (сърдечна слабост).

Рядко се наблюдават безсъние, халюцинации и депресивни разстройства.

В единични случаи се нарушава потенцията (възможността за осъществяване на полов акт).

Много рядко след продължително лечение настъпва подуване на венците (хиперплазия на венците), която напълно изчезва след прекратяване на лечението (трябва да се поддържа добра хигиена на устата).


В единични случаи е наблюдавано повишение на кръвната захар. Това трябва да се има пред вид преди всичко при пациенти с диабет.

Може ли Dilzem 25 mg parenteral да се приема с други лекарства

Едновременният прием на няколко лекарства може да измени действието им. Консултирайте се с Вашия лекар, ако постоянно приемате или сте вземали някакви лекарства в последно време. Вашият лекар ще Ви уведоми дали ще са необходими специални мерки като коригиране на дозата, ако употребявате и това лекарство.

Уведомете Вашия лекар, ако приемате:

- лекарства за понижаване на кръвното налягане;



• бета-рецепторни блокери (използват се за лечение на сърдечно-съдови заболявания).
Не се допуска едновременно венозно приложение на бета-рецепторни блокери и Dilzem 25 mg parenteral (виж Преди да използвате Dilzem 25 mg parenteral);

• антиаритмици (използват се за лечение на аритмии);
• сърдечни гликозиди, напр. Digoxin и Digitoxin (използват се за лечение на сърдечна недостатъчност);

- Carbamazepin (използва се за лечение на гърчове);
- Midazolam или Triazolam, (използват се при безсъние);
- Theophyllin (използва се за лечение на белодробни заболявания);
- Cyclosporin A (използва се при пациенти с трансплантация);
- Cimetidin или Ranitidin (използват се за лечение на язва на стомаха);
- Инхалационни анестетици (използват се за упойки при операции).

Какво да направите, ако сте получили по-голяма доза или ако сте пропуснали прием

Тъй като това лекарство се прилага като венозна инжекция или вливане под лекарски контрол, вероятността да пропуснете доза или да получите по-голяма доза е малка. Ако имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар.

Къде да съхранявате Вашето лекарство

Пазете всички лекарства на недостъпно за деца място!

Грижете се за Вашето лекарство! Това лекарство е за ВАС. НЕ ТРЯБВА да го давате на други. То може да не е подходящо за тях.

Не използвайте лекарството след датата, обозначена на опаковката.

Допълнителна информация

Информацията в тази листовка е само за Dilzem 25 mg parenteral. Тази листовка не съдържа цялата информация за това лекарство. Ако имате някакви въпроси или не сте сигурни за нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последна редакция на текста

Март 2003

