

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

ИАЛ
ОДОБРЕН
ДАТА 15.02.06

Уважаеми пациенти,

Моля прочетете внимателно тази листовка, защото тя съдържа важна за Вас информация. Ако имате допълнителни въпроси се обръщайте към Вашият лекар или фармацевт.

Hotemin® 10 mg and 20 mg suppositories
Хотемин 10 mg и 20 mg свещички

Производител и притежател на разрешението за употреба:

EGIS Pharmaceuticals Public Limited Company
1106 BUDAPEST, Kereszturi ut 30-38.
HUNGARY

1. Какво съдържа Вашето лекарство

Всяка свещичка (супозитория) Hotemin съдържа 10 mg или 20 mg от лекарственото вещество piroxicam, респективно. Като помощни вещества се съдържат твърда мазнина, средно-верижни масти, колоидален безводен неразтворим силициев диоксид, хипромелоза.

2. Защо приемате Hotemin свещички?

Hotemin принадлежи към група лекарства, известни като нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), които са болкоуспокояващи, притежават противовъзпалително действие и понижават телесната температура. Piroxicam упражнява действието си чрез успокояване на болката, сковаността и отоците при артрит и други мускулно-скелетни заболявания. Помага също при остръ пристъп на подагра.

Прилагането на лекарственото вещество piroxicam под формата на свещички дава възможност да се избегне неговия ефект за причиняване на язва на стомашно-чревния тракт, което е възможно при приложение през устата.

Запомнете: Това лекарство е предписано САМО на Вас. Не го предоставяйте на никой друг, дори и ако оплакванията му са подобни на Вашите.

Започването на лечението с Hotemin се назначава от лекар специалист.



3. Кога НЕ ТРЯБВА да приемате тези свещички?

Не бива да приемате Hotemin свещички:

- Ако сте алергични към някои от гореспоменатите вещества;
- Ако сте имали в миналото алергична реакция (течаш нос, сърбящ обрив, кихане, оток на лицето и устните) след употреба на ригохисам, аспирин (или други салицилати) или друго нестероидно противовъзпалително лекарство;
- Ако сте бременна, оптвate да забременеете или кърмите;
- Ако имате активна язва на stomахa, кръвотечение от stomашно-чревния тракт или повтарящи се разяззвявания в храносмилателния тракт;
- Страдате от умерена или тежка сърдечна недостатъчност;
- Ако в момента приемате лекарства, потискащи кръвосъсирването (антикоагуланти).

Hotemin свещички не се препоръчват при деца под 14-годишна възраст.

4. Предпазни мерки преди прилагане на свещичките

Преди започване на лечението, Вашият лекар може да прецени за необходимо да извърши някои лабораторни изследвания. Уведомете Вашия лекар, ако страдате от болест или състояние, за което той не е информиран.

Преди приемането на Hotemin

Приемането на лекарства като Hotemin може да бъде свързано с леко повишен риск от сърдечен инцидент (миокарден инфаркт) или инсулт. Всеки един от тези рискове е по-вероятен при високи дози и продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози, нито назначената продължителност на лечението.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например, ако имате високо кръвно налягане, диабет, повищени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.


Този лекарствен продукт може обратимо да затрудни евентуално забременяване. Информирайте Вашия лекар, ако имате желание да забременеете или ако имате трудности при забременяване.

5. Предпазни мерки по време на лечението със свещичките

По време на лечението може да се появят оплаквания от страна на stomашно-чревния път (диария или запек).

Изхождането на катранено черни изпражнения по време на лечението с Hotemin е показателно за кървене от stomашно-чревния път. В този случаи трябва незабавно да ПРЕКРАТИТЕ прилагането на свещичките.

Ако имате чувство на парене или сърбеж в областта на ануса, където прилагате тези свещички, веднага информирайте Вашия лекар.



Специално внимание се препоръчва при пациенти с тежки нарушения на чернодробната и бъбреchnата функция, както и при пациенти в старческа възраст.

Вашият лекар може да прецени за необходимо да извърши някои лабораторни изследвания по време на лечението (броене на кръвните клетки, изследвания свързани със съсирането на кръвта, изследвания на чернодробната функция). Може да се наложи някои от тези изследвания да се провеждат редовно.

6. Как другите лекарства могат да повлияят Вашето лечение с Hotemіn свещички?

Много е важно да информирате Вашия лекар, ако приемате някакви други лекарства. Трябва също така да съобщите, ако приемате лекарства без рецептa.

Моля уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някои от следните лекарства:

- аспирин или други НСПВС (рисък от стомашно-чревно кървене, т.е. поява на черни изпражнения);
- лекарства, съдържащи литий;
- кортикоステроиди (например преднизолон или подобни лекарства);
- лекарства, понижаващи кръвното налягане;
- лекарства, съдържащи калий или калий-съхраняващи диуретици;
- лекарства за потискане съсирането на кръвта (антикоагуланти);
- антитромбоцитни лекарства и селективни инхибитори на обратно захващане на серотонина (SSRI), поради увеличен рисък от стомашно-чревно кървене.

7. Шофиране и работа с машини по време на лечение с Hotemіn свещички

Тъй като лечението с Hotemіn може да предизвика влошаване на зрението, НЕ шофирайте и НЕ работете с машини, ако имате такова нарушение.

8. Дозировка

Вашият лекар ще назначи колко свещички да прилагате и колко често. Вие трябва да спазвате точно неговите инструкции.

При артрит началната доза е 20 mg веднъж дневно, а при много силни болки началната доза по изключение може да бъде 30 mg веднъж дневно.

Началната доза трябва да бъде постепенно намалена до 10-20 mg дневно.

При остръ пристъп на подагра еднократна дневна доза от 40 mg трябва да се прилага в продължение на 5-7 дни.

Не е препоръчително продължително лечение на подагра с Hotemіn.

Предписаната дневна доза не трябва да се превишава.

Как да прилагате свещичките

Разкъсайте обвивката от фолио и извадете свещичката.

Насочете острия ѝ край към ануса и с пръст я избутайте внимателно възможно по-навътре. Старайте се да задържите свещичката, така че лекарственото



вещество да може да се поеме от организма. Не пропускайте да си измиете ръцете след това.

Ако пропуснете някой прием, поставете свещичка веднага щом имате възможност, освен ако не е време за следващия прием. Ако това е така, вземете я няя. НЕ ПРИЕМАЙТЕ двойна доза за да заместите пропуснатата.

Ако Вие или някой друг (например дете) погълнете от тези свещички, вземете всичките, които са останали заедно с тази листовка и ги занесете веднага на лекаря.

9. Възможни нежелани лекарствени реакции

Ако приемате Hotemin свещички за първи път и получите оток на лицето или ръцете, или зачервяване на кожата, СПРЕТЕ прилагането на свещичките и уведомете Вашия лекар.

При појава на язва или внезапно кръвотечение, СПРЕТЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЛЕКАРСТВОТО и се свържете с Вашия лекар НЕЗАБАВНО.

Ако се появи сърбеж или парене в областта на ануса, ПРЕКРАТЕТЕ прилагането на лекарствения продукт.

Може да се проявят някои от следните състояния: запек, стомашен дискомфорт, газове, диария.

Също така, може да се появят отоци на краката (ако страдате от сърдечна недостатъчност), повищена чувствителност към слънчева светлина, сърбящи обриви, излющване на кожата и други кожни увреждания (пришки, уплътнения, обезцветяване на кожата, подутини). Ако забележите някакви необичайни кръвотечения или необясними охлувания, съобщете на Вашия лекар.

Могат да се появят също главоболие или замайване, съниливост, лабилност, нарушения в зрението, задух, алергични отоци (ръце, лице).

Приложението на лекарства като Hotemin може да бъде свързано с леко увеличен рисък от сърдечни инциденти (миокарден инфаркт) или инсулт.

Ако се появят някои други нежелани реакции, които не са споменати в тази листовка или ако някои от горепоменатите започнат да Ви беспокоят, незабавно информирайте Вашия лекар.

Срокът на годност е отпечатан върху опаковката.

Не бива да използвате свещичките след тази дата!

Да се съхранява под 20°C.

СЪХРАНЯВАЙТЕ ВСИЧКИ ЛЕКАРСТВА НА НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА МЯСТО!

10. Дата на изготвяне или последна проверка

Март, 2007 год.

