

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

ПАНТОГЕЛ
PANTOGEL®
Гел 5%

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 24.07.07.....

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ЛИСТОВКА, ТЪЙ КАТО В НЕЯ СЕ СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС!

Този лекарствен продукт се отпуска без рецепта. Въпреки това Вие трябва да използвате Пантогел внимателно, за да получите най-добри резултати от лечението.

- Запазете тази листовка. Може да Ви се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от повече информация, обърнете се към фармацевт или лекар за съвет.
- Ако въпреки лечението симптомите на заболяването се усилват или остават без промяна, консултирайте се с лекар.

В ТАЗИ ЛИСТОВКА СЕ СЪДЪРЖА СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Какво представлява Пантогел и за какво се прилага.
2. Какво Ви е необходимо да знаете преди приложение на Пантогел.
3. Как да прилагате Пантогел.
4. Възможни нежелани реакции.
5. Как да съхранявате Пантогел.
6. Друга информация.

Пантогел гел 5%

Лекарствено вещество в един 1 g гел: Дехпантенол - 50 mg.

Помощни вещества: карбомер, троламин, пропиленгликол, динатриев едетат, левоментол, захарин натрий, метил парахидроксибензоат, пропилен парахидроксибензоат, етанол, пречистена вода.

Пантогел се предлага в алуминиеви туби от 40 g и 60 g, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба:

"Актавис" ЕАД
бул. "Княгиня Мария Луиза" № 2
София, България
Тел: 9321 762

Производител:

"Балканфарма-Троян" АД,
5600 Троян, ул. "Крайречна" № 1, България
Тел. (0670) 62 607; Факс: (0670) 62 610

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАНТОГЕЛ И ЗА КАКВО СЕ ПРИЛАГА

Пантогел е лекарствен продукт, съдържащ лекарственото вещество декспантенол, който като производно на пантотеновата киселина принадлежи към голямата група на витамин В. При попадането си в клетките декспантенол бързо се метаболизира до пантотенова киселина, която играе особено важна роля за растежа и регенерацията на кожата и лигавиците. При недостиг в организма се появяват смущения в растежа, кожни заболявания, язви на лигавиците, потиска се образуването на антитела. При

външно приложение, декспантенолът може да задоволи повишената потребност на увредената кожа от пантотенова киселина.

Пантогел гел се използва за лечение на:

- иритативни дерматити (раздразнена кожа);
- повърхностни изгаряния;
- еритем след излагане на ултравиолетови лъчи (слънчево изгаряне);
- за подобряване възстановяването на бавно заздравяващи рани и декубитуси;
- за лечение на повърхностни наранявания на кожата на млечната жлеза, включително на гърдните зърна при кърмачки.

2. КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПАНТОГЕЛ

Пантогел не се прилага при:

- алергия към лекарственото или към някое от помощните вещества на продукта.

При приложението на този лекарствен продукт, имайте предвид следното:

Пантогел гел е предназначен само за приложение върху кожата т.е. за локална (външна) употреба. Не бива да се допуска поглъщане на гела или приложение върху очите и лигавиците.

Бременност и кърмене

Преди прием на каквито и да е лекарствени продукти се консултирайте с лекуващия Ви лекар или с фармацевт.

Няма риск от прилагането на Пантогел гел по време на бременност и кърмене.

Шофиране и работа с машини

Продуктът не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация за някои от съставките на Пантогел

Този лекарствен продукт съдържа като помощни вещества метил парахидроксибензоат и пропил парахидроксибензоат, поради което може да причини някои алергични реакции (контактен дерматит и рядко уртикария и бронхоспазъм).

Приложение на други лекарствени продукти

Моля, информирайте своя лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали други лекарствени продукти, дори ако те не са Ви били предписани от лекар.

Не са известни случаи на неблагоприятни лекарствени взаимодействия с други лекарства.

3. КАК СЕ ПРИЛАГА ПАНТОГЕЛ

Винаги прилагайте Пантогел точно както е посочено в тази листовка!

Този продукт се отпуска без лекарско предписание.

Прилага се локално върху кожата.

Пантогел гел се нанася чрез леко втриване на тънък слой от 1 до 3 пъти дневно.

В периода на кърмене лекарството се намазва върху гърдните зърна след всяко кърмене, без опасност за кърмачето.

Ако имате впечатлението, че ефектът от приложението на Пантогел е по-силен от очаквания или недостатъчен, обърнете се към своя лекар или фармацевт.

Ако сте използвали по-голяма доза Пантогел от предписаната:

Не е възможно предозиране при спазване на препоръчания дозировъчен режим и начин на употреба.

При инцидентно поглъщане:

При поглъщане на големи количества от Пантогел гел не може да се очаква интоксикация. Евентуално появили се стомашно-чревни оплаквания се лекуват симптоматично.

При прояви на симптоми на предозиране, незабавно се обърнете към лекар!

Ако сте пропуснали да приложите Пантогел

Ако сте пропуснали едно приложение, приложете продукта максимално рано след пропуснатия час.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както и всеки друг лекарствен продукт, Пантогел може да предизвика нежелани лекарствени реакции.

Много рядко е възможна поява на алергични кожни реакции.

Ако забележите каквито и да е нежелани реакции, които не са отразени в тази листовка, моля съобщете за това на своя лекар или фармацевт.

5. УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

При температура под 25⁰С. Да не се замразява!

Срок на годност: 2 (две) години от датата на производство. 3 (три) месеца след първо отваряне на опаковката.

Да не се употребява след изтичане срока на годност, указан на опаковката!

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка допълнителна информация относно този лекарствен продукт се обръщайте към местното представителство на Притежателя на разрешението за употреба.

"Актавис" ЕАД

бул. "Княгиня Мария Луиза" № 2

София, България

Тел: 9321 762

Последна актуализация на текста – Юли 2007 г.