

ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 11.06.02

Doxiproct
Доксипрокт
Супозитории за локално лечение на хемороиди

Състав:

1 супозитория съдържа: Calcium dobesilate : 250 mg , Lidocaine hydrochloride : 40 mg
Помощни вещества: 1 супозитория съдържа: Пропил галат-0.09 mg; Бутилхидроксанизол-0.30 mg; Дехидрирана лимонена киселина-0.60 mg; Витепсол E79-509.01 mg; Виртепсол W35-q.s. 2000.00 mg

Лекарствена форма

Супозитории за ректално приложение.
АТС код: C05AA

Притежател на разрешението за употреба:

OM PHARMA
22 rue du Bois-du-Lan
1217 Meyrin 2 / Geneva (Switzerland)

Производител:

OM PHARMA
22 rue du Bois-du-Lan
1217 Meyrin 2 / Geneva (Switzerland)

или

OM Portuguesa
Rua de Industria No 2
Quinta Grande
2720-302 Amadora (Portugal)

Свойства/ Действие

Calcium dobesilate въздейства върху капилярните стени, като регулира нарушените им физиологически функции – увеличен пермеабилитет и намалена устойчивост- и върху различните симптоми на възпалението. Освен това има и антитромботично действие. Lidocaine hydrochloride е местен анестетик, който допринася за намаляване на болката. Doxiproct намалява възпалението, кървенето, отделянето а серни флуиди и осигурява бързо облекчаване на симптомите на възпаление в аналната област, като болка, сърбеж, усещане за парене или напрежение.

Показания за употреба

Болестно променени вътрешни и външни хемороиди. Анален пруритус, анална екзема, анитис, перианитис, криптитис, папилитис, тежка хеморондна тромбоза, анални фисури.
Пред- и пост- оперативно лечение, в случаи на оперативно отстраняване на хемороиди.

Дозировка и начин на приложение

Супозитории: 2 супозитории дневно.

Прилага сутрин и вечер, ако е възможно след дефекация. В случай на вътрешни хемороиди, да се прилагат супозитории. Възможно е да се комбинира употребата на Doxiproct супозитории и Doxiproct маз.

Продължителността на лечението обикновено е няколко дни. Трябва да се информира лекуващия лекар, ако след 1-2 седмично лечение, състоянието не се е подобрило или се е влошило. Лечението не бива да се повтаря без да е изрично предписано от лекар.

Ограничения при употреба

Противопоказания

Свръхчувствителност към някоя от съставките на Doxiproct .
Деца под 14 годишна възраст.

Предпазни мерки

В случай на остра бъбречна недостатъчност, употребата на Doxiproct трябва да се ограничи до няколко дни. В случай на поява или на съмнение за наличие на кръв в изпражненията, както и едновременна поява на болка и фебрилитет, е необходимо да се консултирате с лекар.

Лечението трябва да бъде спряно в случай на поява на реакции на свръхчувствителност.

Бутилхидроксанизол, който влиза в състава на това лекарство може да предизвика раздразнение на кожата и лигавиците.

Бременност и кърмене

Бременност категория С: Няма проучвания при бременни жени или животни и не е известно дали Calcium dobesilate преминава плацентната бариера. От друга страна, при перорално приемане, Lidocaine hydrochloride се резорбира в различни количества и може да има системни ефекти. Освен това, той преминава плацентната бариера. Като се има предвид всичко това, Doxiproct трябва да се прилага по време на бременност, само ако евентуалните положителни ефекти оправдават риска за плода.

След перорално приложение, Calcium dobesilate се екскретира в малки количества в майчиното мляко, но не е известно дали това се получава и при местна употреба. След външна употреба, Lidocaine hydrochloride се екскретира в майчиното мляко. Като предпазна мярка, трябва да се прекъсне или лечението или кърменето.

Нежелани реакции

Много редки случаи: промени в чревното преминаване, временно усещане за парене, местна болка.

Могат да се появят реакции на свръхчувствителност заедно с реакции на кожата и/или фебрилитет, които може да са с алергичен произход. (вж. "Предпазни мерки")

Взаимодействия

Не са известни до сега.

Предозиране

До сега не са известни случаи на предозиране.

Съхранение

Да се съхранява при температура под 30 °С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца

Да не се употребява след посочената на опаковката дата на изтичане на срока на годност.

Опаковка

Опаковка от 10 супозитории

Дата на последен преглед на текста:

Август 1998г.