



ИАЛ
ОДОБРЕНО!
ДАТА 15.06.07

BUSCOLYSIN® tabl. coated 10 mg

Информация за потребителя

BUSCOLYSIN®
БУСКОЛИЗИН®
(butylscopolamine)
Обвита таблетка 10 mg

- *Моля, прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете лечение. Тя съдържа кратка информация относно Вашето лекарство.*
- *Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.*
- *Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.*
- *Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.*
- *Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.*

В тази листовка:

1. Какво представлява **BUSCOLYSIN** и за какво се използва
2. Преди да използвате **BUSCOLYSIN**
3. Как да използвате **BUSCOLYSIN**
4. Възможни нежелани ефекти
5. Съхранение на **BUSCOLYSIN**
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА **BUSCOLYSIN** И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

BUSCOLYSIN принадлежи към групата на спазмолитиците – лекарства, които премахват болезнените спазми на гладките мускули в стомашно-чревния тракт, жлъчните и пикочни пътища, репродуктивните органи.

BUSCOLYSIN се използва в комплексното лечение на заболявания, съпроводени с болезнени спазми на гладката мускулатура на стомашно-чревния тракт, жлъчните пътища, урогениталната система.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ **BUSCOLYSIN**

Не приемайте **BUSCOLYSIN:**

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към активното или някои от останалите съставки на лекарството;
- Ако имате глаукома (повишено вътреочно налягане); миастения гравис (мускулна слабост); мегаколон (разширяване и удебеляване на стената на дебелото черво); чревна непроходимост (илеус); механични пречки по хода на стомашно-



чревния тракт; уголемяване на простатата със задръжка на урината; тиреотоксикоза (заболяване на щитовидната жлеза).

Обърнете специално внимание при лечение с BUSCOLYSIN

Преди да започнете лечение с **BUSCOLYSIN** уведомете Вашия лекар ако имате сърдечно заболяване, високо кръвно налягане, хипертиреозидизъм (повишена функция на щитовидната жлеза), белодробно заболяване, проблеми с простатата, тежко чернодробно или бъбречно заболяване, епилепсия, гастроезофагеална рефлуксна болест (състояние, при което кисело стомашно съдържимо се връща обратно в хранопровода), ахалазия (нарушение на двигателната дейност на хранопровода), стомашна язва, диабетна невропатия, средна и тежка форма на улцерозен колит (тежка форма на възпаление на дебелото черво).

BUSCOLYSIN може да провокира появата на глаукома (повишено вътреочно налягане). При поява на болки в окото и нарушаване на зрението след приложение на **BUSCOLYSIN** е необходима консултация с очен лекар.

BUSCOLYSIN трябва да се прилага с внимание при лица с ксеростомия (сухота в устата, дължаща се на намаляване или липса на слюнчена секреция), ринитис сика.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Действието на лекарството може да се промени ако приемате:

- лекарства за лечение на Паркинсонова болест;
- хинидин (антиаритмично средство), дигоксин (сърдечен гликозид);
- три- и четирициклични антидепресанти (лекарства за лечение на депреси);
- антипсихотици (средства за лечение на психози);
- антихистаминови (антиалергични) средства;
- бета-адреностимулатори (например лекарства, които се използват за лечение на бронхиална астма, като кленбутерол, салбутамол и др.);
- кетоконазол (лекарство за лечение на гъбични инфекции);
- метоклопрамид (използва се при повръщане).

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на което и да е лекарство, ако сте бременна или планирате да забременеете.

Ако сте бременна лечение с **BUSCOLYSIN** се провежда само под лекарски контрол.

Ако кърмите, лечение с **BUSCOLYSIN** не се препоръчва, защото част от продукта се излъчва с млякото. Освен това, той може да намали млечната секреция, поради потискане на жлезите с външна секреция.

Шофиране и работа с машини

BUSCOLYSIN може да предизвика временно нарушение на зрението със затруднено виждане на близко разстояние. Въздържайте се от шофиране докато зрението Ви се нормализира.



3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ BUSCOLYSIN

Винаги приемайте BUSCOLYSIN точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Приемайте таблетките през устата на гладно или преди хранене с вода.

Обичайната доза е:

Възрастни и деца над 12 г.: по 1-2 таблетки 2-4 пъти дневно. Максималната дневна доза е 80 mg (8 таблетки).

Деца от 6 до 12 години: по 1 таблетка 3 пъти дневно.

Не се препоръчва употребата на BUSCOLYSIN при деца под 6 години.

Ако сте приели повече от необходимата доза BUSCOLYSIN

Ако сте приели доза, по-голяма от предписаната, може да почувствате сухота в устата и гърлото, затруднено гълтане, възбуда, повишаване на температурата, сърцебиене, халюцинации. Може да забележите зачервяване на кожата. Потърсете незабавно лекарска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете BUSCOLYSIN

Ако пропуснете да вземете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако почти е станало време за следващата доза, вземете я както обикновено, като пропуснете дозата, която сте забравили. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате забравената. Продължете да вземате лекарството, както ви е предписано от лекуващия Ви лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, BUSCOLYSIN може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Рядко могат да се появят сухота в устата, гадене, повръщане, запек, затруднено уриниране, задържане на урината, нарушения в зрението, разширяване на зениците, повишаване на вътреочното налягане, потискане секрецията на слъзните жлези; тахикардия (ускорен сърдечен ритъм), повишаване на кръвното налягане. Понякога се наблюдават сърбеж, обриви, намалено потоотделяне, виене на свят, главоболие, нервност, слабост, атаксия (разстройство на координацията на движенията). В редки случаи са възможни възбуда, безсъние, безпокойство, халюцинации (особено при деца и пациенти в напреднала възраст).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА BUSCOLYSIN

В оригиналната опаковка, на сухо и защитено от светлина място, при температура под 25° С.

Съхранявайте лекарството на място, недостъпно за деца.



Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане срока на годност, отбелязана върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Създайте си навик да връщате неизползваните или стари лекарства на Вашия фармацевт.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа BUSCOLYSIN?

Всяка обвита таблетка съдържа лекарствено вещество бутилскополамин (hyoscine butylbromide) 10 mg.

Другите съставки са млечна захар, винена киселина, микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат тип А, талк, магнезиев стеарат, титанов диоксид, захароза, желатин, арабска гума, опалукс AS 22808 жълт, макрогол, глицерол.

Как изглежда BUSCOLYSIN и какво съдържа опаковката

20 обвити таблетки в блистер от твърдо ПВХ/алуминиево фолио, по 1 или 40 блистера в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител

СОФАРМА АД, България
1220 София, ул. "Илиенско шосе" 16

Последна редакция на текста: юли, 2007 г.

