



Nurofen for children Active
Нурофен за деца Актив

Ibuprofen 100 mg

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЛИСТОВКАТА, ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ВАШИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ.

Запазете листовката, може да пожелаете да я прочетете отново.

➤ **Какво се съдържа в Нурофен за деца Актив?**

Всяка таблетка съдържа: активната съставка ибупрофен 100mg и следните помощни вещества: манитол, етилцелулоза, аспартам, кроскармелоза натрий, силициев диоксид, хипромелоза, магнезиев стеарат, аромат на ягода (малтодекстрин и гума арабика).

Опаковка Нурофен за деца Актив съдържа 12 перорално диспергиращи се таблетки.

➤ **Какъв вид лекарствен продукт е Нурофен за деца Актив?**

Поставен върху езика, Нурофен за деца Актив се разтваря бързо в устата, без необходимост от вода.

Осигурява облекчение, като променя отговора на тялото към висока телесна температура, болка и възпаление.

Нурофен за деца Актив съдържа ибупрофен, който принадлежи към групата на нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти, с основно действие понижаване на температура и успокояване на болка.

➤ **За какво се използва?**

Нурофен за деца Актив е предназначен за деца над 6 години.

Отпуска се без лекарско предписание.

Приема се вътрешно и:

- понижава температурата на вашето дете
- облекчава слаба до умерена болка, като болки в гърлото, зъбобол, болки в ушите, главоболие, слаби болки и навяхвания.

➤ **Прочетете листовката преди да вземете или дадете лекарствения продукт.**

Да не се дава на деца, ако:

- имат стомашна язва или други сериозни стомашни заболявания
- са с данни за астма, ринит, уртикария и алергии към ацетилсалицилова киселина или други подобни лекарствени продукти.
- имат тежки бъбречни, сърдечни или чернодробни проблеми или имат заболявания, свързани с намален имунитет.
- са алергични към някой от съставките
- са на възраст под 6 години

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да започнете да давате Нурофен за деца Актив, ако вашето дете:

- има астма
- има бъбречни, чернодробни или сърдечни проблеми
- е алергично към ацетилсалицилова киселина
- има хронична хрема, полипоза и синусит



- приема други лекарствени продукти или редовно взема лекарствени продукти за хронични заболявания, както следва:
 - приема други болкоуспокояващи или други Нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти (НСПВС), като ибупрофен и ацетилсалицилова киселина. Нуорофен за деца Актив не трябва да се приема заедно с ацетилсалицилова киселина и други НСПВС.
 - противосъсирващи (антикоагуланти) лекарствени продукти
 - лекарствени продукти за високо кръвно налягане (антихипертензивни)
 - лекарствени продукти за увеличаване отделянето на урина (диуретици)
 - литий и метотрексат
- има фенилкетонурия или е чувствително към фенилаланин, всяка таблетка съдържа аспартам еквивалентен на 7mg фенилаланин.

Този лекарствен продукт може да се ползва при необходимост и от възрастни.

- Бременни жени трябва да се консултират с лекар преди употребата му. Лекарствения продукт не трябва да се използва през последния триместър на бременността.
- Предупрежденията и горната информация се отнасят и за възрастни.

➤ Как да използвате Нуорофен за деца Актив?

Докато приема Нуорофен за деца Актив, детето трябва да бъде наблюдавано от възрастен. Таблетката се поставя на езика, изчаква се да се разтвори и се преглъща без необходимост от вода.

- **Деца от 6-9 години:** Първоначална доза от 2 таблетки, след това ако е необходимо 2 таблетки на всеки 4-6 часа. Да не се приемат повече от 6 таблетки за 24 часа.
- **Деца от 10-12 години:** Първоначална доза от 3 таблетки, след това ако е необходимо 3 таблетки на всеки 4-6 часа. Да не се приемат повече от 9 таблетки за 24 часа.

Предупреждения:

Да не се превишава указаната доза.

Лекарства като Нуорофен за деца Актив могат да бъдат свързани с леко увеличен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт. Всеки риск е по-вероятен при високи дози и при продължително лечение. Не превишавайте препоръчаните дози и продължителността на лечението 3 дни.

Ако имате проблеми със сърцето, прекаран инсулт или мислите, че за Вас може да има риск от появата им (например ако имате високо кръвно налягане, диабет, повишени стойности на холестерол или сте пушач) трябва да обсъдите лечението с Вашия лекар или фармацевт.

Лекарственият продукт е за кратковременно приложение.

Консултирайте се с лекар или фармацевт ако:

- симптомите на детето ви продължават повече от 3 дни или се влошават
- появяват се нови симптоми

➤ Какво да направите, ако дадете на детето си твърде голямо количество?

Проблеми с предозиране са рядко срещани, но ако случайно дадете повече от препоръчаната доза, незабавно уведомете лекуващия лекар.



➤ **Нежелани лекарствени реакции:**

Нежеланите реакции са много редки и могат да бъдат някои характерни за Нестероидните противовъзпалителни лекарствени продукти или някои, дължащи се на другите съставки. При появата им или при съмнение за това, спрете да давате Нурофен за деца Актив и се консултирайте незабавно с лекар.

Най-често срещани нежелани реакции са:

- стомашен дискомфорт

По-рядко срещани:

- гадене, стомашна болка
- обрив, сърбеж или влошаване на астма, внезапни хрипове или затруднено дишане

Много рядко срещани:

- подуване на лицето – **потърсете незабавно лекарска помощ** (случва се рядко и може да е тежка алергична реакция)
- оцветени в тъмно изпражнения, стомашна язва или кървене
- люпене на кожата, склонност към лесно получаване на синини

Лекарства като Нурофен за деца Актив могат да бъдат свързани с леко повишен риск от сърдечен инцидент („миокарден инфаркт“) или инсулт.

➤ **Съхранение**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се употребява преди изтичане срока на годност, посочен на етикета.

➤ **Как да получите повече информация за Нурофен за деца Актив?**

Най-важната информация е дадена в тази листовка. Ако имате допълнителни въпроси, след като сте я прочели, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт, които ще Ви дадат допълнителна информация.

Притежател на разрешението за употреба:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH

Великобритания

Производители:

1. Ethypharm Industries,

Z.I De Saint-Arnoult,

28179 Chateauneuf-en-Thumerais,

Франция

2. Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Thane Road, Nottingham, NG90 2DB,

Великобритания

Последна редакция на текста: март, 2007

