

ИАЛ
ОДОБРЕНО!

ДАТА №1/30.07.2007

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

CARSIL® обвити таблетки
КАРСИЛ® обвити таблетки
Силимарин (*Silymarin*)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

- Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Карсил и за какво се използва
2. Преди да използвате Карсил
3. Как да приемате Карсил
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Карсил
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАРСИЛ

Карсил е лекарствен продукт, който съдържа лекарствено вещество силимарин, изолирано от плодове на растението бял трън. Силимарин активира белтъчния и фосфолипидния синтез в увредените чернодробни клетки, стабилизира клетъчните им мембрани, свързва свободните радикали (антиоксидантно действие). Основното му действие е предпазване на чернодробните клетки от вредните въздействия на различни фактори като алкохол, медикаменти, вирусни инфекции, индустриални замърсители. При увреждания на чернодробните клетки способства за по-бързото им възстановяване.

Използва се за симптоматично лечение на хронични токсични чернодробни увреждания; за поддържащо лечение при пациенти с хронични възпалителни заболявания на черния дроб и чернодробна цироза.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КАРСИЛ

Не приемайте Карсил

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към лекарственото вещество или някоя от останалите съставки;
- За приложение при деца няма достатъчно клинични данни, за това не трябва да се прилага при деца под 12 години.



Обърнете специално внимание при употребата на Карсил

Лечението с Карсил не може да замести диета или въздържание при чернодробни увреждания (напр. алкохол).

Поради възможен естрогеноподобен ефект приложението при пациенти с хормонални нарушения (ендометриоза, миома на матката, карцином на гърдата, яйчниците и матката, карцином на простатата) да става след консултация със специалист.

Важна информация за помощните съставки на лекарствения продукт

Лекарственият продукт съдържа пшенично нишесте. Не представлява риск за хора с цьолиакия. Пациенти с пшенична алергия (различна от цьолиакията) не трябва да вземат това лекарство.

Прием на други лекарства

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Карсил може да намали ефективността на орални противозачатъчни и лекарства, които се използват при хормонално-заместително лечение.

Може да засили ефектите на лекарства като диазепам, алпразолам, кетоконазол, ловастатин, винбластин.

Бременност и кърмене

Преди да вземете някакво лекарство по време на бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

По време на бременност и в периода на кърмене Карсил може да се прилага само по медицински показания и ако ползата за майката надхвърля риска от приложението на продукта за плода.

Шофиране и работа с машини

Карсил не оказва неблагоприятно влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КАРСИЛ

Винаги приемайте Карсил точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Карсил обвити таблетки се приема през устата, с достатъчно количество течност. Обичайната доза е: по 6 обвити таблетки 3 пъти дневно (еквивалентни на 405 mg silumarin).

Ако оплакванията Ви продължават, потърсете съвет от Вашия лекар. Продължителността на курса на лечение се определя от Вашия лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Карсил

Ако сте взели доза, по-голяма от предписаната, се посъветвайте с лекуващия си лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Карсил

Ако пропуснете една доза, вземете я колкото е възможно по-скоро. Ако погънете, не вземайте. Ако станало време за следващата доза, вземете я както обикновено.



двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Продължете да вземате лекарството, както Ви е предписано.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Карсил може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Продуктът има добра поносимост. Рядко, в отделни случаи и при индивидуално повишена чувствителност са възможни нежелани реакции като: храносмилателни смущения, диария; в единични случаи – кожен обрив и сърбеж; много рядко е възможно засилване на съществуващи вестибуларни нарушения (гадене, световъртеж).

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. СЪХРАНЕНИЕ НА КАРСИЛ

В оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява под 25 °С.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Лекарството не трябва да се използва след датата на изтичане срока на годност, отбелязан върху опаковката.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Карсил

Всяка обвита таблетка съдържа 40,9-56,3 mg *Silybi mariani fructus extractum siccum* (35-50:1), екв. на 22,5 mg *silymarin*, като *silibinin* (HPLC).

Другите съставки са: лактоза монохидрат, пшенично нишесте, повидон, микрокристална целулоза, магнезиев стеарат, талк, манитол, кросповидон, полисорбат 80, натриев хидроген карбонат.

Дражирано покритие: ацетофталат целулоза, диетилфталат, захароза, гума арабика, желатин, талк, титанов диоксид, макрогол 6000, глицерол, кафяв Опалукс.

Как изглежда Карсил и какво съдържа опаковката

Обвити таблетки с правилна кръгла форма, кафяв цвят, без мирис



По 10 обвити таблетки в блистер от PVC/алуминиево фолио; по 8 блистера (80 обвити таблетки) в картонена кутия, заедно с листовка.

Притежател на разрешението за употреба и производител
СОФАРМА АД
ул. Илиенско шосе 16, София 1220, България

Дата на последно одобрение на листовката: септември 2007 г.

