

3/24.07.07

**ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА**

*Verapamil – Tchaikapharma coated tablets 40mg*  
*Верапамил – Чайкафарма обвити таблети 40mg*  
*(Verapamil hydrochloride)*

Одобрено:

Прочетете тази листовка внимателно, преди да започнете да приемате това лекарство.

- Пазете тази листовка! Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**Запомнете – това лекарство е изписано само на Вас!**

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Verapamil-Tchaikapharma и за какво се използва
2. Преди да приемете Verapamil-Tchaikapharma
3. Как да приемате Verapamil-Tchaikapharma
4. Възможни нежелани реакции
5. Съхранение на Verapamil-Tchaikapharma
6. Допълнителна информация

**1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VERAPAMIL-TCHAIKAPHARMA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА**

Името на Вашето лекарство е Verapamil-Tchaikapharma обвити таблетки и тяхната активна съставка е Verapamil hydrochlorid (верапамил хидрохлорид). В таблетката (в нейната сърцевина и обвивка) се съдържат и следните помощни вещества: лактоза, картофено нишесте, кроскармелоза натрий, талк, колоидален силиконов диоксид, магнезиев стеарат, царевично нишесте, повидон K-25, карбоксиметилцелулоза натрий, сукроза, полисорбат 80, калциев карбонат, титаниев диоксид, капол 600 и E104.

Verapamil е калциев антагонист. Той разширява големите коронарни артерии, като по този начин подобрява кръвотока. Той е ефективен за лечение на дисритмии (нарушения на сърденчния ритъм) и високо кръвно налягане (хипертония).

Verapamil се използва за лечение на:

- стабилна стенокардия;
- стенокардия на Printzmetal при болни с нормална левокамерна функция;



- аритмии (при профилактика на надкамерна тахикардия; контрол на камерната честота при пациенти с предсърдно мъждене);
- есенциална хипертония (ниско или средностепенна);

## **2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ VERAPAMIL-TCHAIKAPHARMA**

### **Не приемайте Verapamil-Tchaikapharma обвити таблетки ако:**

Бъдете сигурни, че сте информирали Вашия лекар ако:

- сте бременна, планирате бременност или кърмите;
- сте алергични към Verapamil или към някоя друго вещество, което влиза в състава на таблетките;
- сте имали някога инфаркт на миокарда;
- имате забавен сърдечен ритъм;
- имате ниско кръвно налягане (хипотония);
- атриовентрикуларен блок;
- имате чернодробно заболяване.

### **Обърнете специално внимание при лечението с Verapamil-Tchaikapharma ако:**

Verapamil трябва да се дава с внимание на пациенти с тежка дисфункция на лявата камера или/и симптоми на сърдечна недостатъчност и на пациенти с камерна дисфункция. Може да се наложи намаляване на дозата на Verapamil при пациенти с потиснато невромускулно предаване (мускулна дистрофия на Дучене).

Пациенти с намалена чернодробна функция трябва да приемат 30% от нормалната терапевтична доза.

Пациенти с бъбречна недостатъчност трябва да уведомят лекуващия ги лекар, преди да започнат приема на таблетките. Verapamil не се елиминира чрез хемодиализа.

Информирайте Вашия лекар ако имате някакво хронично заболяване или метаболитно нарушение.

Ако имате никакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

### **Употреба на други лекарства:**

Кажете на Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпусканi без рецептa.

Уведомете лекаря, че приемате Verapamil-Tchaikapharma, в случай че ви предписва лечение с което и да е друго лекарство.

- бета-блокери (пропранолол)
- карbamазепин
- циметидин
- циклоспорин
- дигиталис
- дигоксин
- литий
- фенобарбитал
- фенитоин
- рифампицин
- теофилин
- орални антикоагуланти и салицилати
- калиеви соли и витамин D



- сулфонилуреини производни (антидиабетични средства)
- хидантон
- други лекарства за високо кръвно налягане (антихипертензивни средства)

#### **Прием на Verapamil-Tchaikapharma с храни и напитки:**

Не приемайте таблетките с храни или напитки, които съдържат сок от грейпфрут.

#### **Бременност и кърмене:**

Приемането на Verapamil по време на бременност трябва да се избягва, тъй като преминава през плацентарната бариера.

Verapamil се секретира в майчиното мляко. Поради потенциални нежелани ефекти върху кърмачето, при приемане на Verapamil кърменето трябва да се преустанови.

Информирайте Вашия лекар ако сте бременна, желаете да забременеете или кърмите. Като правило по време на бременност или кърмене е препоръчително да поискате съвет от Вашия лекар преди да вземете каквото и да било лекарство.

#### **Шофиране и работа с машини:**

При чувствителни пациенти особено след първите дози или при едновременно приемане на алкохол, Verapamil може да предизвика потискане на психическата и/или физическата активност, т.е. да бъде потисната способността да се шофира или да се работи с машини.

#### **Списък на помощните вещества с установено действие или ефект:**

Този лекарствен продукт съдържа лактоза и сукроза. Ако са Ви казали, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с Вашия лекар преди да започнете да приемате тези таблетки.

### **3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ VERAPAMIL-TCHAIKAPHARMA**

Винаги приемайте обвитите таблетки точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### ***Начин на приемане***

Прилага се перорално. Обвитите таблетки трябва да се погълнат цели, с малко течност.

#### ***Стенокардия:***

Препоръчваната доза е 80 – 120 mg три пъти дневно. Лечението обикновено започва с доза 40 mg три пъти дневно и се повишава до 120 mg три пъти на ден.

При възрастни пациенти и такива с повишен отговор към Verapamil може да се приложи доза от 40 mg три пъти дневно.

#### ***Аритмии:***

Препоръчваната доза е 240 mg дневно (за пациенти, които приемат сърдечни гликозиди – дигоксин), разделена в 3 приема.

#### ***Есенциална хипертония:***

Началната доза обикновено е 80 mg 3 пъти дневно. При пациенти в напредната възраст, с по-малко телесна маса, с чернодробна дисфункция, както и при пациенти, които имат повишен отговор към лекарството, може да се започне с доза от 40 mg три пъти дневно.



Максималната дневна доза НЕ трябва да надхвърля 480 мг Verapamil.  
Verapamil е противопоказан при деца и подрастващи под 18 годишна възраст.

**Ако сте пропуснали да приемете Verapamil-Tchaikapharma обвити таблетки:**

Ако сте забравили да приемете някоя доза, не се беспокойте. Приемете дозата веднага след като си спомните и продължете приемането на следващите дози точно в определеното време. Ако обаче е наблизило времето за следващия прием, изчакайте до неговото настъпване и приемете направо следващата доза! **Не приемайте двойна доза!**

**Ако сте приели повече от необходимата доза**

Ако Вие или някой друг е взел голяма доза Verapamil-Tchaikapharma, кажете незабавно на Вашия лекар или фармацевт. Вземете и опаковката на лекарството с Вас.

При предозиране Verapamil може да предизвика значително спадане на кръвното налягане, сърдечната честота и нарушаване на сърдечния ритъм. В такива случаи трябва да се направи стомашна промивка с активен въглен.

**Ако сте спрели приема на Verapamil-Tchaikapharma**

Не прекратявайте приема на Verapamil-Tchaikapharma преди да се консултирате с Вашия лекар. Това може да е опасно за Вашето здраве!

#### **4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ**

Както всички лекарства, Verapamil-Tchaikapharma може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Възможните нежелани реакции са: нарушаване на сърдечния ритъм и временна хипотония (ниско кръвно налягане); запек; замаяност; гадене; главоболие; периферен оток; лесна уморяемост; затруднено дишане; топли вълни; алергични реакции; нарастване на млечните жлези при мъже; хипертрофия на венците; повишени чернодробни ензими

#### **5. СЪХРАНЕНИЕ НА VERAPAMIL-TCHAIKAPHARMA**

Да се съхранява на тъмно и сухо място, при температура под 25 °C.

Да не се приема след изтичане на срока на годност, посочен върху опаковката.

Да се съхранява на място недостъпно за деца

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнери за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.



**Срок на годност**  
5 години

## **6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Как изглежда Verapamil-Tchaikapharma и какво съдържа опаковката**

Всеки един блистер съдържа 15 обвити таблетки Verapamil-Tchaikapharma. В една картонена кутия се съдържат 2 блистера (общо 30 таблетки) и листовка за пациента.

### **Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба:**

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД  
гр. Варна 9010, “Н.Й.Вапцаров” № 1, България

### **Име и адрес на производителя:**

“Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД  
гр. Варна 9010, “Н.Й.Вапцаров” № 1, България

### **Дата на последна одобрение на листовката**

25.09.2001

### **Дата на последна редакция на текста**

Август 2007

