

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Ben-Gay® Sports Balm

1. ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ben-Gay Sports Balm
Бен-Гей спортен балсам

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един грам от крема съдържа methyl salicylate 280 mg, menthol 100 mg.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Крем

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Показания

Ben-Gay Sports Balm се прилага преди интензивна спортна активност или физическа работа за осигуряване на физически комфорт или непосредствено след това за намаляване на болезнеността на преуморените мускули.

4.2 Дозировка начин на приложение

Кремът се прилага върху кожата на засегнатата област чрез масаж. Това може да бъде повторено при необходимост в рамките на няколко часа (3-4 пъти на ден).

4.3 Противопоказания

Свръхчувствителност към methyl salicylate, menthol или някое от помощните вещества, открити рани, възпалена кожа, деца под 12 години.

4.4 Специални предупреждения и специални предпазни мерки при употреба

Само за външно приложение.

Не използвайте със загряващи компреси.

Не използвайте при появя на възпаление на кожата.

Да се избягва попадането в очите или други мукозни мембрани.

В случай, че болката продължи 10 или повече дни без да има облекчаване на симптомите, трябва да се потърси консултация с лекар.

4.5 Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействия

Не е приложимо.

4.6 Бременност и кърмене

Поради факта, че salicylate се абсорбира през кожата и може да предизвика проприоцето на повищена възбудимост на централната нервна система, особено след приложение.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	
Приложение към разрешение за употреба	
N=1/30.07.2004 №/Дата на КЛП	Подпись: Г.К.Иванов 11-0486/28.08.04



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Ben-Gay® Sports Balm

върху обширни площи, Ben-Gay Sports Balm може да се прилага по време на бременност и кърмене само след внимателна преценка на съотношението полза-рисък.

4.7 Влияние върху способността за шофиране и работа с машини

Не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8 Нежелани лекарствени реакции

Menthol

Menthol рядко може да предизвика алергични реакции като уртикария, еритема и други кожни реакции. Поради абсорбцията през кожата след прилагане върху голяма площ се очакват сходни нежелани реакции като тези, които се появяват след прекомерен прием на ментолови продукти: гадене, абдоминална болка, повръщане и симптоми на потискане на ЦНС (замайване, нестабилна походка, съниливост, брадипнея и кома). Въпреки това действителният брой на нежеланите реакции в следствие на външно приложение на ментол е нисък.

Methyl salicylate

Независимо от доказателствата, че погълдането на methyl salicylate е рисковано, след външно приложение както е препоръчано, methyl salicylate се понася добре с изключение на няколко случая, при които са се появили тежки локални реакции.

4.9 Предозиране

Няма данни за предозиране.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ

5.1 Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: лекарство за локално приложение при артрактура и миалгия. ATC код: M02A X10

Menthol е локален вазодилататор.

При локално приложение на menthol се наблюдава бързо и персистиращо чувство на затопляне.

Methyl salicylate се използва за временно облекчаване на дълбоко разположена болка.

Приложението на локално действащия крем води до локално намаляване на болевите усещания и чувството на дискомфорт на подлежащите тъкани, напр. мускулни болки и спазъм след физически усилия вследствие на натрупана млечна киселина, в резултат на „отвличащото” действие на лекарствения продукт.

В двойно-сляпо плацебо-контролирано проучване е установено, че успокояващият болката лосион, съдържащ methyl salicylate при хора, страдащи от умерено болезнен артрит, е проявил значително по-голям ефект за облекчаване на артритната болка от този при плацебо.

Приложението на локално действащата маз, съдържаща methyl salicylate при болезнени артритни стави при тест групата е довело до значително намаление на акционния потенциал на разположените в съседство мускули, докато приложението на плацебо не е предизвикало значима промяна.



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Ben-Gay® Sports Balm

Действието на Ben-Gay Sports Balm за намаляване на мускулния спазъм и болката при мускулен спазъм е свързано с процеса на затопляне, водещ до дилатация на капилярите с увеличен кръвоток и отстраняване на үлчната киселина.

Едно проучване показва, че Ben-Gay Sports Balm леко, но значимо удължава времето за тичане с темпо под максималното, намалява субективното ниво на болка по време на 36 ч. постоянно бягане на движеща се пътека (тредмил) и намалява субективните нива на дискомфорт по време на последните минути на бягане на тредмил с максимално натоварване.

5.2 Фармакокинетични данни

След външно приложение methyl salicylate се абсорбира през здрава кожа. Перкутанно абсорбираният methyl salicylate има системни ефекти, абсорбираното количество е достатъчно да предизвика значителен аналгетичен ефект.

5.3. Предклинични данни за безопасност

Няма налични предклинични данни за безопасност.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 Списък на помощните вещества

Stearic acid
Glyceryl monostearate
Anhydrous lanolin
Polysorbate 85
Sorbitan tristearate
Xantham gum
Potassium hydroxide
Purified water

6.2 Физико-химични несъвместимости

Не е приложимо.

6.3 Срок на годност

2 години

6.4 Специални условия на съхранение

Да се съхранява при температура под 25° C.

6.5 Вид на опаковката и съдържание

Опаковка с една туба от 35 g

6.6 Препоръки при употреба

Не е приложимо.



КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Ben-Gay® Sports Balm

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

PFIZER EUROPE MA EEIG
Ramsgate Road, Sandwich, Kent
England CT13 9NJ

8. РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

20020116

9. ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

05.10.1993

10. ДАТА НА (ЧАСТИЧНА) АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕКСТА

